Atlasul
speciilor la nivel internațional și național din flora și fauna Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos”, Republica Moldova



Societatea Ecologică «BIOTICA»
Chișinău - 2021

581.9+591.9(478)(084.4)

A 91

Autorii:

Ghendov V.S., Derjanschi V.V., Jurminschi S.D., Izverscaia T.D., Ioniță O.V., Mantorov O.Gh., Romanovici N., Rușciuk A.D., Sârodoev G.N., Tișcenkov A., Tofan-Dorofeev E.V., Țurcanu V.

Redactarea științifică: Derjanchi V.V., Izverscaia T.D.

În lucrare este prezentată valoarea Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos” pentru conservarea diversității biologice. O atenție deosebită este acordată speciilor rare semnalate pe teritoriul investigat.

Atlasul speciilor rare la nivel internațional și național din flora și fauna Zonei Ramsar ”Nistrul de Jos”, Republica Moldova /Ghendov V.S., Derjanschi V.V., Jurminschi S.D., Izverscaia T.D., Ioniță O.V., Mantorov O.Gh., Romanovici N., Rușciuk A.D., Sârodoev G.N., Tișcenkov A., Tofan-Dorofeev E.V., Țurcanu V. – Chișinău: Societatea Ecologică ”BIOTICA”, 2021 (Tipogr. "Arconteh"). – 607 p. : fig., fot.

Cerinţe sistem : PDF Reader.

ISBN 978-9975-3404-7-2 (PDF).

© 2021 Societatea Ecologică ”BIOTICA”.




Fig. 1. Teritoriul site-ului Ramsar «Nustrul de Jos» în Republica Moldova

Poziția geografică

Teritoriul Zonei Ramsar ”Nustrul de Jos” se află în partea sud-estică a Republicii Moldova, pe ambele maluri ale Nistrului: pe malul drept – la 8 km sud de or. Bender, pe malul stâng – de la marginea sud a or.Slobozia până la hotar cu Ucraina. Suprafața totală constituie **50768** ha [132].

Site-ul cuprinde teritoriile raioanelor Căușeni, Ștefan-Vodă și Slobozia (Fig. 1).

Poziția biogeografică

Teritoriul este situat în zona de contact al regiunilor biogeografice de silvostepă **Podolico-Moldovenească** și **Dunăreană** și de stepă **Azov-Mării Negre** [53, 54]. Provinciei geobotanice – **stepele de păiuș-negară** și **vegetația de luncă** a Transnistriei Moldovenești de Sud a regiunii Eurasiatice de stepă, atingând și provincia de **păduri subaride de gârneț** [77].

Statutul juridic și istoria înființării a teritoriului protejat

Zona Ramsar «Nistrul de Jos» a fost desemnată în baza studiilor, descrierii și cartării obiectelor biologice valoroase, efectuate de către Societatea Ecologică ”BIOTICA”. Zona a obținut statutul oficial de Zonă Internațională 1316 (3MD003) a Convenției Ramsar la 20 august 2003 [3, 5] în baza documentelor elaborate în colaborare cu Ministerul Mediului și prezentate la Secretariatul Convenției. În conformitate cu Legea privind modificările la Legea despre fondul teritoriilor protejate de stat № 1538-XIII din 25 februarie 1998 (Nr 354-XVI din **22.12.2006**), Site-ul Ramsar ”Nistrul de Jos” a fost introdus în lista teritoriilor protejate de stat (CAPITOLUL 131. ZONE UMEDE DE IMPORTANȚĂ INTERNAȚIONALĂ) [132].

Cele mai complete date despre biodiversitatea site-ului au fost obținute în ultimii **20** ani, preponderent în cadrul proiectelor realizate de Societatea Ecologică ”BIOTICA”:

- **”Elaborarea concepției de renaștere a fluviului Nistru**” (cu suportul Fundației MacArthur, 1998-1999)
- ”**Conservarea wetland-urilor ai Nistrului de Jos**” (cu suportul Convenției Ramsar, 2001-2002)
- ”**Conservarea biodiversității ecosistemelor deltei Nistrului de Jos**” (cu suportul Global Environment Fund și Băncii Mondiale, 2002-2005)
- ”**Conservarea șarpelor periclitați și restabilirea habitatelor de stepă**” (cu suportul Societății Zoologice din Frankfurt, 2004),
- ”**Elaborarea planului de management pentru lunca Talmaza și conservarea liliecilor**” (cu suportul Foundation Michael Otto, 2005),
- **”Construirea împreună a viitorului pentru zona holistică acceptată la nivel internațional a Nistrului de Jos și în amonte** (cu suportul Uniunii Europene, 2010-2011).
- ”**Elaborarea Rețelei Ecologice Naționale ca parte a Rețelei Ecologice Paneuropene, cu accent pe colaborare trasfrontalieră**” (cu suportul Guvernului Norvegiei și efectuat prin coordonarea de către IUCN Project, 2010-2012).
- ”**Îmbunătățirea managementului apelor și conservarea ecosistemelor acvatice în site-ul Ramsar ”Nistrul de Jos** (cu suportul Agenției pentru Dezvoltare a Austriei, 2013-2014).
- **”Formarea Rețelei Ecologice Naționale – contribuție la nivel local și național”** (cu suportul Programului de granturi mici al Global Environment Fund și implementat de către UNDP, 2014-2015).
- **”Măsuri de stabilitate pentru ecosistemele acvatice din site-ul Ramsar ”Nistrul de Jos”** (cu suportul Agenției pentru Dezvoltare a Austriei, 2015).
- **”Adaptare bazată pe ecosisteme, măsuri pentru atenuarea climei și dezvoltarea instituțională a ”Nistrului de Jos”** (cu suportul Agenției pentru Dezvoltare a Austrie, 2018-2019).

Pe teritoriul Zonei Ramsar «Nistrul de Jos» au fost desemnate **20** complexe naturale [132]: ”Valea Turcului”, ”Valea Ştiubei”, ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora” și ”Tudora-Palanca”, în Transnistria 5 complexe – ”Chiţcani”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Dubovîi cut”, ”Saghi-Kazaceşti” și ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii” (Fig. 2).




Fig. 2. Teritoriul site-ului Ramsar «Nustrul de Jos». Complexe naturale

Elementele principale ale Rețelei Ecologice Naționale (REN)

Teritoriul include un fragment mare al coridorului (eco)biologic Nistrean de însemnătate internațională a Rețelei Ecologice Paneuropene, elaborarea căreia este reglamentată de documente imternaționale.

După evaluările din 2010 în limitele site-ului sunt **7** teritorii-nucleie ale REN din **103**, identificate în toată țara [85]:

nivel internațional – **1** (”Lunca Talmaza”);

nivel național – **3** (”Cioburciu-Răscăieți”, ”Popeasca” și” Balta Togai”);

nivel local – **3 ”**(Pădurea Chițcani”, ”Grădina Turcească” și ”Copanca-Leuntea-Talmaza”).



Fig. 3. Teritoriul site-ului Ramsar «Nustrul de Jos». Rețeaua ecologică

Diversitatea biotopică

Sie-ul menține diversitatea înaltă a comunităților și ecosisemelor. Au fost depisate **22** biototopuri terestre și acvatice [132].

Biotopuri acvatice (**7** tipuri):

- ***Râu – ecosistemul segmentului Nistrului***
- ***Lacuri și bâltoace permanente sau temporare***
- ***Albia veche a Nistrului (Nistrul Chior)***
- ***Canale - ecosistemul apelor stătătoare, regular interacționantă cu flufiul***
- ***Sistemele de drenaj cu apă dulce, iazurile și bazinele înmlaștinite legate cu ele***
- ***Canalele cu apă salinizată***
- ***Ecosistemele pâraielor***

Habitatele terestre cuprind 15 tipuri de biotopuri:

Păduri de luncă în teritoriul site-ului sunt prezentate de asociații de salcie albă și plop alb, la fel și de păduri de frasin, unicale în Republica Moldova (habitate de însemnătate europeană).

Include **4** **tipuri de biotop**:

- ***Păduri de plop periodic inundate***
- ***Păduri înmlaștinite de salcie***
- ***Păduri de frasin noninundabile***
- ***Plantații artificiale monodominante***

Păduri de platou sunt prezentate în principal de plantații artificiale sau păduri degradate ale formelor de stejaret *Quercus robur* și *Q.pubescens.*

Acestea formează **5** tipuri de biotopuri:

- ***Pădure semiaridă din Quercus pubescens***
- ***Cvercineee semiaride din Quercus robur***
- ***Tufișuri naturale de arbuști sau arbori***
- ***Plantații complexe după compoziție***
- ***Plantantații antierozionale și industriale de salcâm alb***

<u>Luncile naturale și parcele de stepă în țară sunt practic distruse</u>, în excluvitate a unor fragmente. Biotopurile ierbacee necesită restaurare ecologică.

Teritorii aride de plante suculene (de stepă). Pe teritoriul site-ului sunt răspândite stepele veritabile și de luncă, iar stepele tropicale practic au dispărut.

Subtropicale. ***Fitocenoze ierbacee aride îmburuienate și pajiști***

Pajisti de luncă cu iarbă înaltă

Pajiști de luncă

Lunci înmlăștinite și mlaștini

Mlaștini cu iarbă

Teritoriul site-ului menține conservarea habitatelor de tip **”NATURA-2000” – Rețelele ecologice europene – sistem de regiuni protejate speciale și regiuni de conservare în Europa** [20].

Programul european are sprijin în două documente principale:

- **Directiva Europeană pentru conservarea habitatelor** [14];
- **Directiva Europeană pentru conservarea speciilor rare de păsări** [13].

Reteaua ecologică europeană ”NATURA-2000” are ca scop garanția de menținere durabilă a habitatelor naturale și populațiilor speciilor, adică ”susținerea și/sau restabilirea habitatelor supuse riscului și mediilor vulnerabile, atât și speciilor de floră și faună” (pt. 3 Directiva 92/43). Din rețea fac parte regiuni protejate speciale în conformitate cu Directiva Europeană pentru conservarea habitatelor și Directiva Europeană pentru conservarea speciilor rare de păsări.

Pe teritoriul Zonei au fost identificate **11** tipuri de habitate **”NATURA-2000”** [20, 191]**, incluse în Anexa I ”Tipuri de habitate naturale, care se află în zona intereselor societății, conservarea cărora necesită determinarea raioanelor de protecție” DIRECTIVEI CONSILIULUI Nr 92/43/CEE DESPRE CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE ȘI A FAUNEI ȘI FLOREI SĂLBATICE**

1. Habitate de mal și galofite

13. Mlaștine saline și luncile salinizate

1310. Asociațiile *Salicornia* și alte plante anuale, care colonizează sectoarele umede salinizate de mal

1340. Luncile salinizate continentale

Specii tipice – reprezentanții genurilor ***Salicornia, Crypsis, Puccinellia***



Specii tipice – ***Puccinellia distans*** (Jacq.) Parl.***, P. gigantea*** (Grossh.) Grossh. ***, Juncus gerardii*** Loisel.



15. Stepe interne (continentale)

1530(A). Stepe salinizate (continentale)

Specii tipice – ***Artemisia santonica*** L., ***Sueda prostrata*** Pall., ***Lepidium latifolium*** L., ***Camphorosma annua*** Pall., ***Juncus gerardii*** Loisel., ***Festuca pseudovina*** Hack. ex Wiesb., ***Brachyactis ciliata*** (Ledeb.) Ledeb.



3. Habitate cu apă dulce

31. Apă stătătoare

3150. Lacuri eutrofe naturale

Specii tipice – ***Nymphaea alba*** L., ***Nymphoides peltata*** (S.G.Gmel.) O.Kuntze, ***Stratiotes aloides*** L., ***Sagittaria sagittifolia*** L., ***Trapa natans*** L.

Nistru Chior



Lacul Adana



32. Ape curgătoare
3210. Râuri și maluri înmlăștinite

Specii tipice – ***Chenopodium rubrum*** L., ***Persicaria lapathifolia*** (L.) S.F.Gray, ***Persicaria hydropiper*** (L.) Spach, ***Bidens radiata*** Thuill., ***B. tripartita*** L., ***Eleocharis acicularis*** (L.) Roem. et Schult., ***Cyperus fuscus*** L., ***C. glaber*** L., ***Dichostylis micheliana*** (L.) Nees, ***Batrachium trichophyllum*** (Chaix) Bosch **(наземная форма),** ***Potentilla supina*** L.

Râul Nistru



6. Asociații naturale și seminaturale de ierburi

62. Asociații seminaturale aride de ierburi și arbuști

6210. Pajiști aride seminaturale

6210-ii Pajiști stepicole (*Festucetalia valesiacae*)

Specii tipice – ***Festuca valesiaca*** Gaudin, ***Adonis vernalis*** L., ***Euphorbia sequeriana*** Neck., ***Centaurea marschalliana*** Spreng., ***Clematis recta*** L., ***Salvia pratensis*** L., ***Stipa capillata*** L., ***S.pennata*** L., ***S. pulcherrima*** C.Koch, ***Pulsatilla nigricans*** Störk



6240. Asociațiile ierboase de stepă din preajma Mării Negre
6240(C). Stepele veritabile din regiunile fără păduri

Specii tipice – ***Festuca valesiaca*** Gaudin, ***Stipa lessingiana*** Trin. et Rupr., ***S. ucrainica*** P.Smirn., ***Koeleria cristata*** (L.) Pers., ***Agropyron pectinatum*** (M.Bieb.) Beauv., ***Stipa capillata*** L.**,** ***Poa angustifolia*** L., ***Salvia nutans*** L., ***Thymus marschallianus*** Willd., ***Adonis vernalis*** L., ***Artemisia austriaca*** Jacq., ***Astragalus onobrychis*** L., ***A. austriacus*** Jacq., ***Centaurea trinervia*** Steph., ***Crocus reticulatus*** Stev. ex Adams, ***Crambe tataria*** Sebeok, ***Goniolimon besserianum*** (Schult.) Kusn., ***Helichrysum arenarium*** (L.) Moench, ***Iris pumila*** L., ***Ornithogalum refracrum*** Schlecht.



6240(E). Stepele de păiuș-negară-polierbacee (de luncă și veritabile) din poienile cu stejar pufos de silvostepă

Speciile tipice – ***Festuca valesiaca*** Gaudin, ***Stipa lessingiana*** Trin. et Rupr., ***S. ucrainica*** P.Smirn., ***Koeleria cristata*** (L.) Pers., ***Agropyron pectinatum*** (M.Bieb.) Beauv., ***Stipa capillata*** L., ***Poa angustifolia*** L., ***Verbascum phoeniceum*** L., ***Salvia nutans*** L., ***S. pratensis*** L., ***Thymus marschallianus*** Willd., ***Inula hirta*** L., ***I. ensifolia*** L., ***Iris pumila*** L., ***I. variegata*** L., ***Jurinea multiflora*** (L.) B.Fedtsch., ***Adonis vernalis*** L., ***Achillea setacea*** Waldst. et Kit., ***Artemisia austriaca*** Jacq., ***Astragalus onobrychis*** L., ***A. austriacus*** Jacq., ***Centaurea trinervia*** Steph., ***Crocus reticulatus*** Stev. ex Adams, ***Goniolimon besserianum*** (Schult.) Kusn., ***Helichrysum arenarium*** (L.) Moench, ***Nepeta parviflora*** M.Bieb., ***Onobrychis arenaria*** (Kit.) DC., ***Ornithogalum refracrum*** Schlecht.



65. Asociațiile erbacee mezofile
6510. Fânețe de luncă

Sectoare de luncă cu umiditate sporită

Specii tipice – ***Phragmites australis*** (Cav.) Trin. ex Steud., ***Carex otrubae*** Podp., ***C. hirta*** L., **specii din genuri *Juncus* și *Agrostis***



Habitate cu umiditate suficientă

Specii tipice – ***Elytrigia repens*** (L.) Nevski, ***Festuca pratensis*** Huds., ***Poa pratensis*** L., ***P. trivialis*** L., ***Phleum pratense*** L., ***Alopecurus pratensis*** L., ***Lolium perenne*** L.



9. Păduri

91. Pădurile Europei temperate

91 E0. Păduri aluviale cu *Alnus glutinosa* și *Fraxinus excelsior*

Specii tipice – ***Fraxinus excelsior*** L., ***Populus nigra*** L., ***Salix alba*** *L.*, ***S. fragilis*** L., ***Ulmus glabra*** Huds., ***Rubus caesius*** L., ***Carex acutiformis*** Ehrh., ***C. sylvatica*** Huds., ***Cirsium oleraceum*** (L.) Scop., ***Filipendula ulmaria*** (L.) Maxim., ***Geranium sylvaticum*** L., ***Lycopus europaeus*** L., ***Lysimachia vulgaris*** L., ***Persicaria lapathifolia*** (L.) S.F.Gray, ***Rumex sanguineus*** L., ***Stellaria media*** (L.) Vill., ***Urtica dioica*** L.



91 I0. Păduri eurosiberiene cu specii *Quercus* spp.

Specii tipice – ***Quercus robur*** L., ***Acer campestre*** L., ***Crataegus monogyna*** Jacq., ***Euonymus verrucosa*** Scop., ***Ligustrum vulgare*** L., ***Prunus spinosa*** L.



91 AA. Păduri esteuropienecu *Quercus pubescens*

Specii tipice – ***Quercus pubescens*** Willd., ***Fraxinus excelsior*** L., ***Acer tataricum*** L., ***Sorbus domestica*** L., ***Cotinus coggygria*** Scop.



92 AO. Păduri de luncă din *Salix alba* și *Populus alba*

Specii tipice – ***Salix alba*** L., ***S. cinerea*** L., ***S. fragilis*** L., ***Populus alba*** L., ***P. nigra*** L., ***Viburnum opulus*** L., ***Swida sanguinea*** (L.) Opiz, ***Sambucus nigra*** L., ***Frangula alnus*** Mill., ***Phragmites australis*** (Cav.) Trin. ex Steud., ***Carex acutiformis*** Ehrh., ***C. riparia*** Curt., ***Rubus caesius*** L., ***Agrostis stolonifera*** L., ***Elytrigia repens*** (L.) Nevski, ***Aegopodium podagraria*** L., ***Poa pratensis*** L., ***Humulus lupulus*** L., ***Vitis sylvestris*** C.C.Gmel.



Regnul **Plantae** Haeckel – **Plante** – **Растения**

Conspectul speciilor de plante vasculare ale site-ului RAMSAR ”Nistrul de Jos”, incluse în diferite documente de protecție la nivel național și internațional, prezintă o listă adnotată a taxonilor, care se întâlnesc pe acest teritoriu. Împreună cu speciile rare, în Conspect sunt incluse și plantele neprotejate, dar destul de rare în Republica Moldova și biotopurile site-ului: *Alisma gramineum* Lej., *Eleocharis acicularis* (L.) Roem. et Schult., *Eleocharis uniglumis* (Link) Schult., *Geranium palustre* L., *Gratiola officinalis* L., *Leopoldia tenuiflora* (Tausch) Heldr., *Ornithogalum divergens* Boreau, *Pilosella* glaucescens (Bess.) Sojak, *Potamogeton berchtoldii* Fieb., *Rosa micrantha* Borrer ex Smith, *Rosa tschatyrdagi* Chrshan., *Spirodela polyrhiza* (L.) Schleid., *Tanacetum odessanum* (Klokov) Tzvel. Familiile și speciile în interiorul familiilor sunt plasate în mod alfabetic.

Pentru fiecare specie sunt prezentate următoarele caracteristici:

- denumirea în latină [187], română și rusă;
- apartenența la familie în limba latină [187], română și rusă;
- statutul (categoria de raritate);
- starea de protecție (includere în legislația ecologică a Republicii Moldova (categoriile de raritate ale speciilor protejate: I – specie dispărută, II – specie, amenințată cu dispariția, III – specie, efectivul căreia se micșorează catastrofal, ce poate să o pună în pericol de dispariție, IV – specie rară, V – specie nedeterminată, VI – specie restabilită, VII – specie insuficient studiată, VIII – specie, care nu provoacă îngrijorare) [199], Lista Operațională [190], Cartea Roșie a Republicii Moldova [9], Cartea Roșie a Transnistriei [112], Cartea Roșie a Ucrainei [185], Cartea Roşie a plantelor vasculare din România [8], Lista IUCN [21], Lista Roșie Europeană [6], Convenția de la Berna [11], Anexele la Directiva Habitat [14], Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatică pe cale de dispariție (CITES) [10];
- răspândirea generală [135-139, 178, 179];
- răspândirea în Republica Moldova [9, 30, 135-139];
- endemici și relicte;
- răspândirea pe teritoriul site-ului – afilierea la complexele naturale;
- afilierea la habitate;
- foto de Ghendov V.S., Ioniță O.V. și Tofan-Dorofeev E.V. Au fost folosite materialele site-urilor www.plantarium.ru și www.wikipedia.org

Flora și speciile rare de plante vasculare

În componența florei site-ului RAMSAR «Nistrul de Jos» au fost depistate cca **1000** specii de plante vasculare. Printre ele se întâlnesc multe specii de plante, ocrotite la nivel internațional și național – **105** specii [1, 9, 15-18, 23, 30-32, 35, 36, 68, 76, 78, 79, 94-105, 113, 129, 135-139, 143, 144, 146, 188, 189, 192, 193]. Ele diferă după gradul de raritate, sunt prezentate de populații cu diferit efeciv, răspândirea unora se limitează cu câteva puncte. Unele specii necesită măsuri speciale de conservare, mai ales sepciile cu înalte categorii de raritate. Pentru ele este nacesară organizarea unui monitoring al stării populațiilor locale.

Sub protecția statului în Republica Moldova se află 50 specii [199]: 22 specii amenințate cu dispariția (**categoria II**) – *Amygdalus nana* L., *Asparagus officinalis* L., *Asparagus tenuifolius* Lam., *Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow, *Carex rhizina* Blytt ex Lindb., *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova, *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin., *Colchicum triphyllum* G.Kunze, *Convolvulus lineatus* L., *Crambe tataria* Sebeok, *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams, *Helichrysum arenarium* (L.) Moench, *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt, *Nymphaea alba* L., *Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze, *Petasites hybridus* (L.) Gaertn., Mey. et Scherb., *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb., *Salvinia natans* (L.) All., *Seseli tortuosum* L., *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit., *Trapa natans* L., *Veratrum nigrum* L.; 4 specii, efectivul cărora se micșorează catastrofal de repede, ce le poate pune în pericol de dispariție (**categoria III**) – *Adonis vernalis* L., *Lunaria annua* L., *Utricularia vulgaris* L., *Vallisneria spiralis* L.; o specie (*Vitis sylvestris* C.C.Gmel.) se află în pericol de dispariție, de aceea că efectivul ei se micșorează catastrofal de repede (**categoriile II-III**); o specie (*Pyrus elaeagnifolia* Pall.) rară, care este amenințată cu dispariția (**categoriile II-IV**); o specie (*Euonymus nanus* M.Bieb.) rară, efectivul careea se micșorează catastrofal (**categoriile III-IV**); 9 specii rare (**categoria IV**) – *Achillea coarctata* Poir., *Astragalus albidus* Waldst. et Kit., *Astragalus dasyanthus* Pall., *Cerastium glutinosum* Fries, *Goniolimon besserianum* (Schult.) Kusn., *Listera ovata* (L.) R. Br., *Pulsatilla montana* (Hoppe) Reichenb., *Scorzonera mollis* M.Bieb., *Typha laxmannii* Lepech.; starea a 12 specii nu prezintă pericol de dispariție (**categoria VIII**) – *Asparagus verticillatus* L., *Hyacinthella leucophaea* (C.Koch) Schur, *Iris pumila* L., *Iris variegata* L., *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers., *Ornithogalum refractum* Schlecht., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, *Stipa lessingiana* Trin. et Rupr., *Stipa pennata* L., *Stipa pulcherrima* C.Koch, *Stipa ucrainica* P.Smirn., *Viburnum opulus* L.

Cele mai rare specii cu categorii de raritate majore sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova [9]: 9 specii critic periclitate (**categoria CR**) – *Achillea ochroleuca* Ehrh., *Carex rhizina* Blytt ex Lindb., *Colchicum triphyllum* G.Kunze, *Erodium ciconium* (L.) L`Her., *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt, *Medicago rigidula* (L.) All., *Pyrus elaeagnifolia* Pall., *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit., *Trapa natans* L.; 8 specii periclitate **(categoria EN**) – *Convolvulus lineatus* L., *Crambe tataria* Sebeok, *Nymphaea alba* L., *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers., *Potentilla astracanica* Jacq., *Salvinia natans* (L.) All., *Stipa tirsa* Stev., *Vitis sylvestris* C.C.Gmel.; 6 specii vulnerabile (**categoria VU**) – *Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow, *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin., *Cyperus glomeratus* L., *Euonymus nanus* M.Bieb., *Scirpus triqueter* L., *Scorzonera mollis* M.Bieb.

În Cartea Roșie a Transnistriei [112] sunt incluse 31 specii: 2 specii critic periclitate (**categoria CR**) – *Listera ovata* (L.) R.Br., *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit.; 4 specii periclitate (**categoria EN**) – *Astragalus excapus* L., *Nymphaea alba* L., *Petasites* hybridus (L.) Gaertn., Mey. et Scherb.; 24 specii vulnerabile (**categoria VU**) – *Adonis vernalis* L., *Asparagus tenuifolius* Lam., *Astragalus dasyanthus* Pall., *Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow, *Campanula persicifolia* L., *Convolvulus lineatus* L., *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams, *Helichrysum arenarium* (L.) Moench, *Hyacinthella leucophaea* (C.Koch) Schur, *Inula helenium* L., *Iris hungarica* Waldst. et Kit., *Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze, *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers., *Ornithogalum kochii* Parl., *Ornithogalum refractum* Schlecht., *Pulsatilla montana* (Hoppe) Reichenb., *Pulsatilla ucrainica* (Ugr.) Wissjul., *Salvinia natans* (L.) All., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, *Stipa pennata* L., *Stipa pulcherrima* C.Koch, *Stipa tirsa* Stev., *Trapa natans* L., *Veratrum nigrum* L. și o specie (*Colchicum triphyllum* G.Kunze) cu deficit de date (**categoria DD**).

În Lista Operațională, alcătuită în procesul de elaborare a Rețelei Ecoloice Naționale a Republicii Moldova au fost incluse 72 specii de plante [190].

Pe teritoriul site-ului se întâlnesc specii de plante, care sunt rare și în țările vecine – în Cartea Roșie a României sunt incluse 11 specii [8], dintre care 4 specii critic periclitate (*Carex rhizina* Blytt ex Lindb., *Convolvulus lineatus* L., *Elatine hydropiper* L., *Trifolium vesiculosum* Savi), o specie (*Bellevalia sarmatica* (Georgi) Woronow) periclitată, 5 specii (*Achillea coarctata* Poir., *Scorzonera mollis* M.Bieb., *Seseli tortuosum* L., *Stipa ucrainica* P.Smirn., *Symphytum tauricum* Willd.) vulnerabile și o specie (*Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit.) cu risc scăzut de dispariție.

În Carte Roșie a Ucrainei [185], sunt incluse 25 specii de plante care cresc pe teritoriul site-ului, dintre care 12 specii cu categoria "**Вразливий**" – *Astragalus dasyanthus* Pall., *Astragalus ponticus* Pall., *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin., *Colchicum triphyllum* G.Kunze, *Crambe tataria* Sebeok, *Euonymus nanus* M.Bieb., *Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) O.Kuntze, *Ornithogalum refractum* Schlecht., *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit., *Stipa pennata* L., *Stipa pulcherrima* C.Koch, *Stipa tirsa* Stev., 2 specii din categoria "**Рідкісний**" – *Arum orientale* M.Bieb., *Chamaecytisus rochelii* (Wierzb.) Rothm. și 11 specii de categoria "**Неоцінений**" – *Adonis vernalis* L., *Crocus reticulatus* Stev. ex Adams, *Listera ovata* (L.) R.Br., *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers., *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb., *Pulsatilla ucrainica* (Ugr.) Wissjul., *Salvinia natans* (L.) All., *Sorbus torminalis* (L.) Crantz, *Stipa lessingiana* Trin. et Rupr., *Stipa ucrainica* P.Smirn., *Trapa natans* L.

În Lista Roșie a Europei au fost incluse 6 specii (**categoria LC** nu este luată în calcul) [6]. Dintre acestea 2 specii sunt aproape de periclitate **(categoria NT**) – *Dichostylis micheliana* (L.) Nees, *Trapa natans* L. și 4 specii cu deficit de date (**categoria DD**) – *Iris hungarica* Waldst. et Kit., *Potamogeton compressus* L., *Pyrus elaeagnifolia* Pall., *Veronica euxina* Turrill.

Din Lista Convenției despre conservarea faunei sălbatice (Convenția Berna, 1979) [11] dintre speciile strict protejate au fost desemnate: *Crambe tataria* Sebeok, *Salvinia natans* (L.) All., *Trapa natans* L., *Veronica euxina* Turrill.

În Anexele II și IV a Directivei despre habitate (Directiva CE 92/43/EEC din 21 mai 1992 despre conservarea habitatelor și a faunei și florei sălbatice) [14] sunt incluse 2 specii – *Crambe tataria* Sebeok și *Iris hungarica* Waldst. et Kit.

În Convenția Internațională despre comercializarea speciilor de fauna și flora sălbatică (CITES) [10] sunt incluse 3 specii – *Adonis vernalis* L., *Platanthera chlorantha* (Cust.) Reichenb. și *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit.

Familia **Alismataceae** Vent. **– Alismatacee – Частуховые**

1. ***Alisma gramineum*** Lej. **– Limbariță graminee – Частуха злаковидная**


Alisma gramineum Lej. (=*Alisma loeselii* Gorski) **– Limbariță graminee – Частуха злаковидная**
Familia **Alismataceae** Vent. **– Alismataceae – Частуховые**



***Statutul*:** specie aproape amenințată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.



Răspândirea generală*:** Eurasia, America de Nord, Africa (Etiopia). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** aproape pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar-sporadic în lunca Nistrului (r-nul Ștefan-Vodă). Este indicată pe baza colecțiilor lui V.N.Andreev în 1947.



Familia **Alliaceae** J.Agardh **– Aliacee – Луковые**


1. ***Allium paniculatum*** L. **– Ceapă paniculată – Лук метельчатый**

Allium paniculatum L. **– Ceapă paniculată – Лук метёльчатый**
Familia **Alliaceae** J.Agardh **– Aliacee – Луковые**



Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** Europa Atlantică, Centrală și de Est (zona sudică), Crimeea, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** aproape pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate. Crește în grupuri cu abundența 1-2.





Familia **Amaryllidaceae** J.St.-Hil**. – Amarilidacee – Амариллисовые**

1. ***Sternbergia colchiciflora*** Waldst. et Kit. **– Ghiocel-de-toamnă – Штернбергия зимовникоцветная**

Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (=*Amaryllis colchiciflora* (Waldst. et Kit.) Ker-Gawl.). **– Ghiocel-de-toamnă – Штернбергия зимовникоцветная**

Familia **Amaryllidaceae** J.St.-Hil**. – Amarilidacee – Амариллисовые**




Statutul: specie critic periclitată – **CR.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și în Cartea Roşie a Transnistriei. Ca specie cu risc mic (categoria **LR**) inclusă în Cartea Roșie a României și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”). Este inclusă în Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES).

Răspândirea generală*:** Europa de Sud și Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar în r-nele Anenii Noi, Căușeni, Taraclia, Cahul. Specia se află la limita de nord a arealului. Relict cu areal disjunct. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar în complexele ”Copanca-Leuntea” și ”Tufa-Stânca Talmaza” în poienile stejăretelor cu stejar pufos, pe coline stepizate Crește solitar sau în grupuri a câte 3-7 exemplare cu abundența 1.





Familia **Apiaceae** Juss. **– Apiacee – Зонтичные**


1. ***Seseli tortuosum*** L. **– Zmeoae şerpuitoare – Жабрица извилистая**





Seseli tortuosum L. **– Zmeoae şerpuitoare – Жабрица извилистая**
Familia **Apiaceae** Juss. **– Apiacee – Зонтичные**

Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**) și inclusă în Lista Operațională, inclusă în Cartea Roșie a României ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).
***Răspândirea generală*:** peninsula Balcanică, Europa de Est, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Siberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic pe întreg teritoriul țării.
Pe teritoriul site-ului se întâlnește sporadic în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Cioburciu-Răscăieți” și ”Purcari”. ***Staționea***: coline stepizate, pășuni, pârloage. Creşte solitar sau în grupuri mici din câteva exemplare.






Familia **Araceae** Juss. **– Aracee – Ароидные**

1. ***Arum orientale*** M.Bieb. **– Aron oriental – Аронник восточный**

Arum orientale M.Bieb. **– Aron oriental – Аронник восточный**
Familia **Araceae** Juss. **– Aracee – Ароидные**




Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie periclitată (categoria **EN)** și Cartea Roșie a Ucrainei ca specie rară (categoria ”**Рідкісний**”).
Răspândirea generală**:** Europa Centrală și de Est (Rep. Moldova), Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică, Iran. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** raioanele împădurite. Relict terțiar. ***Pe teritoriul site-ului*** întâlnește în complexele ”Valea Turcului”, ”Valea Știubei”, ”Copanca-Leuntea”, ”Chițcani” și ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi” sub coronamentul pădurilor de stejar. Creşte solitar sau formează pâlcuri cu abundenţa 1-3.





Familia **Asparagaceae** Juss. **– Asparagacee.– Спаржевые**


1. ***Asparagus officinalis*** L. **– Sparanghel medicinal – Спаржа лекарственная**
2. ***Asparagus tenuifolius*** Lam. **– Umbra iepurelui – Спаржа тонколистная**
3. ***Asparagus verticillatus*** L. **– Sparanghel verticilat – Спаржа мутовчатая**




Asparagus officinalis L. – Sparanghel medicinal – Спаржа лекарственная
Familia **Asparagaceae** Juss. – **Asparagacee – Спаржевые**

Statutul: specie aproape ameninţată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II)** şi inclusă în Lista Operațională.





Răspândirea generală*:** regiunile temperate de pe întreg Globul: Europa (cu excepția regiunilor nordice), Africa de Nord, Asia Mică și Centrală, America de Nord, Australia și Noua Zeelandă. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Popeasca” și ”Cioburciu-Răscăieţi” în poiene şi margini de păduri, prin tufărişuri, coline cu vegetaţie de stepă. Creşte solitar sau în grupuri mici cu abundenţa 1-2.



Asparagus tenuifolius Lam. **– Umbra iepurelui – Спаржа тонколистная**
Familia **Asparagaceae** Juss. **– Asparagacee – Спаржевые**






Statutul: specie aproape amenințată – **NT.**
Starea de protecție: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Lista Operațională și în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).



Răspândirea generală*:** Europa de Est (vest), Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele împădurite. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți” și ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi” sub coronamentul luminos de pădure cu stejar pufos, poiene și liziere, tufărișuri. Crește, de regulă, în grupuri de 2-4 (-15) exemplare sau solitar, cu abundența 1-3.




Asparagus verticillatus L. **– Sparanghel verticilat – Спаржа мутовчатая**
Familia **Asparagaceae** Juss. **– Asparagacee – Спаржевые**



Statutul: specie aproape ameninţată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**) şi inclusă în Lista Operaţională.

Răspândirea generală*:** Europa de Est (Republica Moldova, zona sudică a Ucrainei). Peninsula Balcanică, Caucaz, Asia Mică şi Mijlocie, Iran. ***Răspândirea în Republica Moldova **:** bazinul fluviului Nistru, zona centrală şi sudică. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte frecvent, cu excepţia habitatelor din lunca Nistrului, pe coline stepizate, în lizierele pădurilor de stejar şi de stejar pufor, prin tufărişuri. Creşte solitar sau în grupuri cu abundenţa 1-2.





Familia **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**

1. ***Achillea coarctata*** Poir. **– Alunele comprimate – Тысячелистник сжатый**
2. ***Achillea ochroleuca*** Ehrh. **– Alunele palid-galbene – Тысячелистник бледножелтый**
3. ***Helichrysum arenarium*** (L.) Moench **– Siminoc arenicol – Цмин, Бессмертник**
4. ***Inula helenium*** L. **– Iarbă mare – Девясил высокий**
5. ***Petasites hybridus*** (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. **– Captalan – Белокопытник гибридный**
6. ***Pilosella glaucescens*** (Bess.) Sojak **– Vulturiţă glaucescentă – Ястребиночка сизоватая**
7. ***Scorzonera mollis*** M.Bieb. **– Lăptiucă moale – Козелец мягкий**
8. **Tanacetum odessanum** (Klokov) Tzvel. **– Vetrice-de-Odesa – Пижма одесская**








Achillea coarctata Poir. **– Alunică comprimată – Тысячелистник сжатый**
Familia **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**

Statutul: specie periclitată – **EN.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categorie **IV**) și inclusă în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roșie a României ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).
Răspândirea generală*:** Europa Centrală (sud-est) și de Est (sud-vest), peninsula Balcanică, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele sudice. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza” și ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate, poiene și liziere ale pădurilor uscate. Crește în grupuri mici cu abundența 1(2).




Achillea ochroleuca Ehrh. **– Alunică palid-galbenă – Тысячелистник бледножёлтый**
Familia **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**



Statutul: specie periclitată – **EN.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** peninsula Balcanică, sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona centrală **(**r-nul Anenii Noi), de sud-est (r-nul Ștefan-Vodă și UATSN) și de sud (r-nele Cimişlia, Taraclia, Cahul, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia). Se află la limita de nord a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește într-un singur loc – complexul ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate. Formează grupuri mici cu abundența 1(2).





Helichrysum arenarium (L.) Moench (=*Gnaphalium arenarium* L.). **– Siminoc arenicol – Цмин, Бессмертник**

Familia **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**




Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Lista Operațională, și în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).

Răspândirea generală**:** regiunea mediteraneeană, Europa, Siberia, Asia Mijlocie, Mongolia. Specie tipică pentru zonele de stepă și de silvostepă. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** sporadic pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Cioburciu-Răscăieţi” și ”Popeasca” pe coline stepizate, poiene și liziere ale pădurilor de stejar pufos. Crește în grupuri mici cu abundența 1-2.






Inula helenium L. **– Iarbă mare – Девясил высокий**
Familia **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**

Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).



Răspândirea generală**:** Eurasia. ***Răspândirea locală*****:** sporadic în zona nordică și centrală. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește rar în complexele ”Grădina Turcească” și ”Lunca Talmaza” în zăvoaie, lunci, pajiști umede, malul apelor. Formează grupuri mici.





Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. (=*Tussilago hybrida* L.) **– Captalan – Белокопытник гибридный**

Familia **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**




Statutul: specie periclitată – **EN.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Lista Operațională, inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie periclitată (categoria **EN**).



Răspândirea generală*:** Europa Atlantică, Centrală și de Est, Crimeea, regiunea mediteraneeană, Caucaz, ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar în zona centrală și sud-estică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar în complexul ”Tudora-Palanca” pe margina pădurii de luncă cu plop alb, malurile canalelor de irigare. Formează pâlcuri din câteva exemplare cu abundența 1-2.



Pilosella glaucescens (Bess.) Sojak (=*Hieracium glaucescens* Bess.). **– Vulturiţă glaucescentă – Ястребиночка сизоватая**

Familia **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**




Statutul: specie aproape ameninţată – **NT.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.

Răspândirea generală**:** Europa Centrală şi de Sud-Est, regiunea mediteraneeană (est), Asia Mică. ***Răspândirea locală*****:** rară, în zona centrală şi de sud-est. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte sporadic în complexele ”Copanca-Leuntea” şi ”Cioburciu-Răscăieţi” pe pajişti, coline uscate, în lizierele pădurilor cu stejar pufos. Vegetează în grupuri cu abundenţa 1-2.






Scorzonera mollis M.Bieb. (=*Podospermum molle* (Bieb.) Fisch. et Mey.) **–**
Lăptiucă moale – Козелец мягкий
Familia **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**



Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ed. a III-a, și în Lista Operațională, în Cartea Roşie a României ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).

Răspândirea generală*:** Europa de Est (centru și sud), Crimeea, peninsula Balcanică, Asia Mică, Precaucazia. ***Răspândirea locală*:** bazinul fluviului Nistru și zona sudică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar în complexul ”Cioburciu-Răscăieţi” în lizierele şi poienile pădurilor de gârneț cu vegetație de stepă, pe pante abrupte ale albiei vechi ale Nistrului. Crește solitar sau în grupuri din câteva exemplare cu abundența 1.





Tanacetum odessanum (Klokov) Tzvel. (=*Pyrethrum odessanum* Klokov). **– Vetrice-de-Odesa – Пижма одесская**

Familia **Asteraceae** Dumort. **– Asteracee – Астровые**




Statutul: specie critic periclitată – **CR.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.

Răspândirea generală*:** Europa de Est (zona sudică). Endemit pontic. ***Răspândirea locală*:** rar în zona centrală și sudică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar în complexul ”Cioburciu-Răscăieţi”, pe coline stepizate, pante cu dezgoliri calcaroase. Formează grupuri cu abundența 1-2.





Familia **Berberidaceae** Juss. **– Berberidacee – Барбарисовые**

1. ***Berberis vulgaris*** L. **– Dracilă comună – Барбарис обыкновенный**

Berberis vulgaris L. **– Dracilă comună – Барбарис обыкновенный**
Familia **Berberidaceae** Juss. **– Berberidacee – Барбарисовые**




Statutul: specie aproape amenințată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.

Răspândirea generală**:** Europa, Caucaz, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** sporadic în raioanele cu vegetație de silvostepă din nord și sud. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește rar în complexele ”Copanca-Leuntea” și ”Tufa-Stânca Talmaza” în lizierele de pădure cu stejar pufos, plantații de culturi silvice. Formează grupuri cu abundența 2(3).







Familia **Boraginaceae** Juss. **– Boraginacee – Бурачниковые**


1. ***Symphytum tauricum*** Willd.**– Tătăneasă de-Crimeea – Окопник крымский**

Symphytum tauricum Willd. (=*Symphytum orientale* L.) **–**
Tătăneasă de-Crimeea – Окопник крымский
Familia **Boraginaceae** Juss. **– Boraginacee – Бурачниковые**



Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Cartea Roşie a României ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).
Răspândirea generală**:** Europa Centrală (România, Bulgaria) și de Est (zona de stepă și silvostepă), Crimeea, Caucaz, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** sporadic pe întreg teritoriul, cu excepția raioanelor sudice. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexul ”Grădina Turcească” în liziera pădurii de luncă. Crește în grupuri mici cu abundența 1.





Familia **Brassicaceae** Burnett **– Brasicacee – Капустные**

1. ***Crambe tataria*** Sebeok **– Hodolean tătăresc – Катран татарский**
2. ***Lunaria annua*** L. **– Lopăţea anuală – Лунник однолетний**

Crambe tataria Sebeok **– Hodolean tătăresc – Катран татарский**

Familia **Brassicaceae** Burnett **– Brasicacee – Капустные**




Statutul: specie periclitată – **EN.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN**) și în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”), în Anexele II și IV a Directivei privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică și în Convenția de la Berna, privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa.

Răspândirea generală*:** Europa Centrală (Ungaria, România) şi de Est (sud), regiunea mediteraneeană (Bulgaria), Caucaz, Siberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar pe întreg teritoriul, cu excepția raioanelor nord-estice și sud-vestice. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea” și ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate. Crește solitar cu abundența 1(2).






Lunaria annua L. **– Lopăţea anuală – Лунник однолетний**
Familia **Brassicaceae** Burnett **– Brasicacee – Капустные**

Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **III**).





Răspândirea generală*:** Europa de Sud. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică în districtele silvice. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Grădina Turcească” în pădure de luncă. Crește în grupuri mici cu abundența 1(2).



Familia **Campanulaceae** Juss. **– Campanulacee – Колокольчиковые**


1. ***Campanula persicifolia*** L. **– Clopoţel persicifoliu – Колокольчик персиколистный**

Campanula persicifolia L. – Clopoţel persicifoliu – Колокольчик персиколистный
Familia **Campanulaceae** Juss. – **Campanulacee – Колокольчиковые**





Statutul: specie neamenințată – **LC.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**)**.**





Răspândirea generală*:** aria acoperă aproape toată Europa (cu excepția Arcticului) și Siberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** comună în raioanele împădurite. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi” sub coronamentul luminos. Crește solitar sau în grupuri din câteva exemplare cu abundența 1.

Familia **Caryophyllaceae** Juss. **– Cariofilacee – Гвоздиковые**

1. ***Cerastium glutinosum*** Fries. **– Cănăriţă glutinoasă – Ясколка клейкая**
2. ***Dianthus capitatus*** Balb. ex DC. **– Garofița capitată – Гвоздика головчатая**


Cerastium glutinosum Fries. (=*Cerastium ucrainicum* Pacz. ex Klokov) **–**
Cănăriţă glutinoasă – Ясколка клейкая
Familia **Caryophyllaceae** Juss. **– Cariofilacee – Гвоздиковые**



Statutul: specie neameninţată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**).



Răspândirea generală**:** peninsula Scandinavă, Europa Atlantică, Centrală şi de Est, Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică; introdusă în America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** sporadică pe întreg teritoriul Moldovei.



Pe teritoriul site-ului se întâlnește sporadic pe colinele stepizate, margini de păduri, locuri ruderalizate, terenuri cultivate. Crește în grupuri mici cu abundența 1-2.

Dianthus capitatus Balb. ex DC. **– Garofița capitată – Гвоздика головчатая**


Familia **Caryophyllaceae** Juss. **– Cariofilacee – Гвоздиковые**



Statutul: specie critic periclitată – **CR**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.

Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Est (sud) Crimeea (sud), regiunea mediteraneeană, Asia Mică, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar pe întreg teritoriu. Se află la limita de nord al arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Copanca-Leuntea” în poienile pădurilor de gârneț.





Familia **Celastraceae** R.Br. **– Celastracee – Бересклетовые**

1. ***Euonymus nanus*** M.Bieb. **– Vonicer pitic – Бересклет карликовый**

Euonymus nanus M.Bieb. **– Vonicer pitic – Бересклет карликовый**
Familia **Celastraceae** R.Br. **– Celastracee – Бересклетовые**




Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III-IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), în Lista Operațională și Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).

Răspândirea generală**:** Mongolia, China, Ucraina, Moldova, Crimeea, Caucazul de Nord, Polonia, România. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** zona centrală (r-nele Glodeni, Ungheni, Călăraşi, Străşeni) și bazinul fluviului Nistru (r-nele Şoldăneşti, Orhei, Dubăsari, Căuşeni, UATSN). Se află la limita de sud a arealului. Relict terțiar.

Pe teritoriul site-ului se întâlnește într-un singur loc – complexul ”Grădina Turcească”, în pădure de luncă cu plop alb. Formează pâlcuri cu abundența 2.





Familia **Convallariaceae** Horan. **– Convalariacee – Ландышевые**


1. ***Maianthemum bifolium*** (L.) F.W.Schmidt **– Umbrăvioară bifolie – Майник двулистный**

Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt (=*Convallaria bifolia* L.) **–**
Umbrăvioară bifolie – Майник двулистный
Familia **Convallariaceae** Horan. **– Convalariacee – Ландышевые**



Statutul: specie critic periclitată –**CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și în Lista Operațională.
Răspândirea generală**:** Europa, Siberia, Mongolia, China și Japonia. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** bazinul fluviului Nistru și raionul Ungheni. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexul ”Grădina Turcească” în pădure [143, 144].





Familia **Convolvulaceae** Juss. **– Convolvulacee – Вьюнковые**


1. ***Convolvulus lineatus*** L. **– Volbură liniată – Вьюнок линейчатый**

Convolvulus lineatus L. **– Volbură liniată – Вьюнок линейчатый**
Familia **Convolvulaceae** Juss. **– Convolvulacee – Вьюнковые**





Statutul: specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitaă (categoria **EN**) și în Lista Operațională, inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și Cartea Roşie a României ca specie critic periclitată (categoria **CR**).
Răspândirea generală**:** regiunea mediteraneeană, Câmpia Est-Europeană, Crimeea, Siberia Apuseană, Asia Mică şi Centrală, Caucaz, Iran. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** bazinul fluviului Nistru Mediu și Inferior. Se află la limita de nord a arealului. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește foarte rar, numai în complexul ”Popeasca” pe colinele stepizate erodate. Formează grupuri cu abundența 2(3).



Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**

1. ***Carex caryophyllea*** Latourr. **– Rogoz cariofiloid – Осока гвоздиковая**
2. ***Carex pseudocyperus*** L. **– Rogoz pseudociperoid – Осока ложносытевая**
3. ***Carex rhizina*** Blytt ex Lindb.**– Rogoz rizineu – Осока корневищная**
4. ***Cyperus glomeratus*** L. **– Ciufă glomerată – Сыть скученная**
5. ***Dichostylis micheliana*** (L.) Nees **– Dihostil Micheli – Дихостилис Микели**
6. ***Eleocharis acicularis*** (L.) Roem. et Schult. – **Pipiriguţ acicular – Болотница игольчатая**
7. ***Eleocharis uniglumis*** (Link) Schult. **– Pipiriguţ uniglum – Болотница одночешуйная**
8. ***Juncellus serotinus*** (Rottb.) C.B. Clarke **– Juncel tardiv – Ситничек поздний**
9. ***Scirpus triqueter*** L. **– Ţipirig trigonal – Камыш трехгранный**


Carex caryophyllea Latourr. **– Rogoz cariofiloid – Осока гвоздиковая**
Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**



Statutul: specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.



Răspândirea generală*:** Europa, Asia de Vest (Turcia, Iran), America de Nord, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Tufa-Stânca Talmaza” și ”Cioburciu-Răscăieţi” în poienile pădurilor aride cu stejar pufos. Vegetează în grupuri, uneori formează pâlcuri cu abundența 1-2(3).




Carex pseudocyperus L. **– Rogoz pseudociperoid – Осока ложносытевая**
Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**



Statutul: specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** Eurasia, America de Nord și Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona centrală (r-nul Orhei) și de sud-est (r-nul Ștefan-Vodă). ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în albia veche înmlăștinită a fluviului Nistru, în complexul ”Răscăieți-Olănești” și în complexul ”Diculi-Kuța-Mațarinskii”. Crește în grupuri cu abundența 1.





Carex rhizina Blytt ex Lindb. (=*C. pediformis* C.A.Mey. subsp. *rhizodes* (Blytt ex Meinsh.) Lindb. fil.) **– Rogoz rizineu – Осока корневищная**


Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**





Statutul: specie critic periclitată – **CR**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și în Cartea Roșie a României ca specie critic periclitată (categoria **CR**).






Răspândirea generală*:** Europa de Nord, Centrală (partea de est) și Orientală, Caucaz, Siberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** bazinul fluviului Nistru. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar în complexul ”Diculi-Cuța-Mațarinskii” în păduri de stejar, poiene. Crește în grupuri mici cu abundența 1.

Cyperus glomeratus L. **– Ciufă glomerată – Сыть скученная**
Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**



Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** Eurasia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** lunca fluviului Nistrul Inferior și a râului Prut în zona centrală și sudică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii” pe malurile lacurilor, luncile înmlăștinite. Crește solitar sau dens-cespitos cu abundența 1.






Dichostylis micheliana (L.) Nees (=*Cyperus michelianus* (L.) Link.) **–**
Dihostil Micheli – Дихостилис Микели
Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**

Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională, în Lista Roșie a Europei ca specie aproape amenințată (categoria **NT**).

Răspândirea generală*:** Europa Centrală (România) și de Est (partea de sud), regiunea mediteraneeană, Asia Mijlocie, Siberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** bazinul fluviului Nistru și râului Prut. Specia se află la limita de sud a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească” și ”Tudora-Palanca” pe terenurile apătoase din luncă. Crește în grupuri cu abundența 1-2(3).








Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. (=*Scirpus acicularis* L.) –
Pipiriguţ acicular – Болотница игольчатая
Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**

Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.


Răspândirea generală*:** Eurasia și America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** în sudul fluviului Nistru și a râului Prut. ***Pe teritoriul sitului se întâlnește foarte rar, este cunoscută numai din complexul ”Tudora-Palanca”, în locurile mlăștinoase și băltoase de-a lungul fluviului Nistru. Formează grupuri, uneori aglomerații cu abundența 1-2.



Eleocharis uniglumis (Link) Schult. (=*Scirpus uniglumis* Link, *Eleocharis euuniglumis* Zinserl.) **–**
Pipiriguţ uniglum – Болотница одночешуйная
Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**



Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.
***Răspândirea generală*:** Eurasia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rară aproape pe întreg teritoriul țării.
Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Lunca Olăneşti-Crocmaz” în locuri mlăștinoase și băltoase ale Nistrului Inferior. Formează grupuri cu abundența 1-2.






Juncellus serotinus (Rottb.) C.B. Clarke (=*Cyperus serotinus* Rottb.)
Juncel tardiv – Ситничек поздний.
Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**




Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională. Inclusă în Lista Roșie a Europei ca specie neamenințată (categoria **LC**).
Răspândirea generală*:** Eurasia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona sud-estică. ***Pe teritoriul site-ului este colectată și indicată de pe malul stâng al Nistrului, mai jos de locul revărsării râului Turunciuc în fluviul Nistru [143, 144]. ***Staţiunea***: luncile inundabile. Vegetează în grupuri.





Scirpus triqueter L. (=*Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla). **– Ţipirig trigonal – Камыш трехгранный**
Familia **Cyperaceae** Juss. **– Ciperacee – Осоковые**

Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).
Răspândirea generală*:** Eurasia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** lunca fluviului Nistru. ***Pe teritoriul site-ului se întâlneşte sporadic în lunca fluviului Nistru – în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Tudora-Palanca” şi ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii” în locuri mlăştinoase şi băltoase de-a lungul fluviului. Formează grupuri cu abundenţa 1-2.






Familia **Elatinaceae** Dumort. **– Elatinacee – Повойничковые**

1. ***Elatine hydropiper*** L. **– Piperul apei – Повойничек водяной перец**

Elatine hydropiper L. **– Piperul apei – Повойничек водяной перец**
Familia **Elatinaceae** Dumort. **– Elatinacee – Повойничковые**

Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Cartea Roșie a României ca specie critic periclitată (categoria **CR**).
Răspândirea generală*:** regiunea mediteraneeană, Europa, Caucaz, Siberia, Extremul Orient. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona sud-estică a țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește numai în complexul ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi” în ape stătătoare, terenuri inundabile. Formează pâlcuri mici cu abundența 1.






Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**

1. ***Astragalus albidus*** Waldst. et Kit. **– Coşaci alburiu – Астрагал беловатый**
2. ***Astragalus dasyanthus*** Pall. **– Zăvăcustă – Астрагал шерстистоцветковый**
3. ***Astragalus exscapus*** L. **– Coşaci acaul – Астрагал бесстебельный**
4. ***Astragalus ponticus*** Pall. **– Coşaci pontic – Астрагал понтийский**
5. ***Chamaecytisus lindemannii*** (V.Krecz.) Klásková **– Drob Lindeman – Ракитник Линдемана**
6. ***Chamaecytisus rochelii*** (Wierzb.) Rothm. **– Drob Roşel – Ракитник Рошеля**
7. ***Chamaecytisus ruthenicus*** (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková **– Drob rusesc – Ракитник русский**
8. ***Lathyrus aphaca*** L. **– Măzăroi afil – Чина безлисточковая**
9. ***Medicago rigidula*** **(L.) All. – Lucernă rigidiusculă – Люцерна жестковатая**
10. ***Trifolium vesiculosum*** **Savi – Trfoi veziculos – Клевер пузырчатый**






Astragalus albidus Waldst. et Kit. (=*Astragalus vesicarius* auct., non L.) **– Coşaci alburiu – Астрагал беловатый**
Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**

Statutul*:* specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**) și inclusă în Lista Operațională.

Răspândirea generală**:** Europa Centrală (sud-est) şi de Est (sud), Crimeea, regiunea mediteraneeană. Specie rară pe întreg arealul de răspândire. ***Răspândirea în Republica Moldova***: raioanele de nord-est, centrale și de sud. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexul ”Popeasca” pe coline stepizate, tufărişuri. Creşte în grupuri mici cu abundenţa 1(2) sau solitar.



Astragalus dasyanthus Pall. **– Zăvăcustă – Астрагал шерстистоцветковый**

Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**






Statutul: specie aproape ameninţată – **NT.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova ocrotită de stat (categoria **IV**), inclusă în Lista Operaţională şi în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), inclusă în Cartea Roşie Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”**).**

***Răspândirea generală*:** Europa Centrală (sud-est) şi de Est (sud), Crimeea (zona de stepă), peninsula Balcanică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică, preponderent în zona centrală şi sudică. Se află la limita de nord a arealului.






Pe teritoriul site-ului se întâlneşte în complexul ”Popeasca” pe coline stepizate. Creşte în grupuri mici a câte 5-8 exemplare, cu abundenţa 1(2) sau solitar.

Astragalus exscapus L. **– Coşaci acaul – Астрагал бесстебельный**
Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**



Statutul: specie vulnerabiltă – **VU.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie periclitată (categoria **EN**) și în Lista Operațională.





Răspândirea generală*:** Europa Centrală şi de Est (sud-vest), regiunea mediteraneeană. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică pe întreg teritoriul ţării. Se află la limita de nord a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește se întâlnește într-un singur complex ”Tufa-Stânca Talmaza” pe coline stepizate. De regulă creşte solitar c abundenţă 1.

Astragalus ponticus Pall. **– Coşaci pontic – Астрагал понтийский**
Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**




Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Ucrainei ca specie vulnerabilă (categoria "**Вразливий**")**.**

***Răspândirea generală*:** Europa Centrală (România) şi de Est (sud), Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** bazinul fluviului Nistru şi râului Prut, zona centrală şi de sud. Se află la limita de nord a arealului.




Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele "Copanca-Leuntea", "Tufa-Stânca Talmaza", "Popeasca", "Cioburciu-Răscăieţi" şi "Purcari" în poienile pădurilor aride de stejar, coline stepizate. Formează grupuri din câteva exemplare cu abundenţa 1-2.



Chamaecytisus lindemannii (V.Krecz.) Klásková (=*Cytisus lindemannii* V.Krecz.) **– Drob Lindeman – Ракитник Линдемана**
Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**



Statutul: specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** Europa Centrală (România) şi de Est (sud), Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Purcari”, pe coline stepizate, tufărişuri. Formează grupuri mici cu abundența 1.






Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. (=*Cytisus rochelii* Wierzb.) **– Drob Roşel – Ракитник Рошеля**
Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**





Statutul: specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: inclusă în Lista Operațională și in Cartea Roşie Ucrainei ca specie rară (categoria "**Рідкісний**").
Răspândirea generală*:** Europa Centrală (sud-est) şi de Est (R. Moldova), regiunea mediteraneeană. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică pe întreg teritoriul țării. Se află la limita de est a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele "Cioburciu-Răscăieţi" și "Purcari" în poieni şi tufărişuri, coline stepizate. Crește în grupuri mici cu abundența 1.



Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková (=*Cytisus ruthenicus* Fisch. ex Wołoszcz.) **– Drob rusesc – Ракитник русский**


Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**

Statutul: specie critic periclitată – **CR**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**). Inclusă în Lista Operațională.



Răspândirea generală*:** Europa Centrală (est) şi de Est, Crimeea, Caucaz, Siberia de Vest (sud-vest). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona centrală și sudică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în comlexul ”Cioburciu-Răscăieți” pe coline stepizate și liziere de pădure de gârneț. Formează grupuri din câteva exemplare cu abundența 1(2).






Lathyrus aphaca L. **– Măzăroi afil – Чина безлисточковая**
Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**



Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.

Răspândirea generală*:** Europa Atlantică, Centrală şi de Est (sud), Crimeea, Asia Mică şi Mijlocie, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona centrală (r-nul Străşeni) şi sud-estică (r-nul Căuşeni). ***Pe teritoriul site-ului se întâlneşte în complexul ”Copanca-Leuntea” în păduri, liziere. Creşte solitar sau formează grupuri mici din câteva exemplare cu abundența 1.






***Medicago rigidula* (L.) All.** (=*Medicago polymorpha* L. var. *rigidula* L.) **–**
Lucernă rigidiusculă – Люцерна жестковатая
Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**

Statutul: specie critic periclitată – **CR.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**).



Răspândirea generală*:** sudul Europei de Est, Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică şi Mijlocie, Iran, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sud-estul țării. Se află la limita de nord a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în rezervaţia naturală silvică ”Copanca” în cadrul complexului ”Copanca-Leuntea” în liziera pădurii de stear pufos cu vegetaţie de stepă primară. Crește în grupuri mici.






***Trifolium vesiculosum* Savi** (=*Trifolium turgidum* M.Bieb., *Amoria vesiculosa* (Savi) Roskov) **– Trfoi veziculos – Клевер пузырчатый**
Familia **Fabaceae** Lindl. **– Fabacee – Бобовые**



Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roşie a României ca specie critic periclitată (categoria **CR**).

Răspândirea generală*:** Europa de Est (Moldova, Ucraina de sud-vest), Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona centrală și bazinul fluviului Nistru inferior. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește pe colinele stepizate în complexele ”Cioburciu-Răscăieţi” și ”Purcari”. Crește în grupuri mici cu abundența 1(2).





Familia **Geraniaceae** Juss. **– Geraniacee – Гераниевые**

1. ***Erodium ciconium*** (L.) L`Her. **– Pliscul berzei – Аистник аистовый**
2. ***Erodium ruthenicum*** M.Bieb. **– Priboi rusesc – Аистник русский**
3. ***Geranium palustre*** L. **– Geraniu palustru – Герань болотная**


Erodium ciconium (L.) L`Her. (=*Geranium cyconium* L.) **– Pliscul berzei – Аистник аистовый**
Familia **Geraniaceae** Juss. **– Geraniacee – Гераниевые**

Statutul: specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și în Lista Operațională.





Răspândirea generală*:** Europa Atlantică, Centrală şi de Est (sud), Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică şi Mijlocie, Iran, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona sud-estică a țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Copanca-Leuntea”, în liziera pădurilor cu stejar pufos, cu vegetaţie de stepă cu dominarea păiușului (*Festuca valesiaca*) şi speciilor din genul *Stipa*. Creşte solitar sau în grupuri mici cu abundenţa 1-2.




Erodium ruthenicum M.Bieb. (=*Erodium serotinum* Stev.) **–**
Priboi rusesc – Аистник русский
Familia **Geraniaceae** Juss. **– Geraniacee – Гераниевые**



Statutul: specie regional dispărută – **RE.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.

Răspândirea generală**:** Europa Centrală şi de Est (sud), (?)Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** rar în zona de sud-est. ***Pe teritoriul site-ului*** este cunoscută dintr-un singur loc, în complexul ”Chițcani” pe coline stepizate (se indică în baza colectărilor lui Tr. Săvulescu, 1934).






Geranium palustre L. **– Geraniu palustru – Герань болотная**
Familia **Geraniaceae** Juss. **– Geraniacee – Гераниевые**



Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.

Răspândirea generală*:** peninsula Scandinavă, Europa, regiunea mediteraneeană, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rară, cu excepția raioanelor din sud. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Grădina Turcească”, în lunca umedă pe malul Nistrul Vechi.





Familia **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**

1. ***Hyacinthella leucophaea*** (C.Koch) Schur **– Zambilă albicioasă – Гиацинтик светло-голубой**
2. ***Bellevalia sarmatica*** (Georgi) Woronow **– Belevalie sarmaţiană – Бельвалия сарматская**
3. ***Leopoldia tenuiflora*** (Tausch) Heldr. **– Leopoldie tenuifloră – Леопольдия тонкоцветковая**
4. ***Ornithogalum boucheanum*** (Kunth) Aschers. **– Celnuşă Luşcă – Птицемлечник Буше**
5. ***Ornithogalum divergens*** Boreau **– Celnuşă divergentă – Птицемлечник расходящийся**
6. ***Ornithogalum kochii*** Parl. **– Celnuşă Koch – Птицемлечник Коха**
7. ***Ornithogalum refractum*** Schlecht. **– Celnuşă răsfrântă – Птицемлечник преломленный**

Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow (=*Hyacinthus sarmatica* Pall. ex Georgi) **– Belevalie sarmaţiană – Бельвалия сарматская**


Familia **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**



Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova și în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria VU), în Lista Operațională. Ca specie periclitată (categoria **EN**) este inclusă în Cartea Roșie a României.

Răspândirea generală*:** Câmpia Est-Europeană, în Crimeea, Precaucazia, România, Bulgaria. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele Fălești, Sângerei, Telenești, Căușeni, Cimișlia, Taraclia, Anenii Noi, mun. Chișinău, UTAG, UATSN. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Popească”, în liziere cu vegetație de stepă. Crește solitar sau în grupuri mici cu abundența 1.








Hyacinthella leucophaea (C.Koch) Schur (=*Muscari leucophaea* C.Koch) **–**
Zambilă albicioasă – Гиацинтик светло-голубой
Familia **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**



Statutul: specie aproape ameninţată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**). Inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).
Răspândirea generală*:** Ucraina, Moldova, România, Bulgaria, Asia Mică. Endemit ponto-balcanic. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică aproape pe întreg teritoriul țării. Specia se află la limita de nord a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate, în poienile pădurilor cu *Quercus pubescens.* Crește în grupuri dispersate cu abundența 1-2.






Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr. (=*Muscari tenuiflorum* Tausch) **–**
Leopoldie tenuifloră – Леопольдия тонкоцветковая
Familia **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**

Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.



Răspândirea generală*:** Europa, Caucaz, regiunea mediteraneeană, Asia Mică, Iran. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică pe înterg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Copanca-Leuntea”. Crește solitar sau în grupuri mici, în lizierele pădurilor de stejar pufos.




Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. (=*Myogalum boucheanum* Kunth) **–**
Lușcă Bouche – Птицемлечник Буше
Familia **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**



Statutul: specie periclitată – **EN.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN**), în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоцінений”**).

Răspândirea generală*:** Europa Atlantică și Centrală, Ucraina, Moldova, peninsula Balcanică, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** bazinul fluviului Nistru, raioanele centrale și sudice. ***Pe teritoriul sitului se întâlnește foarte rar, numai în complexul ”Chiţcani” – în pădurea de luncă cu stejar pedunculat. Formează grupuri mici cu abundența 1-2 (3).






Ornithogalum divergens Boreau **–**
Celnuşă divergentă – Птицемлечник расходящийся
Familia **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**



Statutul: specie cu date deficitare – **DD**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.
Răspândirea generală*:** Europa Centrală și Sudică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona de sud-est (r-nul Căușeni). ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar, numai în complexul ”Copanca-Leuntea” în padurea aridă de stejar pufos cu vegetație stepică. Se indică în baza colectărilor din anul 1977.





Ornithogalum kochii Parl. (=*Ornithogalum tenuifolium* Guss.) **– Celnuşă Koch – Птицемлечник Коха**

Familia **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**




Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Lista Operațională și în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).

Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Est (sud-vest), Caucaz, regiunea mediteraneeană, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova: bazinul fluviului Nistru și râului Prut, zona sudică. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește rar în complexul ”Cioburciu-Răscăieţi” în poienile cu vegetație de stepă ale pădurilor subaride, tufărișuri. Crește în grupuri dispersate cu abundența 1-2.





Ornithogalum refractum Schlecht. **– Celnuşă răsfrântă – Птицемлечник преломленный**
Familia **Hyacinthaceae** Batsch **– Hiacintacee – Гиацинтовые**






Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**


Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și inclusă în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий”**).


Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Est (sud-vest), peninsula Balcanică, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona centrală și sudică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește sporadic în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza” și ”Cioburciu-Răscăieţi” în poiene și liziere ale pădurilor cu stejar pufos, pe coline stepizate. Formează grupuri mici sau pâlcuri cu abundența 2-3.



Familia **Hydrocharitaceae** Juss. **– Hidrocaritacee – Водокрасовые**

1. ***Hydrocharis morsus-ranae*** L. **– Iarba broaştelor – Водокрас обыкновенный**
2. ***Vallisneria spiralis*** L. **– Sârmuliţă spiralată – Валлиснерия спиральная**






Hydrocharis morsus-ranae L. **– Iarba broaştelor –**
Водокрас обыкновенный
Familia **Hydrocharitaceae** Juss. **– Hidrocaritacee – Водокрасовые**

Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională. Inclusă în Lista Roșie a Europei ca specie neamenințată (categoria **LC**).

Răspândirea generală*:** Eurasia și Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar-sporadic în Transnistria, raioanele Cahul, Ştefan-Vodă, Teleneşti, Glodeni. Specia se află la limita de sud a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi” în apele stagnante sau lin curgătoare. Formează pâlcuri mici sau, uneori, desișuri natante.



Vallisneria spiralis L. **– Sârmuliţă spiralată – Валлиснерия спиральная**


Familia **Hydrocharitaceae** Juss. **– Hidrocaritacee – Водокрасовые**



Statutul: specie periclitată – **EN**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **III**) și inclusă în Lista Operațională.

Răspândirea generală**:** Eurasia și Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** preponderent în apele Nistrului (r-nele Dubăsari, Ştefan-Vodă) şi a Prutului (r-nele Glodeni, Cahul). ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește rar în complexele ”Grădina Turcească” și ”Lunca Talmaza” în apele stagnante sau lin curgătoare. Formează pâlcuri cu abundența 1-2.



Familia **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**

1. ***Crocus reticulatus*** Stev. ex Adams **– Şofrănel – Шафран сетчатый**
2. ***Iris hungarica*** Waldst. et Kit. **– Stânjenel unguresc – Касатик венгерский**
3. ***Iris pumila*** L. **– Stânjenel scund – Касатик карликовый**
4. ***Iris variegata*** L. **– Stânjenel vărgat – Касатик пестрый**

Crocus reticulatus Stev. ex Adams (=*Crocus variegatus* Hoppe et Hornsch.) **– Şofrănel reticulat – Шафран сетчатый**

Familia **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**




Statutul: specie aproape ameninţată – **NT.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**) şi inclusă în Lista Operaţională, în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) şi în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоцінений**”).

Răspândirea generală*:** Europa Centrală şi de Est, regiunea mediteraneeană, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele centrale, sudice şi de est. Specia se află la limita de nord a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlneşte frecvent (cu excepţia luncii Nistrului) pe colinele însorite cu vegetaţie de stepă, pajiştile stepizate, în poienile şi lizierele din pădurile cu stejar pufos. Creşte în grupuri dispersate sau în pâlcuri mai mari cu abundenţa 2-3.






Iris hungarica Waldst. et Kit. **– Stânjenel unguresc – Касатик венгерский**
Familia **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**



Statutul: specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).

Răspândirea generală*:** Europa de Sud-Est, regiunea mediteraneeană, Caucaz, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele centrale și sudice. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Tufa-Stânca Talmaza” și ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline însorite cu vegetaţie de stepă, poienile și lizierele pădurilor cu stejar pufos. Creşte în grupuri dispersate sau în pâlcuri cu abundenţa 1-2.






Iris pumila L. (=*Iris aequiloba* Ledeb.) **– Stânjenel scund – Касатик карликовый**
Familia **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**




Statutul: specie aproape ameninţată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**).
Răspândirea generală*:** Europa de Sud-Est, regiunea mediteraneeană, Caucaz, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele centrale, sudice și de est. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Tufa-Stânca Talmaza” și ”Cioburciu-Răscăieți”, pe coline însorite cu vegetaţie de stepă, în pajiști stepizate, poienile și lizierele pădurilor cu stejar pufos. Creşte în grupuri dispersate sau în pâlcuri mai mari, cu abundenţa 1-2.












Iris variegata L. **– Stânjenel vărgat – Касатик пестрый**
Familia **Iridaceae** Juss. **– Iridacee – Ирисовые**

Statutul: specie periclitată – **EN.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**) și inclusă în Lista Operațională.
Răspândirea generală**:** Europa de sud-est, peninsula Balcanică. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** raioanele centrale, sudice și de est. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea” și ”Popeasca” pe coline însorite cu vegetaţie de stepă, în poieni și liziere din pădurile cu stejar pufos. Creşte în grupuri dispersate cu abundenţa 1.




Familia **Lemnaceae** S.F.Gray **– Lemnacee – Рясковые**

1. ***Spirodela polyrhiza*** (L.) Schleid. **– Lintiţă poliriză – Многокоренник обыкновенный**

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. (=*Lemna polyrrhiza* L.) **–**
Lintiţă poliriză – Многокоренник обыкновенный
Familia **Lemnaceae** S.F.Gray **– Lemnacee – Ряскoвые**



Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.
Răspândirea generală**:** Eurasia, America de Sud și de Nord, Australia. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** lunca râului Prut şi fluviului Nistru. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește sporadic în apele stagnante sau lin curgătoare din albia Nistrului, canale de irigare, Nistrul Vechi, lacul Adana. Formează grupuri și desișuri împrună cu speciile din genul *Lemna*.





Familia **Lentibulariaceae** Rich **– Lentibulariacee – Пузырчатковые**

1. ***Utricularia vulgaris*** L. **– Fam comună – Пузырчатка обыкновенная**


Utricularia vulgaris L. **– Burdujă comună – Пузырчатка обыкновенная**
Familia **Lentibulariaceae** Rich **– Lentibulariacee – Пузырчатковые**

Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **III**).





Răspândirea generală*:** Eurasia, America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar în bazinul fluviului Nistru și râului Prut. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în Nistrul Vechi (complexul ”Grădina Turcească”) și lacul Adana (complexul ”Lunca Talmaza”). Formează pâlcuri mici.



Familia **Linaceae** DC. ex S.F.Gray **– Linacee – Льновые**

1. ***Linum nervosum*** Waldst. et Kit. **– In multinervat – Лен жилковатый**

Linum nervosum Waldst. et Kit. **– In multinervat – Лен жилковатый**
Familia **Linaceae** DC. ex S.F.Gray **– Linacee – Льновые**


Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.





***Răspândirea generală*:** Europa Centrală (România) și de Est (sud), Crimeea, regiunea mediteraneeană (est), Asia Mică (vest), Iran, Caucaz.
***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic pe întreg teritoriul țării.

Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Popeasca” pe coline stepizate. Formează grupuri mici cu abundența 1-2.




Familia **Melanthiaceae** Batsch **– Melantiacee – Мелантиевые**

1. ***Colchicum triphyllum*** G.Kunze **– Brănduşă trifilă – Безвременник трехлистный**
2. ***Veratrum nigrum*** L. **– Strigoaie neagră – Чемерица черная**

Colchicum triphyllum G.Kunze (=*Colchicum ancyrense* B.L. Burtt, *C. biebersteinii* Rouy) **–**
Brănduşă trifilă – Безвременник трехлистный
Familia **Melanthiaceae** Batsch **– Melantiacee – Мелантиевые**

Statutul: specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**), în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie cu date deficiente (categoria **DD**) și este inclusă în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоцінений”**).
Răspândirea generală*:** peninsula Balcanică, Europa Centrală (sud-est) și de Est (Ucraina (sud), Moldova), Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** bazinul fluviului Nistru, în zona centrală și sud-estică și zona sudică a țării. Specia se află la limita de nord a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Copanca-Leuntea”, în poienile arboretelor cu stejar pufos. Crește solitar sau în grupuri.





Veratrum nigrum L. **– Strigoaie neagră – Чемерица черная**
Familia **Melanthiaceae** Batsch **– Melantiacee – Мелантиевые**


Statutul: specie aproape amenințată – **NT.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categorie **II**], inclusă în Lista Operațională și în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).





Răspândirea generală*:** sudul României, Republica Moldova și sud-vestul Ucrainei. Endemit dobrogean-pontic. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele împădurite din nordul republicii, și în r-nele Anenii Noi și Căușeni. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar în complexul ”Grădina Turcească” prin poieni în fitocenozele de păduri. Crește solitar sau în grupuri mici cu abundența 1.



Familia **Menyanthaceae** Dumort. **– Meniantacee – Вахтовые**


1. ***Nymphoides peltata*** (S.G.Gmel.) O.Kuntze **– Plutică peltată – Болотноцветник щитолистный**

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze (=*Limnanthemum peltatum* S.G.Gmel., *Menyanthes nymphoides* L.)
– Plutică peltată – Болотноцветник щитолистный
Familia **Menyanthaceae** Dumort. **– Meniantacee – Вахтовые**



Statutul: specie neamenințată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria VU) și Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).
Răspândirea generală*:** Eurasia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic în bazinul fluviului Nistru inferior și a râului Prut. Relict terțiar. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza” și ”Lunca Olăneşti-Crocmaz” în apele stagnante sau lin curgătoare, Nistrul Vechi, canalele de irigare. Formează pâlcuri sau desișuri cu abundența 1-2 sau 3-4.





Familia **Najadaceae** Juss. **– Naiadacee – Наядовые**

1. ***Caulinia minor*** (All.) Coss. et Germ. **– Caulinie minoră – Каулиния малая**


Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. (=*Najas minor* All.) **– Caulinie minoră – Каулиния малая**
Familia **Najadaceae** Juss. **– Naiadacee – Наядовые**

Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.

Răspândirea generală*:** Eurasia și Africa. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar în zona de sud-est și sud. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar – în complexul ”Grădina Turcească”, în albia veche a fluviului Nistru (se indică din anul 1962, însă ulterior nu a fost semnalată).







Familia **Nymphaeaceae** Salisb. **– Nimfeacee – Кувшинковые**


1. ***Nymphaea alba*** L. **– Nimfă albă – Кувшинка белая**


Nymphaea alba L. (=*Nymphaea minoriflora* (Simonk.) Wissjul., *Castalia minoriflora* Simonk.)
– Nimfă albă – Кувшинка белая
Familia **Nymphaeaceae** Salisb. **– Nimfeacee – Кувшинковые**

Statutul: specie periclitată – **EN**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), ca specie periclitată (categoria **EN**) inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și în Cartea Roşie a Transnistriei, în Lista Operațională.

Răspândirea generală*:** Europa, Asia Mică, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele sudice, Prutul inferior și Nistrul inferior. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Grădina Turcească” [143, 144] și ”Lunca Talmaza” în canalele de irigare și în albia Nistrului Vechi. Crește solitar cu abundența 1.





Familia **Orchidaceae** Juss. **– Orhidacee – Орхидные**

1. ***Listera ovata*** (L.) R. Br. **– Buhăiaş ovat – Тайник яйцевидный**
2. ***Platanthera chlorantha*** (Cust.) Reichenb. **– Stupiniţă verzuie – Любка зеленоцветковая**

Listera ovata (L.) R. Br. (=*Ophrys ovata* L.) **– Buhăiaş ovat – Тайник яйцевидный**


Familia **Orchidaceae** Juss. **– Orhidacee – Орхидные**

Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Lista Operațională, inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоцінений”**).



Răspândirea generală*:** Europa, Caucaz, regiunea mediteraneeană, Asia Mică și Mijlocie. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** bazinul fluviului Nistru, zona nordică și centrală. ***Pe teritoriul site-ului este indicată pentru complexul ”Grădina Turcească” [143, 144]. Se întâlnesc exemplare izolate, sau crește în grupuri mici, cu abundența 1 în pădurea de luncă cu plop alb.






Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. (=*Orchis chlorantha* Cust.) **–**
Stupiniţă verzuie – Любка зеленоцветковая
Familia **Orchidaceae** Juss. **– Orhidacee – Орхидные**

Statutul: specie periclitată – **EN.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоціненний”**). Inclusă în Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES).



Răspândirea generală*:** Europa, Caucaz, regiunea mediteraneeană, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova: raioanele împădurite din nord, centru și sud-est. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost indicată din complexul ”Grădina Turcească” [143, 144].




Familia **Plumbaginaceae** Juss. **– Plumbaginacee – Свинчатковые**

1. ***Goniolimon besserianum*** (Schult.) Kusn. **– Apărătoare Beser – Углостебельник Бессера**
2. ***Limonium hypanicum*** Klokov **– Sică hipanică – Кермек южнобугский**

Goniolimon besserianum (Schult.) Kusn. (=*Statice besseriana* Schult.) **– Apărătoare Beser – Углостебельник Бессера**
Familia **Plumbaginaceae** Juss. **– Plumbaginacee – Свинчатковые**



Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**).
Răspândirea generală*:** Europa Centrală, sudică şi de sud-est (România, Bulgaria, Moldova, Ucraina). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic pe întreg teritoriul țării. Endemit pontic. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește sporadic în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, pe coline stepizate, poieni de gârneț. Crește solitar sau formează grupuri mici cu abundența 1(2).






Limonium hypanicum Klokov (=*Limonium gmelinii* (Willd.) O.Kuntze, *Statice gmelinii* Willd.) **–**
Sică *hipanică* – Кермек *южнобугский*
Familia **Plumbaginaceae** Juss. **– Plumbaginacee – Свинчатковые**

Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.



Răspândirea generală*:** Europa Centrală şi de Sud-Est, Siberia de Sud, Asia Mijlocie. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic aproape pe întreg teriroriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Lunca Talmaza”, pe suprafețe sărături, pante ierboase. Crește solitar sau în grupuri din câteva exemplare cu abundența 1.





Familia **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**

1. ***Chrysopogon gryllus*** (L.) Trin. **– Sadină – Золотобородник цикадовый**
2. ***Stipa lessingiana*** Trin. et Rupr. **– Negară Lesing – Ковыль Лессинга**
3. ***Stipa pennata*** L. **– Negară penată – Ковыль перистый**
4. ***Stipa pulcherrima*** C.Koch **– Negară frumoasă – Ковыль красивейший**
5. ***Stipa tirsa*** Stev. **– Negară piramidală – Ковыль узколистный**
6. ***Stipa ucrainica*** P.Smirn. **– Negară ucraineană – Ковыль украинский**

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. (=*Andropogon gryllus* L.) **– Sadină – Золотобородник цикадовый**

Familia **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**




Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий!**), în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II)** și inclusă în Lista Operațională. Înclusă în Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES).



***Răspândirea generală*:** Europa Centrală (sud-est) și de Est (Ucraina, Moldova), Caucaz, regiunea mediteraneeană, Asia Mică, Iran.




Răspândirea în Republica site-ului **:** zona centrală și sudică. Specia se află la limita de nord a arealului. ***Pe teritoriul saitului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea” şi ”Cioburciu-Răscăieţi” în poienile și lizierele pădurilor cu stejar pufos. Crește în grupuri mici cu abundența 1.

Stipa lessingiana Trin. et Rupr. **– Negară Lesing – Ковыль Лессинга**
Familia **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**





Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**) și inclusă în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roşie a Ucrainei ca specie cu date deficitare (categoria ”**Неоціненний**”).
Răspândirea generală*:** zona de stepă din sud-estul Europei Centrale și din sudul Europei de Est, sudul Siberiei de Vest, în Asia Mică, Iran, China. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona de stepă și silvostepă din centru și sud. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește sporadic în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Cioburciu-Răscăieţi” și ”Purcari” pe coline stepizate, poienele și lizierele pădurilor de gârneț. Crește în grupuri mici cu abundența 1-2.



Stipa pennata L. **– Negară penată – Ковыль перистый**
Familia **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**




Statutul: specie periclitată – **EN**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).

***Răspândirea generală*:** regiunea mediteraneeană, zonele de stepă și silvostepă din Europa de Est și Siberia de Vest, Asia Mică și Mijlocie.



Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică pe înterg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește sporadic în complexele ”Popeasca” și ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate, în poieni și lizierele pădurilor de gârneț. Crește în grupuri mici cu abundența 1-2.



Stipa pulcherrima C.Koch **– Negară frumoasă – Ковыль красивейший**
Familia **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**




Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).

Răspândirea generală*:** Europa Centrală şi de Est, regiunea mediteraneeană, Iran, Caucaz, Siberia de Vest (sud), Asia Mică și Mijlocie. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele cu vegetație de stepă și silvostepă. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Popeasca” și ”Cioburciu-Răscăieţi” în poienile de gârneţ, pe coline stepizate. Creşte solitar sau în grupuri cu abundența 1-2.





Stipa tirsa Stev. (=*Stipa stenophylla* (Czern. ex Lindem.) Trautv., *S. longifolia* Borb.) **– Negară piramidală – Ковыль узколистный**


Familia **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**

Statutul: specie periclitată – **EN.**

Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categorie **EN**), în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), inclusă în Lista Operațională și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).

Răspândirea generală*:** penunsula Scandinavă, Europa Centrală și de Est (sud), regiunea mediteraneeană, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie (nord-vest), Siberia de Vest (sud). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar în zona centrală și bazinul fluviului Nistru. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi” și ”Purcari”, pe coline stepizate, în poiene și lizierele pădurilor de gârneț. Creşte solitar sau în grupuri cu abundența 1-2.






Stipa ucrainica P.Smirn. **– Negară ucraineană – Ковыль украинский**
Familia **Poaceae** Barnhart **– Poacee – Злаки**

Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categorie **VIII**) și inclusă în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roşie a României ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоцінений**”).



Răspândirea generală*:** Europa Centrală (România) și de Est (partea sudică), Crimeea, Precaucazia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** aproape pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza” și ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate, poiene și lizierele pădurilor de gârneț. Creşte solitar sau în grupuri cu abundența 1-2.






Familia **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**

1. ***Potamogeton berchtoldii*** Fieb. **– Broscăriţă Berhtold – Рдест Берхтольда**
2. ***Potamogeton compressus*** L. **– Broscăriţă turtită – Рдест сплюснутый**
3. ***Potamogeton gramineus*** L. **– Broscăriţă graminee – Рдест злаковый**
4. ***Potamogeton lucens*** L. **– Broscăriţă lucioasă – Рдест блестящий**
5. ***Potamogeton natans*** L. **– Broscăriţă natantă – Рдест узловатый**

Potamogeton berchtoldii Fieb. (=*Potamogeton pusillus* auct., non L.) **–**
Broscăriţă Berhtold – Рдест Берхтольда
Familia **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**

Statutul: specie cu date deficitare – **DD**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.
Răspândirea generală*:** Eurasia și America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** bazinele râului Prut și fluviului Nistru. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în complexul ”Grădina Turcească” în Nistrul Vechi. Formează pâlcuri cu abundența 1-2.







Potamogeton compressus L. (=*Potamogeton zosterifolius* Schumacher) **– Broscăriţă turtită – Рдест сплюснутый**
Familia **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**



Statutul: specie cu date deficitare – **DD**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.



Răspândirea generală*:** Eurasia, America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona sud-estică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în complexul ”Grădina Turcească” în Nistrul Vechi. Formează pâlcuri cu abundența 1-2.




Potamogeton gramineus L. (=*Potamogeton heterophyllus* Schreb.) **– Broscăriţă graminee – Рдест злаковый**
Familia **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**



Statutul: specie cu date deficitare – **DD**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.



Răspândirea generală**:** Eurasia și America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** zona sud-estică. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi” și ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii” în apele stagnante sau lin curgătoare. Formează pâlcuri mici, rareori, desișuri natante.




Potamogeton lucens L. **– Broscăriţă lucioasă – Рдест блестящий**
Familia **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**



Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** Europa, Asia, America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele centrale și sudice. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza” și ”Tudora-Palanca”, în apele stagnante sau lin curgătoare, canalele de irigare, Nistrul Vechi. Formează grupuri cu abundența 1-2(3).







Potamogeton natans L. **– Broscăriţă natantă – Рдест плавающий**
Familia **Potamogetonaceae** Dumort. **– Potamogetonacee – Рдестовые**

Statutul: specie cu date deficitare – **DD**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.





Răspândirea generală**:** Eurasia și America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** zona sud-estică (r-nul Ștefan-Vodă) și sudică (r-nul Cahul). ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii” în apele stagnante sau lin curgătoare. Formează pâlcuri.



Familia **Ranunculaceae** Juss. **– Ranunculacee – Лютиковые**

1. ***Adonis vernalis*** L. **– Ruşcuţă vernală – Адонис весенний**
2. ***Pulsatilla montana*** (Hoppe) Reichenb. **– Dediţel montan – Прострел горный**
3. ***Pulsatilla ucrainica*** (Ugr.) Wissjul. **– Dediţel ucrainean – Прострел украинский**


Adonis vernalis L. **– Ruşcuţă vernală – Адонис весенний**
Familia **Ranunculaceae** Juss. **– Ranunculacee – Лютиковые**





Statutul: specie aproape ameninţată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **III)** și inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоцінений**”). Este inclusă în Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES).
Răspândirea generală**:** zona de silvostepă din Europa Centrală și de Est, Precaucazia, Siberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** sporadică pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește sporadic în toate complexele (cu excepția celor din lunca Nistrului) pe coline stepizate, păduri aride, poiene și liziere, tufărișuri, uneori în pășuni. Formează grupuri mici cu abundența 1-2(3).






Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. (=*Anemone montana* Hoppe) **– Dediţel montan – Прострел горный**
Familia **Ranunculaceae** Juss. **– Ranunculacee – Лютиковые**



Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Lista Operațională și în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).
***Răspândirea generală*:** Europa Centrală (sud-est) și de Est (sud). Se află la limita de est a arealului. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar, aproape pe întreg teritoriul țării, cu excepţia raioanelor din sud.

Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în complexul ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate, tufărișuri. Crește în grupuri mici cu abundența 1-2 (3).





Pulsatilla ucrainica (Ugr.) Wissjul. (=*Anemone pulsatilla* L. var. *ucrainica* Ugr., *Pulsatilla nigricans* Störk) **– Dediţel ucrainean – Прострел украинский**

Familia **Ranunculaceae** Juss. **– Ranunculacee – Лютиковые**




Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Lista Operațională, inclusă în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоціненний”**).

Răspândirea generală*:** partea sudică a Europei de Est. Endemit pontic. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** raioanele centrale și din sud-est. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar, numai în complexul ”Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate, în poienele și lizierele pădurilor de gârneț. Crește în grupuri cu abundența 1-2(3).





Familia **Resedaceae** S.F.Gray **– Resedacee – Резедовые**

1. ***Reseda inodora*** Reichenb. **– Rechie nemirositoare – Резеда непахучая**


Reseda inodora Reichenb. **– Rechie nemirositoare – Резеда непахучая**
Familia **Resedaceae** S.F.Gray **– Resedacee – Резедовые**



Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.



Răspândirea generală*:** regiunea mediteraneeană, Europa de Est. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică în zona centrală și sudică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar în complexul ”Tufa-Stânca Talmaza”, pe coline. Crește în grupuri mici cu abundența 1(2).



Familia **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**

1. ***Amygdalus nana*** L. **– Migdal pitic – Миндаль низкий**
2. ***Potentilla astracanica*** Jacq. **– Scrântitoare astrachanică – Лапчатка астраханская**
3. ***Pyrus elaeagnifolia*** Pall. **– Păr eleagrifoliu – Груша лохолистная**
4. ***Rosa micrantha*** Borrer ex Smith **– Măceş micrant – Роза мелкоцветковая**
5. ***Rosa tschatyrdagi*** Chrshan. **– Măceş-de-Ciatârdag – Роза чатырдагская**
6. ***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz **– Sorb – Рябина глоговина**



Amygdalus nana L. (=*Prunus tenella* Batsch) **– Migdal pitic – Миндаль низкий**


Familia **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**




Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **III)** şi inclusă în Lista Operațională.

Răspândirea generală**:** peninsula Balcanică, Europa Centrală şi de Est, Crimeea, Asia Mijlocie şi Sberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** sporadic pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește frecvent în toate complexele (cu excepția celor din lunca Nistrului), pe coline stepizate, poiene și liziere din pădurile de gârneț. Formează grupuri din câteva exemplare cu abundența 1-2 sau desișuri cu abundența 3-4.






Potentilla astracanica Jacq. **– Scrântitoare astrachanică – Лапчатка астраханская**
Familia **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**



Statutul: specie periclitată – **EN.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN**) și în Lista Operațională.



Răspândirea generală**:** Europa Centrală şi de Est, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** zona sudică (r-nul Cahul) şi sud-estică (r-nul Ştefan-Vodă). ***Pe teritoriul sitului*** se întâlnește foarte rar, doar în complexul ”Cioburciu-Răscăieţi” pe o colină stepizată, în liziera pădurii de gârneț. Crește solitar sau în grupuri mici cu abundența 1-2.




Pyrus elaeagnifolia Pall. **– Păr eleagnifoliu – Груша лохолистная**
Familia **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**

Statutul: specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II-IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **CR**) și inclusă în Lista Operațională, în Lista Roșie a Europei ca specie cu date deficitare (categoria **DD**).
Răspândirea generală*:** Europa Centrală (România) de Est (Republica Moldova, Crimeea), regiunea mediteraneeană (est), Asia Mică, Iran. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** bazinul fluviului Nistru inferior (r-nele Anenii Noi, Căușeni). Se află la limita de nord a arealului. ***Pe site-ului saitului se întâlnește foarte rar, numai în complexul ”Copanca-Leuntea” în liziera pădurii de gârneţ.








Rosa micrantha Borrer ex Smith **– Măceş micrant – Роза мелкоцветковая**
Familia **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**

Statutul: specie periclitată – **EN.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu este protejată.

Răspândirea generală*:** Europa Centrală şi de Est, regiunea mediteraneeană. ***Răspândirea în Republica Moldova: rară în bazinul fluviului Nistru și zona de sud. Crește la limita de sud-est a arealului. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește foarte rar în complexul **”**Cioburciu-Răscăieţi” pe coline stepizate. Crește solitar sau formează grupuri mici cu abundența 1.










Rosa tschatyrdagi Chrshan. (=*Rosa pimpinellifolia* auct. non L.) **– Măceş-de-Ciatârdag – Роза чатырдагская**
Familia **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**

Statutul: specie critic periclitată – **CR.**
Starea de protecţie: în republica Moldova nu sunt luate măsuri de protecție.
Răspândirea generală*:** Europa de Sud-Est, Caucaz, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova: foarte rară în districtul cu păduri subaride de stejar pufos. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește foarte rar în trupul de pădure ”Stânca” (complexul ”Cioburciu-Răscăieți” pe pante însorite, poienile pădurilor subaride de stejar pufos. Crește solitar sau formează grupuri mici din 5-10 exemplare cu abundența 1-2.




Sorbus torminalis (L.) Crantz (=*Crataegus torminalis* L.). **– Sorb – Рябина глоговина**
Familia **Rosaceae** Juss. **– Rosacee – Розовые**

Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоцінений**”).





Răspândirea generală*:** Europa Atlantică, Centrală și de Est (sud), Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic pe întreg teritoriul țării, cu excepția raioanelor sudice. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar în complexul ”Cioburciu-Răscăieți” în pădure. Crește solitar.



Familia **Rutaceae** Juss. **– Rutacee – Рутовые**

1. ***Haplophyllum suaveolens*** (DC.) G. Don fil. **– Gălbinele – Цельнолистник душистый**


Haplophyllum suaveolens (DC.) G. Don fil. (=*Ruta suaveolens* DC.) **– Gălbinele – Цельнолистник душистый**
Familia **Rutaceae** Juss. **– Rutacee – Рутовые**





Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.

Răspândirea generală**:** peninsula Balcanică, Europa de Est, Transcaucazia, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** sporadic în zona centrală și sudică. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea” și ”Cioburciu-Răscăieţi”, în poiene și liziere ale pădurilor de stejar pufos, pe coline stepizate. Formează grupuri cu abundența 1-2.



Familia **Salviniaceae** Dumort. **– Salviniacee – Сальвиниевые**

1. ***Salvinia natans*** (L.) All. **– Peştişoară natantă – Сальвиния плавающая**

Salvinia natans (L.) All. (=*Marsilea natans* L.) **– Peştişoară natantă – Сальвиния плавающая**
Familia **Salviniaceae** Dumort. **– Salviniacee – Сальвиниевые**




***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR.**

***Starea de protecţie*:** în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN**), în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоцінений”**). Protejată de Conventia de la Berna, privind conservarea vieții salbatice și a habitatelor naturale din Europa.

Răspândirea generală*:** specie holarctică, plurizonală, care apare, îndeosebi, în zonele de stepă, de deșert și subtropicală din Emisfera de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** districtele sudice. Relict terțiar. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, în ape stagnante sau lin curgătoare, lacul Adana, Nistrul Vechi, canalele de irigare. Formează grupuri numeroase cu abundența 1-2 sau 5.





Familia **Scrophulariaceae** Juss. **– Scrofulariacee – Норичниковые**


1. ***Gratiola officinalis*** L. **– Veninariţă medicinală – Авран лекарственный**
2. ***Veronica euxina*** **Turrill – Veronică euxină – Вероника Гриня**

Gratiola officinalis L. **– Veninariţă medicinală – Авран лекарственный**
Familia **Scrophulariaceae** Juss. **– Scrofulariacee – Норичниковые**

Statutul: specie vulnerabilă– **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri.




Răspândirea generală*:** Europa, Iran, Djungaria, Caucaz, Asia Mijlocie, Siberia de Vest, America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar în zona centrală și sudică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în complexul ”Grădina Turcească” în lunca fluviului Nistru în locuri umede. Crește solitar sau formează grupuri mici cu abundența 1.



***Veronica euxina* Turrill** (=*Pseudolysimachion euxinum* (Turrill) Holub, *Veronica gryniana* Klokov) **–**
Veronică euxină – Вероника Гриня
Familia **Scrophulariaceae** Juss. **– Scrofulariacee – Норичниковые**

Statutul: specie aproape amenințată – **NT.**
Starea de protecție: inclusă în Lista Roșie a Europei ca specie cu date deficitare (categorie **DD**) și protejată de Conventia de la Berna, privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa.
Răspândirea generală*:** Europa de Est (Moldova, Ucraina), regiunea mediteraneeană (Bulgaria). Endemit pontic. Se află la limita de sud a arealului. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în complexe ”Copanca-Leuntea” și ”Cioburciu-Răscăieți” pe coline stepizate, poieni şi liziere ale pădurilor aride. Crește solitar sau în grupuri mici cu abundența 1.





Familia **Tamaricaceae** Link **– Tamaricacee – Гребенщиковые**


1. ***Tamarix ramosissima*** Ledeb. **– Tamariscă rămuroasă – Гребенщик многоветвистый**

Tamarix ramosissima Ledeb. **– Tamariscă rămuroasă – Гребенщик многоветвистый**
Familia **Tamaricaceae** Link **– Tamaricacee – Гребенщиковые**

Statutul: specie aproape amenințată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** Europa de Est (zona sudică), Asia Mică și Mijlocie, Caucaz, Iran, Djungaria, Siberia de Vest (partea sudică). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona centrală, bazinul fluviului Nistru inferior și a râului Prut inferior. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Saghi-Kazaceşti” și ”Diculi-Cuța-Maţarinskii” în lunci slab sărăturoase. Formează grupuri mici cu abundența 1.







Familia **Trapaceae** Dumort. **– Trapacee – Рогульниковые**

1. ***Trapa natans*** L. **– Cornaci natant – Рогульник плавающий, Чилим, Водяной орех**


Trapa natans L. **– Cornaci natant – Рогульник плавающий, Чилим, Водяной орех**
Familia **Trapaceae** Dumort. **– Trapacee – Рогульниковые**





Statutul: specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Неоцінений**”). În Lista Roșie a Europei inclusă ca specie aproape amenințată (categorie **NT)**. Protejată de Convention de la Berna, privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa.
Răspândirea generală*:** extinsă, dar disjunctă. Răspândită în regiunea mediteraneeană, Europa, Caucaz, Asia Centrală și de sud-est, Kazahstan, Africa de Nord; introdusă în America de Nord și Australia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** bazinul fluviului Nistru inferior și râului Prut inferior. Relict terțiar. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește sporadic în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz” și ”Tudora-Palanca”, în apele stagnante sau lin curgătoare, canale de irigare, Nistrul Vechi. Formează pâlcuri sau desișuri cu abundența 1 sau 2-3.






Familia **Typhaceae** Juss. **– Tifacee – Рогозовые**

1. ***Typha laxmannii*** Lepech. **– Papură Laxman – Рогоз Лаксмана**


Typha laxmannii Lepech. **– Papură Laxman – Рогоз Лаксмана**
Familia **Typhaceae** Juss. **– Tifacee – Рогозовые**



Statutul: specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categorie **IV**).
***Răspândirea generală*:** regiunea mediteraneeană, Europa, Asia Mică și Mijlocie, Siberia, Extremul Orient, Mongolia, Japonia și China.



Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic în raioanele centrale și de sud-est. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti” și ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii” în apele stagnante sau lin curgătoare, canale de irigare, Nistrul Vechi, lacul Adana, lunci înmlăștinite.



Familia **Valerianaceae** Batsch **– Valerianacee – Валериановые**


1. ***Valerianella coronata*** (L.) DC. **– Fetică coronată – Валерианелла увенчанная**

Valerianella coronata (L.) DC. (=*Valeriana locusta* L. γ. *coronata* L.) **–**
Fetică coronată – Валерианелла увенчанная
Familia **Valerianaceae** Batsch **– Valerianacee – Валериановые**



Statutul: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** Europa Atlantică, Centrală și de Est (sud), Crimeea, regiunea mediteraneeană, Asia Mică, Iran; introdusă în America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar în zona centrală și sudică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește foarte rar pe coline stepizate, în complexul ”Tufa-Stânca Talmaza”. Formează grupuri sau desișuri cu abundența 1-2.





Familia **Viburnaceae** Juss. **– Viburnacee – Калиновые**


1. ***Viburnum opulus*** L. **– Călin comun – Калина обыкновенная**

Viburnum opulus L. – Călin comun – Калина обыкновенная
Familia **Viburnaceae** Juss. – **Viburnacee – Калиновые**

Statutul: specie aproape amenințată – **NT.**
Starea de protecție: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**).
Răspândirea generală*:** Europa, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Siberia, Africa (partea de nord). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadică în districtele silvice. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în ”Lunca Talmaza”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Tudora-Palanca” în păduri de luncă, poiene și liziere. Crește solitar sau în grupuri din 2-3 extmplare cu abundența 1.







Familia **Vitaceae** Juss. **– Vitacee – Виноградовые**


1. ***Vitis sylvestris*** C.C.Gmel. **– Viţă sălbatică – Виноград лесной**

Vitis sylvestris C.C.Gmel. **– Viţă sălbatică – Виноград лесной**
Familia **Vitaceae** Juss. **– Vitacee – Виноградовые**



Statutul: specie periclitată – **EN.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II-III**), inclusă în Lista Operațională și în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN**).
Răspândirea generală*:** Europa Atlantică, Centrală și de Est (sud), regiunea mediteraneeană, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie (Turkmenistan), Iran. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** luncile fluviului Nistru și râului Prut. Relict. Se află la limita de nord a arealului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește sporadic în pădurile de luncă din complexele ”Lunca Talmaza” și ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”. Formează grupuri din câteva exemplare cu abundența 1-2(3).





Regnul **Animalia** Linnaeus, 1758 – **Animale – Животные**

Clasa **Clitellata** Michaelsen, 1919 **– Artropode acvatice (zoobenthos) – Пиявки**

Pe teritoriul site-ului au fost evidențiate **119** specii de zoobenthos. Cele mai reprezentative sunt moluștele (**36** specii), larvele și imago ale coleopterelor acvatice (**34**), larve de libelule (**17**), heteroptere acvatice (**8**), efemeropterele (**8**) și trihopterele (**4**), lipitoarele (**7**). Dintre ele numai o specie - *Hirudo medicinalis* (L.) este inclusă în Lista Roșie IUCN [21].

Pentru fiecare specie sunt prezentate următoarele caracteristici:

- denumirea în limbile latină, română și rusă;
- apartenența la familie în limba latină;
- statutul (categoria de raritate);
- starea de protecție (includere în Lista Operațională, Cartea Roșie a Transnistriei [112], Cartea Roșie a Ucrainei [186], Listele IUCN [40];
- răspândirea generală [33, 118, 120, 130, 177];
- răspândirea în Republica Moldova [198];
- răspândirea pe teritoriul site-ului – afilierea la complexele naturale;
- afilierea la habitate;
- foto – au fost folosite materialele site-ului www.wikipedia.org


Familia **Hirudinidae** Whitman, 1886 **– Hirudinide – Пиявки**

1. ***Hirudo medicinalis*** (Linnaeus, 1758) **– Lipitoarea medicinală – Пиявка медицинская**

Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) **– Lipitoarea medicinală – Пиявка медицинская**
Семейство **Hirudinidae** Whitman, 1886 **– Hirudinide – Пиявки**



Statutul: specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecție: în Republica Moldova a fost inclusă în Lista Operațională și Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”). Este protejată la nivel internațional – inclusă în Lista Roșie IUCN.
Răspândirea generală*:** Europa (cu excepția nordului), Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** se întâlnește extrem de rar în toate zonele țării. ***Pe teritoriul site-ului a fost semnalată în complexele ”Lunca Talmaza” și ”Tudora-Palanca” în canalele de irigație, lacul Adana.



Clasa **Insecta** (Linnaeus, 1758) **– Insecte – Насекомые**

Informația despre speciile rare de insecte din site-ul Ramsar ”Nistrul de Jos”, protejate la nivel național și internațional, prezintă o listă adnotată a taxoanelor întâlnite pe acest teritoriu. La fel în listă speciilor au fost incluse insectele care nu sunt protejate, insă considerate destul de rare în Republica Moldova și pe teritoriul site-ului: *Aglais urticae* L., *Argynnis aglaja* L., *Catocala sponsa* L., *Bombus schrencki* F.Mor., *Jalla dumosa* L., *Melitaea diamina* Lang., *Neozephyrus quercus* L., *Polyommatus amandus* Schn.

Pentru fiecare specie sunt prezentate următoarele caracteristici:

- denumirea în limbile latină, română și rusă;
- apartenența la familie în limba latină;
- statutul (categoria de raritate);
- starea de protecție (includere în legislația ecologică a Republicii Moldova (categoriile de raritate ale speciilor protejate: I – specie dispărută, II – specie, amenințată cu dispariția, III – specie, efectivul căreia se micșorează catastrofal, ce poate să o pună în pericol de dispariție, IV – specie rară, V – specie nedeterminată, VI – specie restabilită, VII – specie insuficient studiată, VIII – specie, care nu provoacă îngrijorare) [199], Lista Operațională [46], Cartea Roșie a Republicii Moldova [9], Cartea Roșie a Transnistriei [112], Cartea Roșie a Ucrainei [186], Listele IUCN [21, 34], Convenția de la Berna [11], Directiva Europeană pentru conservarea habitatelor [14];
- răspândirea generală [9, 28];
- răspândirea în Republica Moldova [50, 51];
- răspândirea pe teritoriul site-ului – afilierea la complexele naturale;
- afilierea la habitate;
- foto de Derjanschi V.V. Au fost folosite materialele site-ului www.wikipedia.org

Specii de insecte rare

Fauna insectelor pe teritoriul site-ului Ramsar ”Nistrul de Jos” este bogată și prezentată cu un număr mare de specii, apartenente la diferite ordine: Dictyoptera, Orthoptera, Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, ș.a. Printre ele multe insecte (**50 specii**) sunt rare [1, 2, 48-52, 65, 108-111, 121, 122, 133, 194, 195], protejate la nivel internațional și național. Speciile de insecte semnalate diferă după nivelul de raritate, populațiile lor sunt diferite după efectivul numeric, unele dintre acestea au fost înregistrate în unu sau două complexe. Unele specii necesită măsuri speciale de conservare, mai ales cele cu categorii de raritate mare. Pentru acestea se poate propune înființarea a unor ”microrezervații” cu scopul conservării și monitorizării populațiilor locale.

Sub protecția statului în Republica Moldova se află 15 specii de insecte [199]: 3 specii sunt amenințate cu dispariția (**categoria II**) – *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758), *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775); 11 speci1, efectivul cărora se micșorează catastrofal, ce poate să le pună în pericol de dispariție (**categoria III**) – *Carabus clathratus* Linnaeus, 1761, *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Elater ferrugineus* (Linnaeus, 1758), *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862), *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758), *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761), *Iphiclides podalirius* Linnaeus, 1758, *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Megascolia maculata* (Drury, 1773), *Xylocopa valga* Gerstäcker, 1872; 1 specie rară (**categoria IV**) – *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758).

Cele mai rare specii, cu categorie de raritate mare sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova [9]: 9 specii critic periclitate (**categoria CR**) – *Onconotus servillei* (Fischer von Waldheim, 1846), *Erythromma lindenii* (Sélys, 1840), *Leucorrhinia pectoralis* Charpentier, 1825, *Carabus variolosus* (Fabricius, 1787), *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Hamearis lucina* Linnaeus, 1758, *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772); 5 specii periclitate (**categoria EN**) – *Carabus clathratus* Linnaeus, 1761, *Elater ferrugineus* (Linnaeus, 1758), *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862), *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758); 21 specii vulnerabile (**categoria VU**) – *Ameles decolor* (Charpentier, 1825), *Anax imperator* (Leach, 1815), *Carabus ullrichii* Germar, 1824, *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758), *Protaetia aeruginosa* (Linnaeus, 1767), *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758), *Apatura iris* (Linnaeus, 1758), *A. metis* (Freyer, 1829), *Colias chrysotheme* (Esper, 1781), *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761), *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758), *Neptis sappho* (Pallas, 1771), *Plebejus argyrognomon* (Bergsträsser, 1779), *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758), *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758), *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763), *B. ruderatus* (Fabricius, 1775), *Megascolia maculata* (Drury, 1773), *Scolia hirta* (Schrank, 1781).

Din Cartea Roșie a Transnistriei au fost semnalate 23 specii de insecte [112], care se întâlnesc și în biocenozele site-ului ”Nistrul de Jos”: 1 specie critic periclitată (**categoria CR**) – *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758); 2 specii periclitate (**categoria EN**) – *Morimus funereus* (Mulsant, 1862) и *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758); 15 specii vulnerabile (**categoria VU**) – *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Protaetia aeruginosa* (Linnaeus, 1767), *Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758), *Morimus funereus* (Mulsant, 1862), *Megascolia maculata* (Drury, 1773), *S. hirta* (Schrank, 1781), *Xylocopa valga* Gerstäcker, 1872, *X. violaceae* (Linnaeus, 1758), *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763), *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Neozephyrus quercus* (Linnaeus, 1758), *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761), *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758), *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767) . și 5 specii (*Erythromma lindenii* (Sélys, 1840), *Carabus clathratus* Linnaeus, 1761, *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Apatura iris* (Linnaeus, 1758), *Hamearis lucina* Linnaeus, 1758) cu deficit de date (**categoria DD**).

Din Lista Operațională, alcătuită în urma elaborării a Rețelei Ecologice Naționale, pe teritoriul site-ului Ramsar ”Nistrul de Jos” au fost înregistrate 24 specii de insecte [46] – *Ameles decolor* (Charpentier, 1825), *Anax imperator* (Leach, 1815), *Erythromma lindenii* (Sélys, 1840), *Carabus ullrichii* (Germar, 1824), *C. variolosus* (Fabricius, 1787), *Protaetia aeruginosa* (Linnaeus, 1767), *Aglais urticae* (Linnaeus, 1758), *Apatura iris* (Linnaeus, 1758), *A. metis* (Freyer, 1829), *Argynnis aglaja* Linnaeus, 1758, *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767), *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758), *Colias chrysotheme* (Esper, 1781), *Hamearis lucina* Linnaeus, 1758, *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758), *Neptis sappho* (Pallas, 1771), *Neozephyrus quercus* (Linnaeus, 1758), *Plebejus argyrognomon* (Bergsträsser, 1779), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763), *B. ruderatus* (Fabricius, 1775), *Formica rufa* Linnaeus, 1761, *Scolia hirta* (Schrank, 1781), *Xylocopa violacea* (Linnaeus, 1758).

Pe teritoriul site-ului se întâlnesc și specii de insecte care sunt rare și în regiunile învecinate. Astfel, dintre ele sunt incluse în Cartea Roșie a Ucrainei 23 specii [186], semnalate în complexele site-lui. Dintre acestea, 12 specii din categoria ”**Вразливий**” – *Anax imperator* (Leach, 1815), *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862), *Apatura iris* (Linnaeus, 1758), *Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758), *Hamearis lucina* Linnaeus, 1758, *Iphiclides podalirius* Linnaeus, 1758, *Papilio machaon* (Linnaeus, 1758), *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758), *Saturnia pyri* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775), *Bombus argillaceus* (Scopoli, 1763), 8 specii din categoria ”**Рідкісний**” – *Erythromma lindenii* (Sélys, 1840), *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767), *Bombus ruderatus* (Fabricius, 1775), *Xylocopa valga* Gerstäcker, 1872, *X. violacea* (Linnaeus, 1758) și o specie (*Megascolia maculata* (Drury, 1773) din categoria ”**Неоцінений**”.

Dintre speciile de insecte înregistrate pe teritoriul site-ului în Lista Roșie IUCN [21] sunt prezente 3 specii vulnerabile (**categoria VU**) – *Onconotus servillei* (Fischer von Waldheim, 1846), *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862), iar 2 specii sunt aproape vulnerabile (**categoria NT**) – *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) и *Formica rufa* Linnaeus, 1761.

Din Lista Roșie a Europei au fost semnalate 6 specii [34]: 1 specie periclitată (**categoria EN**) – *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) , o specie vulnerabilă (**categoria VU**) – *Colias chrysotheme* (Esper, 1781) și 4 specii cu risc redus (**categoria LR**) – *Apatura metis* (Freyer, 1829), *Neptis sappho* (Pallas, 1771), *Lycaena virgaureae* (Linnaeus, 1758), *Plebejus argyrognomon* (Bergsträsser, 1779).

Din lista Convenției europene despre conservarea speciilor sălbatice (Convenția de la Berna, 1979) [11] au fost înregistrate: *Leucorrhinia pectoralis* Charpentier, 1825, *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758), *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758), *Apatura metis* (Freyer, 1829), *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758), *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775).

În Anexele II și IV ale Directivei pentru Habitate (Directiva Consiliului 92/43/EEC din 21 mai 1992 despre conservarea habitatelor și a florei și faunei sălbatice) sunt incluse 8 specii [14] – *Lucanus cervus* (Linnaeus, 1758) – Anexa **II**, *Cerambyx cerdo* (Linnaeus, 1758) – Anexele **II și IV**, *Morimus asper funereus* (Mulsant, 1862) – Anexa **II**, *Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761) – Anexa **II**, *Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758) – Anexa **IV**, *Zerynthia polyxena* (Denis et Schiffermüller, 1775) – Anexa **IV**, *Apatura metis* (Freyer, 1829) – Anexa **IV**, *Maculinea arion* (Linnaeus, 1758) – Anexa **IV**.

Familia **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**


1. ***Bombus argillaceus*** (Scopoli, 1763) **– Bondar de-argilă – Шмель глинистый**
2. ***Bombus ruderatus*** (Fabricius, 1775) **– Bondar roșiatic – Шмель красноватый**
3. ***Xylocopa valga*** Gerstäcker, 1872 **– Albină violetă – Пчела-плотник**
4. ***Xylocopa violacea*** (Linnaeus, 1758) **– Albină violetă – Пчела-плотник фиолетовая**





Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) **– Bondar de-argilă – Шмель глинистый**
Familia **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU** .
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**) și în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).
Răspândirea generală*:** Europa (cu excepția părții de nord), Asia Mică, nordul Irakului și Iran, sud de Siberia, est de America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona centrală și de sud ale țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari” și ”Răscăieţi-Olăneşti”.








Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) **– Bondar roșiatic – Шмель красноватый**
Familia **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU** .
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний**”).
Răspândirea generală*:** Europa, Caucaz, Asia Mică, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona de sud. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Lunca Talmaza” și ”Răscăieţi-Olăneşti”.




Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 **– Albină valgă – Пчела-плотник**
Familia **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**



***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III)**.
Răspândirea generală*:** în regiunile temperate ale Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** în partea centrală a țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa” și ”Valea Turcului” .






Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) **– Albină violetă – Пчела-плотник фиолетовый**
Familia **Apidae** Latreille, 1802 **– Apide – Пчёлы настоящие**

***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**) și în Lista Operațională. Este inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний**”).
Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Asia Mică, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Zaozernoe-Nucari”, ”Răscăieţi-Olăneşti” și ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”.









Familia **Carabidae** Latreille, 1802 **– Carabide – Жужелицы**

1. ***Carabus clathratus*** Linnaeus, 1761 **– Carabidă clatratus – Жужелица золотоямчатая**
2. ***Carabus ullrichii*** (Germar, 1824) **– Carabida-lui-Ulrih – Жужелица Ульриха**
3. ***Carabus variolosus*** (Fabricius, 1787) **– Carabidă vario – Жужелица изменчивая**


Carabus clathratus Linnaeus, 1761 **– Carabidă clatratus – Жужелица золотоямчатая**
Familia **Carabidae** Latreille, 1802 **– Carabide – Жужелицы**

***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III),** inclusă în în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN)** și Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **DD**).

Răspândirea generală*:** Europa și Asia (până la Coreea de Nord). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în multe complexe din valea Nistrului.







Carabus ullrichii (Germar, 1824) **– Carabida-lui-Ulrih – Жужелица Ульриха**

Familia **Carabidae** Latreille, 1802 **– Carabide – Жужелицы**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Lista Operațională și în Cartea Roșie ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).

Răspândirea generală*:** specie europeană, înregistrată în Austria, Germania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Cehia, Elveția, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Croația, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bulgaria, România, Ucraina. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** în partea de centru și nord a țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Lunca Talmaza”.






Carabus variolosus (Fabricius, 1787) **– Carabidă vario – Жужелица изменчивая**
Familia **Carabidae** Latreille, 1802 **– Carabide – Жужелицы**

***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** specie europeană, semnalată în Polonia, Slovacia, Cehia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Croația, Muntenegru, Macedonia de Nord, Bulgaria, România, Ucraina. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona centrală. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Valea Știubei”.







Familia **Cerambycidae** Latreille, 1802 **– Cerambicide – Усачи**


1. ***Cerambyx cerdo*** (Linnaeus, 1758) **– Croitor-mare-al-stejarului – Большой дубовый усач**
2. ***Morimus asper funereus*** (Mulsant, 1862) **– Croitor cenușiu – Моримус темный**

Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) **– Croitor-mare-al-stejarului –**
Большой дубовый усач
Familia **Cerambycidae** Latreille, 1802 **– Cerambicide – Усачи**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR .**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III)**, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **DD**). Inclusă în Lista Roșie IUCN (categoria **VU**), Anexa II a Convenției Berna și Anexele II și IV ale Directivei Habitate.
Răspândirea generală*:** Europa de Vest, Centrală și de Est (până la Letonia și Ucraina). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** biotopurile silvice din centrul și nordul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în stejăret din complexul ”Tufa-Stânca Talmaza”.






Morimus asper funereus (Mulsant, 1862) **– Croitor cenușiu – Моримус темный**
Familia **Cerambycidae** Latreille, 1802 **– Cerambicide – Усачи**



***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III),** inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldovaca specie periclitată (categoria **EN**). Inclusă în Lista Roșie IUCN (categoria **VU**), Anexa II a Directivei Habitate și în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).
Răspândirea generală*:** Europa de Sud-Est (Ucraina, Moldova, România, Bulgaria, Ungaria și Slovacia). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Tufa-Stânca Talmaza”.





Familia **Cetoniidae** Leach, 1815 **– Cetoniide – Бронзовки**


1. ***Protaetia aeruginosa*** (Linnaeus, 1767) **– Cetonischemă aeruginosa – Бронзовка гладкая**

Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767) **– Cetonischemă aeruginosa – Бронзовка гладкая**
Familia **Cetoniidae** Leach, 1815 **– Cetoniide – Бронзовки**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie (categoria **VU**), în Lista Operațională și în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**).





Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Sud, regiunea mediteraneană. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic, pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește într-un singur complex – ”Valea Turcului”.

Familia **Coenagrionidae** Kirby, 1890 **– Coenagrionide – Стрелки**


1. ***Erythromma lindenii*** (Sélys, 1840) **– Libelula-lui-Linden – Стрелка Линдена**

Erythromma lindenii (Sélys, 1840) **– Libelula-lui-Linden – Стрелка Линдена**
Familia **Coenagrionidae** Kirby, 1890 **– Coenagrionide – Стрелки**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie ca specie critic periclitată (categoria **CR**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **DD**) și în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний**”).
Răspândirea generală*:** litoralul mediteranean al Europei de Vest, Transcaucasia, nord-vestul Africii. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** partea de sud-vest și sud-est a zonei de sud. ***Pe teritoriul site-ului a fost depistată într-un singur complex – ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”.





Familia **Elateridae** Leach, 1815 **– Elateride – Щелкуны**


1. ***Elater ferrugineus*** (Linnaeus, 1758) **– Pocnitor roșcat – Щелкун краснокрылый**

Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) **– Pocnitor roșcat – Щелкун краснокрылый**
Familia **Elateridae** Leach, 1815 **– Elateride – Щелкуны**



***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III),** inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN).**
Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Sud, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** în zona Codrilor și lunca Nistrului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Grădina Turcească”.





Familia **Erebidae** Leach, 1815 **– Erebide – Эребиды**

1. ***Callimorpha dominula*** (Linnaeus, 1758) **– Calimorfă dominula – Медведица-госпожа**
2. ***Catocala sponsa*** (Linnaeus, 1767) **– Catocala zmeurului – Ленточница малиновая**
3. ***Euplagia quadripunctaria*** (Poda, 1761) **– Arctiidă-Hera – Медведица Гера**

Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) **– Calimorfă dominula – Медведица-госпожа**

Familia **Erebidae** Leach, 1815 **– Erebide – Эребиды**




***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie ca specie critic periclitată (categoria **CR**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**) și în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).

Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Iranul de Nord, Turkmenistanul de Sud. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona de nord și centru ale țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Lunca Talmaza” și ”Valea Știubei”.






Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) **– Catocala zmeurului – Ленточница малиновая**
Familia **Erebidae** Leach, 1815 **– Erebide – Эребиды**







***Statutul*:** fără statut.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний**”).



Răspândirea generală*:** Europa (cu excepția nordului), Africa de Nord, Asia Mică, Transcaucasia, Iranul de Nord, Kazahstanul de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** luncile Nistrului și Prutului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza” și ”Împărăteasa”.

Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) **– Arctiidă-Hera – Медведица Гера**
Familia **Erebidae** Leach, 1815 **– Erebide – Эребиды**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III)**, inclusă în Cartea Roșie ca specie critic periclitată (categoria **VU**) și Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**). Inclusă în Anexa II a Directivei Habitate.



Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Sud-Est, Caucaz, Iranul de Nord, Turkmenistan. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic, pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în multe complexe, în poiene și liziere de pădure.





Familia **Formicidae** Latreille, 1802 **– Formicide – Муравьи**


1. ***Formica rufa*** Linnaeus, 1761 **– Furnica roșie – Рыжий лесной муравей**

Formica rufa Linnaeus, 1761 **– Furnica roșie – Рыжий лесной муравей**
Familia **Formicidae** Latreille, 1802 **– Formicide – Муравьи**



***Statutul*:** specie fără statut.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat și a fost inclusă în Lista Operațională. Inclusă în Lista Roșie IUCN (categoria **NT**).
Răspândirea generală*:** arealul speciei este legat de pădurile zonei temperate a Eurasiei de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona de nord și centru. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar în complexele ”Copanca-Leuntea” și ”Valea Turcului”.





Familia **Libellulidae** Rambur, 1842 **– Libelulide – Настоящие стрекозы**


1. ***Anax imperator*** (Leach, 1815) **– Libelulă imperială – Дозорщик-император**
2. ***Leurorrhinia pectoralis*** Charpentier, 1825 **– Libelulă de-baltă – Стрекоза болотная**

Anax imperator (Leach, 1815) **– Libelulă imperială – Дозорщик-император**
Familia **Libellulidae** Rambur, 1842 **– Libelulide –**
Настоящие стрекозы






***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU** .
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).
***Răspândirea generală*:** Europa, Asia de Vest și Centrală, Africa de Nord și Centrală.
Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Împărăteasa” și ”Tudora-Palanca”, în preajma bazinelor acvatice cu apă stătătoare.



Leucorrhinia pectoralis Charpentier, 1825 **– Libelulă de-baltă – Стрекоза болотная**
Familia **Libellulidae** Rambur, 1842 **– Libelulide – Настоящие стрекозы**

***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR** .
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **CR**) și în Anexa II a Convenției de la Berna.
Răspândirea generală*:** Europa și Siberia, dar a fost semnalată și în partea de nord-est a Rusiei europene. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona sud-estică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește sporadic. A fost semnalată în două complexe - ”Grădina Turcească” și ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”.





Familia **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licenide – Голубянки**


1. ***Lycaena virgaureae*** (Linnaeus, 1758) **– Albăstrița măcrișului – Червонец огненный**
2. ***Maculinea arion*** (Linnaeus, 1758) **– Albăstrița cimbrișorului – Голубянка арион**
3. ***Neozephyrus quercus*** (Linnaeus, 1758) **– Codița albastră de-stejar – Зефир дубовый**
4. ***Plebejus argyrognomon*** (Bergsträsser, 1779) **– Albăstrița argintie – Голубянка аргирогномон**

Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) **– Albăstrița măcrișului – Червонец огненный**
Familia **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licenide – Голубянки**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecție: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și în Lista Roșie a Europei (categoria **LR**).
Răspândirea generală*:** Europa, Caucaz, Siberia, Extremul Orient. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic în zona nordică și centrală. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz” și ”Valea Turcului”.





Maculinea arion (Linnaeus, 1758) **– Albăstrița cimbrișorului – Голубянка арион**

Familia **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licenide – Голубянки**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecție: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), Lista Operațională, și în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **DD**). Inclusă în Lista Roșie IUCN (categoria **NT**), Lista Roșie a Europei (categoria **EN**), Anexa II a Convenției Berna, Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală*:** Europa. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic, pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Zaozernoe-Nucari”.






Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) **– Codița albastră de-stejar – Зефир дубовый**
Familia **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licenide – Голубянки**





***Statutul*:** specie fără statut.
Starea de protecție: în Republica Moldova este inclusă în Lista Operațională și Cartea Roșie a Transnistriei, ca specie vulnerabilă (categoria **VU**).






Răspândirea generală*:** Europa (cu excepția nordului), Africa de Nord, Asia Mică, Transcaucasia, Iranul de Nord, Kazahstanul de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Valea Turcului”.

Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) **– Albăstrița argintie – Голубянка аргирогномон**
Familia **Lycaenidae** Leach, 1815 **– Licenide – Голубянки**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie, ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Lista Operațională. Inclusă în Lista Roșie a Europei (categoria **LR**),
Răspândirea generală*:** Europa, sudul Siberiei, Transbaikalia, ținutul Primorie, Mongolia, China, Coreea și Japonia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele **”**Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Răscăieţi-Olăneşti” și ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”.





Familia **Lucanidae** Latreille, 1804 **– Lucanide – Рогачи**

1. ***Lucanus cervus*** (Linnaeus, 1758) **– Rădașcă – Жук-олень**


Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) **– Rădașcă – Жук-олень**
Familia **Lucanidae** Latreille, 1804 **– Lucanide – Рогачи**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III**), inclusă în Cartea Roșie (categoria **VU**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**). Inclusă în Anexa II a Convenției Berna, Anexa II a Directivei Habitate și în Cartea Roșie a Ucrainei (категория "**Рідкісний**").
Răspândirea generală*:** Europa și Asia (până la Iran și Kazahstan). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** regiunile forestiere. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în toate complexele cu biocenoze silvice.








Familia **Mantidae** Burmeister, 1838 **– Mantide – Настоящие богомолы**


1. ***Ameles descolor*** (Charpentier, 1825) **– Călugărița incoloră – Богомол бесцветный**

Ameles descolor (Charpentier, 1825) **– Călugărița incoloră – Богомол бесцветный**
Familia **Mantidae** Burmeister, 1838 **– Mantide – Настоящие богомолы**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie (categoria **VU**) și în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** Europa de Sud și Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona de sud. ***Pe teritoriul site-ului este obișnuită în biotopurile aride cu vegetație ierboasă.





Familia **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**

1. ***Aglais urticae*** (Linnaeus, 1758) **– Urzicar – Крапивница**
2. ***Apatura iris*** (Linnaeus, 1758) **– Fluture-cu-irizații – Переливница ивовая**
3. ***Apatura metis*** (Freyer, 1829) **– Fluture metis – Переливница метида**
4. ***Argynnis aglaja*** Linnaeus, 1758 **– Fluture Aglaia – Перламутровка Аглая**
5. ***Neptis sappho*** (Pallas, 1771) **– Fluture pestriț sapfo – Пеструшка темнокрылая**

Aglais urticae (Linnaeus, 1758) **– Urzicar – Крапивница**
Familia **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecție: în Republica Moldova este inclusă în Lista Operațională și în Carte Roșie a Transnistriei , ca specie critic periclitată (categoria **CR)**.

Răspândirea generală*:** toată regiunea Palearctică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Zaozernoe-Nucari”.






Apatura iris (Linnaeus, 1758) **– Fluture-cu-irizații –**
Переливница ивовая
Familia **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), în Lista Operațională și Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **DD**). Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).
Răspândirea generală*:** arealul de tip disjunct: Europa Centrală și de Sud-Est, Caucaz, Asia Mică și apoi – Transbaikalia, ținutul Primorie, China, Coreea și Japonia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic în luncile Nistrului și Prutului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Tufa-Stânca Talmaza”.






Apatura metis (Freyer, 1829)**– Fluture metis – Переливница метида**
Familia **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie ca specie periclitată (categoria **VU**) și Lista Operațională. Inclusă în Lista Roșie a Europei (categoria **LR**), Anexa II a Convenției Berna, Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală*:** Europa de Est și de Sud-Est, Caucaz, Kazahstan, Siberia de Vest, Transbaikalia, ținutul Primorie, China, Coreea și Japonia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** luncile Nistrului și Prutului. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Lunca Talmaza”.






Argynnis aglaja Linnaeus, 1758 **– Fluture Aglaia – Перламутровка Аглая**
Familia **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



***Statutul*:** specie fără statut.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** arealul specii se extinde din Europa de Vest și Africa de Nord-Vest prin toată Eurasia până la Japonia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic, pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește rar – numai în complexul ”Valea Știubei”.






Neptis sappho (Pallas, 1771) **– Fluture pestriț sapfo – Пеструшка темнокрылая**
Familia **Nymphalidae** Rafinesque, 1815 **– Nimfalide – Нимфалиды**



Statutul**:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Lista Operațională. Inclusă în Lista Roșie a Europei (categoria **LR**).
Răspândirea generală**:** Europa de Est și de Sud-Est, Caucaz, Kazahstan, Siberia de Sud, China, Coreea și Japonia. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** zonele de nord și de centru. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Valea Știubei” și ”Valea Turcului”.





Familia **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**


1. ***Iphiclides podalirius*** Linnaeus, 1758 **– Fluture podalir – Подалирий**
2. ***Papilio machaon*** (Linnaeus, 1758) **– Fluture Mahaon – Махаон**
3. ***Parnassius mnemosyne*** (Linnaeus, 1758) **– Fluture-Apolon-negru – Мнемозина**
4. ***Zerynthia polyxena*** (Denis et Schiffermüller, 1775) **– Fluture polixena – Поликсена**

Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 **– Fluture podalir – Подалирий**
Familia **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III)**.
Răspândirea generală*:** toată Europa, Caucaz, Kazahstan, Altai, Asia Mică, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** se întâlnește pe întreg teritoriu. ***Pe teritoriul site-ului a fost semnalată în majoritatea complexelor.






Papilio machaon (Linnaeus, 1758) **– Fluture Mahaon – Махаон**
Familia **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II)**, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**) și Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**). Peste hotare este inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).

Răspândirea generală*:** toată Europa (exclusiv regiunile nordice și Anglia), Africa de Nord, Asia, America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele **”**Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa” și ”Valea Turcului”.








Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) **– Fluture-Apolon-negru – Мнемозина**
Familia **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II),** inclusă în Cartea Roșie ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **EN**). Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”), Anexa II a Convenției Berna și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală*:** Europa, Africa de Nord, Asia Centrală, estul Kazahstanului. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Valea Știubei” și ”Valea Turcului”.





Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller, 1775) **– Fluture polixena – Поликсена**

Familia **Papilionidae** Latreille, 1802 **– Papilionide – Парусники**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**) și în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**). Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”), Anexa II a Convenției Berna și Anexa IV a Direcitvei Habitate.

Răspândirea generală*:** Europa Centrală, de Sud și de Sud-Est, Caucazul de Vest, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa” și ”Valea Știubei”.





Familia **Pieridae** Duponchel, 1835 **– Pieride – Белянки**


1. ***Colias chrysotheme*** (Esper, 1781) **– Gălbioară aurie – Желтушка золотистая**

Colias chrysotheme (Esper, 1781) **– Gălbioară aurie – Желтушка золотистая**
Familia **Pieridae** Duponchel, 1835 **– Pieride – Белянки**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**) și în Lista Operațională. Inclusă în Lista Roșie a Europei (categoria **VU**).
Răspândirea generală*:** zona de stepă și de sud a silvostepei a Europei de Est, China de Nord-Est, Transbaikalia. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** rar în raioanele sud-estice și sudice. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Răscăieţi-Olăneşti”.






Familia **Riodinidae** Grote, 1895 **– Riodinide – Риодиниды**

1. ***Hamearis lucina*** Linnaeus, 1758 **– Fluture pestriț de-pădure – Пеструшка лесная**

Hamearis lucina Linnaeus, 1758 **– Fluture pestriț de-pădure – Пеструшка лесная**
Familia **Riodinidae** Grote, 1895 **– Riodinide – Риодиниды**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie ca specie critic periclitată (categoria **CR**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **DD**) și în Lista Operațională. Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”).
Răspândirea generală*:** Europa de Centru și de Sud-Est, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zonele de nord și centru. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Valea Turcului” și ”Valea Știubei”.





Familia **Scarabaeidae** Latreille, 1802 **– Scarabeide – Пластинчатоусые**


1. ***Oryctes nasicornis*** (Linnaeus, 1758) **– Gândac-rinocer – Жук-носорог**

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) **– Gândac-rinocer – Жук-носорог**
Familia **Scarabaeidae** Latreille, 1802 **– Scarabeide – Пластинчатоусые**



Statutul**:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III)**, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**) și în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**).
Răspândirea generală**:** Europa (cu excepția regiunilor nordice și Anglia), Africa de Nord, Asia Mică și Centrală, Caucaz și sudul Siberiei de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*****:** pe întreg teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, **”**Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Valea Turcului” și ”Valea Știubei”.






Familia **Scoliidae** Latreille, 1802 **– Scoliide – Сколии**


1. ***Megascolia maculata*** (Drury, 1773) **– Viespe gigant – Сколия-гигант**
2. ***Scolia hirta*** (Schrank, 1781) **– Viespe stepică – Сколия волосатая**

Megascolia maculata (Drury, 1773) **– Viespe gigant – Сколия-гигант**
Familia **Scoliidae** Latreille, 1802 **– Scoliide – Сколии**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III)**, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**) și Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**). Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Неоціненний**”).
Răspândirea generală*:** Europa (cu excepția nordului), Caucaz, Asia Centrală, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, **”**Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Răscăieţi-Olăneşti” și ”Valea Știubei”.






Scolia hirta (Schrank, 1781) **– Viespe stepică – Сколия волосатая**
Familia **Scoliidae** Latreille, 1802 **– Scoliide – Сколии**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**) și în Lista Operațională.
Răspândirea generală*:** Europa de Sud, Kazahstan, sudul Siberiei de Vest, Asia Centrală, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Răscăieţi-Olăneşti”.






Familia **Sphingidae** Latreille, 1802 **– Sfingide – Бражники**


1. ***Acherontia atropos*** (Linnaeus, 1758) **– Fluture-cap-de-mort – Бражник мертвая голова**
2. ***Proserpinus proserpina*** (Pallas, 1772) **– Porumbac proserpin – Бражник прозерпина**
3. ***Saturnia pyri*** (Denis et Schiffermüller, 1775) **– Ochi-de-păun-mare – Большой ночной павлиний глаз**

Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) **– Fluture-cap-de-mort – Бражник мертвая голова**
Familia **Sphingidae** Latreille, 1802 **– Sfingide – Бражники**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV)**, inclusă în Cartea Roșie (categoria **VU**). Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний**”).
Răspândirea generală*:** Africa tropicală, Madagaskar, Siria, Iraq, Kuwait, Iranul de nord-est, reigiunile vestice ale Arabiei Saidite. În partea de vest a Palearcticii este o specie călătoare, uneori poate zbura până în Europa Centrală și de Nord, inclusiv Islanda. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul **”**Lunca Talmaza”.








Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) **– Porumbac proserpin – Бражник прозерпина**
Familia **Sphingidae** Latreille, 1802 **– Sfingide – Бражники**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este inclusă în Cartea Roșie ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și în Lista Operațională. Inclusă în Anexa II a Convenției Berna și în Cartea Roșie a Ucrainei (категория ”**Рідкісний**”).
Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Sud, Caucaz, sudul Siberiei de Vest, Iran, Afganistanul de Est, China de Nord-Vest, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zonele de nord și de centru. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Valea Știubei”.






Saturnia pyri (Denis et Schiffermüller, 1775) **– Ochi-de-păun-mare – Большой ночной павлиний глаз**
Familia **Sphingidae** Latreille, 1802 **– Sfingide – Бражники**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III)**, inclusă în Cartea Roșie (categoria **VU**) și Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**). Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний**”).
Răspândirea generală*:** Europa Centrală și de Sud, Caucaz, Asia Mică, Iran. ***Răspândirea în Republica Moldova*:** pe întreg teritoriul țări. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Tufa-Stânca Talmaza”, **”**Lunca Talmaza” ”Răscăieţi-Olăneşti” și ”Valea Turcului”.





Familia **Tettigoniidae** Krauss, 1902 **– Tettigoniide – Настоящие кузнечики**

1. ***Onconotus servillei*** (Fischer von Waldheim, 1846) **– Cosașul-lui-Servillei – Шевчук Сервиля**
2. ***Saga pedo*** (Pallas, 1771) **– Cal de-stepă – Дыбка степная**

Onconotus servillei (Fischer von Waldheim, 1846) **– Cosașul-lui-Servillei – Шевчук Сервиля**

Familia **Tettigoniidae** Krauss, 1902 **– Tettigoniide – Настоящие кузнечики**




***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR .**

Starea de protecţie: este inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**) și în Lista Roșie IUCN (categoria **VU**).

Răspândirea generală*:** zona de stepă a Eurasiei (până la Siberia de Vest). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** zona de sud. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexul ”Cioburciu-Răscăieţi”.






Saga pedo (Pallas, 1771) **– Cal de-stepă – Дыбка степная**
Familia **Tettioniidae** Krauss, 1902 **– Tettigoniide – Настоящие кузнечики**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR .**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II)**, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**). Inclusă în Lista Roșie IUCN (categoria **VU**), Anexa II a Convenției Berna, Anexa IV Directivei Habitate și în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний**”).

Răspândirea generală*:** biotopuri stepicole cu arbuști ale Europei de Sud, sudul Uralului, Kazahstan, sudul Siberiei (până la Kirghizia). ***Răspândirea în Republica Moldova*:** sporadic în zonele centrală și sudică. ***Pe teritoriul site-ului se întâlnește numai în complexul ”Cioburciu-Răscăieți” pe coline stepizate.





Clasa **Amphibia** Linnaeus, 1758 **– Amfibieni – Земноводные**

Catalogul speciilor de amfibieni din site-ul Ramsar ”Nistrul de Jos”, protejate la nivel național și internațional, prezintă o listă adnotată a taxoanelor întâlnite pe acest teritoriu. Familiile și speciile sunt plasate în ordine alfabetică.

Pentru fiecare specie sunt prezentate următoarele caracteristici:

- denumirea în limba latină, română și rusă;
- apartenența la familie în limba latină;
- statutul (categoria de raritate);
- starea de protecție(includere în legislația ecologică a Republicii Moldova (categoriile de raritate ale speciilor protejate: I – specie dispărută, II – specie, amenințată cu dispariția, III – specie, efectivul căreia se micșorează catastrofal, ce poate să o pună în pericol de dispariție, IV – specie rară, V – specie nedeterminată, VI – specie restabilită, VII – specie insuficient studiată, VIII – specie, care nu provoacă îngrijorare) [199], Lista Operațională [181], Cartea Roșie a Republicii Moldova [9], Cartea Roșie a Transnistriei [112], Cartea Roșie a Ucrainei [186], Convenția de la Berna [11], Directiva Europeană pentru conservarea habitatelor [14];
- răspândirea generală [60.];
- răspândirea în Republica Moldova [4, 9, 25];
- răspândirea pe teritoriul site-ului – afilierea la complexele naturale;
- afilierea la habitate;
- foto de Țurcanu V.F. Au fost folosite materialele site-ului www.wikipedia.org

Speciile rare de amfibieni

În componența faunei de amfibieni a site-ului Ramsar ”Nistrul de Jos” au fost evidențiate **13** de specii protejați la nivel internațional și național [1, 2, 9, 25, 62, 63, 66, 67, 84, 134, 172-176]. Ele se deosebesc după gradul de raritate, sunt reprezentate de diferite populații, răspândirea unor dintre ele se limitează cu una sau câteva localități. Unele dintre specii necesită de măsuri speciale de conservare, mai ales speciile cu înalte categorii de raritate. Pentru ele este necesar un monitoring special al stării populațiilor locale.

Sub protecția statului în Republica Moldova [199] se află 2 specii rare (categoria **IV**) – *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761) și *Triturus cristatus* (Laurenti, 1786).

Cele mai rare specii, cu categorie de raritate mare (7 specii) sunt incluse în ediția a 3-a a Cărții Roșie a Republicii Moldova[9]: o specie critic periclitată (categoria **CR**) – *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768) și 6 specii vulnerabile (categoria **VU**) – *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761), *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758), *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758), *Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840), *Triturus cristatus* (Laurenti, 1786), *Triturus, vulgaris* (Laurenti, 1786).

Din Cartea Roșie a Transnistriei au fost înregistrate 4 specii [112]: una periclitată (categoria **EN**) – *Bufo bufo* (Linnaeus, 1758), una vulnerabilă (categoria **VU**) – *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768) și 2 specii (*Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840), *Triturus, vulgaris* (Laurenti, 1786) cu deficit de date (categoria **DD**).

Din Lista Operațională, alcătuită în urma elaborării a Rețelei Ecologice Naționale, pe teritoriul site-ului Ramsar ”Nistrul de Jos” au fost înregistrate 7 specii de amfibieni [180].

Din Cartea Roșie a Ucrainei pe teritoriul site-ului au fost semnalate 2 specii [186], dintre care una cu categoria de raritate ”**Вразливий**” – *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761) și alta cu categoria ”**Зникаючий**” – *Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840).


Din listele Convenției europene despre conservarea speciilor sălbatice (Convenția de la Berna, 1979) [11] au fost înregistrate: *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761), *Bufo viridis* (Laurenti, 1786), *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758), *Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840), *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768), *Triturus cristatus* (Laurenti, 1786).

În Anexele II și IV ale Directivei pentru Habitate (Directiva Consiliului 92/43/EEC din 21 mai 1992 despre conservarea habitatelor și a florei și faunei sălbatice) [14] sunt incluse 6 specii – *Bombina bombina* (Linnaeus, 1761), *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768), *Triturus cristatus* (Laurenti, 1786), *Triturus, vulgaris* (Laurenti, 1786), *Hyla arborea* (Linnaeus, 1758) și *Rana dalmatina* (Bonaparte, 1840).

Familia **Bufonidae** J.E.Gray, 1825 **– Bufonide – Жабы**


1. ***Bufo bufo*** Linnaeus, 1758 – **Broască râioasă sură** – **Жаба обыкновенная**
2. ***Bufo viridis*** Laurenti, 1786 – **Broască râioasă verde** – **Жаба зеленая**

Bufo bufo Linnaeus, 1758 – **Broască râioasă sură** – **Жаба обыкновенная**
Familia **Bufonidae** J.E.Gray, 1825 **– Bufonide – Жабы**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: este incusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**) și Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **EN**).

Răspândirea generală: nord-vestul Africii, în parte mare a Europei și Asiei temperate, până la Baikal. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** preponderent habitatele silvice cu umeditate sporită; lipseşte în zona de stepă. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în toate complexele cu sectoare silvice.






Bufo viridis Laurenti, 1786 – **Broască râioasă verde** – **Жаба зеленая**
Familia **Bufonidae** J.E.Gray, 1825 **– Bufonide – Жабы**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Incusă în Lista a Convenţiei de la Berna și în Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: Europa Centrală și de Sud, Asia de Vest și Centrală, până la Kazahstan ***Răspândirea în Republica Moldova:*** comună pe tot teritoriul țării, evitând sectoarele de pădure. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în majoritatea complexelor, dar evită sectoarele de pădure deasă.






Familia **Discoglossidae** Fitzinger, 1843 **– Discogloside – Круглоязычные**


1. ***Bombina bombina*** Linnaeus, 1761 **– Izvoraş-cu-abdomen-roşu – Жерлянка краснобрюхая**

Bombina bombina Linnaeus, 1761 **– Izvoraş-cu-abdomen-roşu – Жерлянка краснобрюхая**
Familia **Discoglossidae** Fitzinger, 1843 **– Discogloside – Круглоязычные**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”), Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: sud-estul și centrul Europei, până la Munții Ural. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** comună în bazine acvatice pe tot teritoriul țării, inclusiv şi în sectoarele de pădure. ***Pe teritoriul site-ului*** este răspândită în toate complexele unde sunt prezente habitate palustre.





Familia **Hylidae** Rafinesque, 1815 **– Hilide – Квакши**

1. ***Hyla arborea*** Linnaeus, 1758 – **Brotăcel (Buratic)** – **Квакша обыкновенная**

Hyla arborea Linnaeus, 1758 – **Brotăcel (Buratic)** – **Квакша обыкновенная**

Familia **Hylidae** Rafinesque, 1815 **– Hilide – Квакши**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: incusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Anexa II a Convenţiei de la Berna și Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde întreagă Europa, se extinde spre est până în munții Ural și Caucaz, Asia Mică, nord-vestul Africii. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este o specie comună, răspândită pe tot teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** este răspândită în toate complexele. Preferă zonele împădurite, cu arbuști sau stufăriș.





Familia **Pelobatidae** Bonoparte, 1850 **– Pelobatide – Чесночницы**


1. ***Pelobates fuscus*** **Laurenti, 1768 – Broasca brună de-câmp – Чесночница обыкновенная**

Pelobates fuscus Laurenti, 1768 **– Broasca brună de-câmp – Чесночница обыкновенная**
Familia **Pelobatidae** Bonoparte, 1850 **– Pelobatide – Чесночницы**

***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **CR**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), Lista Operațională, Anexa II a Cionvenţiei de la Berna și în Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspîndirea generală: de la Europa Centrală până în regiunile vestice ale Asiei. ***Răspîndirea în Republica Moldova:*** tot teritoriul, dar în populaţii sporadice, puţin numeroase. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în comlexele "Tufa-Stânca Talmaza", "Copanca-Leuntea", "Lunca Talmaza", "Răscăieți-Olănești", "Lunca Olănești-Crocmaz", "Crocmaz-Tudora", "Tudora-Palanca". Preferă zonele cu soluri nisipoase, sau argiloase în care se poate afunda cu ușurință.








Familia **Ranidae** Rafinesque, 1814 **– Ranide – Лягушки настоящие**

1. ***Rana dalmatina*** Bonaparte, 1840 – **Broască roşie** de-pădure – **Лягушка прыткая**

Rana dalmatina Bonaparte, 1840 – **Broască roşie de-pădure – Лягушка прыткая**
Familia **Ranidae** Rafinesque, 1814 **– Ranide – Лягушки настоящие**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: incusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **DD**), Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Зникаючий**”), în Anexa II a Convenţiei de la Berna și Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: de la centrul și sudul Europei până la nord-vestul părții asiatice a Turciei. Limita de nord a arealului trece prin Belgia, Germania și vestul Ucrainei. La sud arealul ocupă Italia și peninsula Balcanică. Sunt populații izolate în Danemarka, Suedia și Polonia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** din cauza fragmentării habitatului are o răspândire limitată. Populează preponderent biotopurile silvice cu umeditate sporită din nordul şi centrul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele “Tufa-Stânca Talmaza” și “Grădina Turcească”.





Familia **Salamandridae** Goldfuss, 1820 **– Salamandride – Саламандровые**


1. ***Triturus cristatus*** Laurenti, 1786 **– Triton crestat – Тритон гребенчатый**
2. ***Triturus vulgaris*** Laurenti, 1786 **– Triton comun – Тритон обыкновенный**

Triturus cristatus Laurenti, 1786 **– Triton crestat – Тритон гребенчатый**
Familia **Salamandridae** Goldfuss, 1820 **– Salamandride – Саламандровые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Lista Operațională, în Anexa II a Convenţiei de la Berna și Anexele II și IV ale Directivei Habitate.
Răspândirea generală: arealul speciei ocupă cea mai mare parte a Europei, regiunile nord-vestice ale Federației Ruse până la Munții Ural. Limita de sud trece prin Alpi, România, Republica Moldova de-a lungul Mării Negre. La nord este limitat de regiunile sudice ale Suediei și Finlandei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe întreg teritoriul țării, dar (cu excepţia unor locuri) nu este numeros. ***Pe teritoriul site-ului*** este răspândită în toate complexele unde sunt habitate palustre.






Triturus vulgaris Laurenti, 1786 **– Triton comun – Тритон обыкновенный**
Familia **Salamandridae** Goldfuss, 1820 **– Salamandride – Саламандровые**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **DD**) și în Anexa II a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde o mare parte a Europei (cu excepția peninsulei Iberice, sudul Italiei, Franței și nordul Scandinaviei). La est se extinde până la Munții Altai. La sud ajunge până la centrul Italiei, sudul Balcanilor și nord-vestul Turciei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** aproape tot teritoriul țării, dar (cu excepţia unor regiuni de stepă) nu este numeros. ***Pe teritoriul site-ului*** este răspândită în toate complexele cu bazine acvatice.







Clasa **Reptilia** Laurenti, 1768 **– Reptile – Пресмыкающиеся**

Catalogul speciilor de reptile din site-ul Ramsar ”Nistrul de Jos”, protejate la nivel național și internațional, prezintă o listă adnotată a taxoanelor întâlnite pe acest teritoriu. Familiile și speciile sunt plasate în ordine alfabetică.

Pentru fiecare specie sunt prezentate următoarele caracteristici:

- denumirea în limba latină, română și rusă;
- apartenența la familie în limba latină;
- statutul (categoria de raritate);
- starea de protecție de protecție (includere în legislația ecologică a Republicii Moldova (categoriile de raritate ale speciilor protejate: I – specie dispărută, II – specie, amenințată cu dispariția, III – specie, efectivul căreia se micșorează catastrofal, ce poate să o pună în pericol de dispariție, IV – specie rară, V – specie nedeterminată, VI – specie restabilită, VII – specie insuficient studiată, VIII – specie, care nu provoacă îngrijorare) [199], Lista Operațională [181], Cartea Roșie a Republicii Moldova [9], Cartea Roșie a Transnistriei [112], Cartea Roșie a Ucrainei [186], Listele IUCN [21] și a Europei [22], Convenția de la Berna [11], Directiva Europeană pentru conservarea habitatelor [14];
- răspândirea generală [60];
- răspândirea în Republica Moldova [4, 9, 25];
- răspândirea pe teritoriul site-ului – afilierea la complexele naturale;
- afilierea la habitate;
- foto de Țurcanu V.F. Au fost folosite materialele site-ului www.wikipedia.org

Specii rare de reptile

În componența faunei de reptile a site-ului Ramsar ”Nistrul de Jos” au fost evidențiate 10 specii de reptile [1, 2, 9, 24, 29, 37-39, 52, 61, 63, 66, 67, 83, 134, 172, 173, 175, 180, 182-184], protejate la nivel internațional și național. Ele se deosebesc după gradul de raritate, sunt reprezentate de diferite populații, răspândirea unor dintre ele se limitează cu una sau câteva localități. Unele dintre specii necesită de măsuri speciale de conservare, mai ales speciile cu înalte categorii de raritate.

Sub protecția statului în Republica Moldova se află 7 specii [199]: 4, efectivul cărora se micșorează catastrofal de repede, ce poate să le plaseze în pericol de dispariție (categoria **III**) – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Natrix natrix* (Linnaeus, 1758), *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768), *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768); 3 specii rare (categoria **IV**) – *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), *Elaphe quatuorlineata* (Lacepede, 1789), *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758).

Cele mai rare specii, cu categorie de raritate mare (7 specii) sunt incluse în ediția a 3-a a Cărții Roșie a Republicii Moldova [9]: o specie critic periclitată (categoria **CR**) – *Elaphe quatuorlineata* (Lacepede, 1789); 4 specii periclitate (categoria **EN**) – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758), *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768).

Din Cartea Roșie a Transnistriei au fost înregistrate 4 specii: 2 periclitate (categoria **EN**) – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768); o specie vulnerabilă (categoria **VU**) – *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) și una (*Elaphe quatuorlineata* (Lacepede, 1789) cu deficit de date (categoria **DD**).

Din Lista Operațională, alcătuită în urma elaborării a Rețelei Ecologice Naționale, pe teritoriul site-ului Ramsar ”Nistrul de Jos” au fost înregistrate 5 specii [181].

Pe teritoriul site-ului se întâlnesc specii de reptile, care sunt rare și în țara vecină – Ucraina. Astfel în Cartea Roșie a Ucrainei se regăsesc 4 specii [186], dintre care 3 sunt atribuite la categoria ”**Вразливий**” – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), *Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758) și o specie (*Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768) la categoria ”**Зникаючий**”.

Din Lista Roșie IUCN sunt prezente 3 specii [21]: *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768) cu categoria ”**VU**” și 2 specii – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758) și *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) cu categoria ”**NT**”.

Din Lista Roșie a Europei au fost semnalate 3 specii [22]: *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768) cu categoria ”**VU**” și 2 specii – *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758) și *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758) cu categoria ”**NT**”.

Din listele Convenției europene despre conservarea speciilor sălbatice (Convenția de la Berna, 1979) [11] au fost înregistrate 8 specii strict protejate: *Coluber caspius* (Linnaeus, 1758), *Coronella austriaca* (Laurenti, 1768), *Elaphe quatuorlineata* (Lacepede, 1789), *Emys orbicularis* (Linnaeus, 1758), *Lacerta agilis* (Linnaeus, 1758), *Lacerta viridis* (Laurenti, 1768), *Natrix tessellata* (Laurenti, 1768), *Zamenis longissimus* (Laurenti, 1768).

În Anexele II și IV ale Directivei pentru Habitate (Directiva Consiliului 92/43/EEC din 21 mai 1992 despre conservarea habitatelor și a florei și faunei sălbatice) [14] sunt incluse aceleași 8 specii, protejate de Convenția de la Berna.

Familia **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**

1. ***Coluber caspius*** Linnaeus, 1758 **– Şarpe-cu-abdomen-galben – Полоз желтобрюхий**
2. ***Coronella austriaca*** Laurenti, 1768 **– Şarpe-de-alun – Медянка**
3. ***Elaphe quatuorlineata*** Lacepede, 1789 **– Şarpe-cu-patru-dungi – Полоз четырехполосый**
4. ***Natrix tessellata*** Laurenti, 1768 **– Şarpe-de-apă – Уж водяной**
5. ***Zamenis longissimus*** Laurenti, 1768 **– Şarpele-lui-Esculap – Полоз Эскулапов**

Coluber caspius Linnaeus, 1758 **– Şarpe-cu-abdomen-galben – Полоз желтобрюхий**
Familia **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**


***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **EN**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **EN**), în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Зникаючий**”), în Lista Operațională, Lista roșie a Europei și a IUCN (categoria **NT**), în Anexa II a Convenţiei de la Berna și în Anexele II și IV ale Directivei Habitate.

Răspândirea generală: nord-estul peninsulei Balcanice, spre nord până în Ungaria, zonele de sud ale României, Republicii Moldova, Ucrainei, Rusiei europene, estul Kazahstanului, Transcaucasia, Turcia de Nord și Iordania. Populații izolate au fost înregistrate în nordul Turkmeniei și Iranului. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** raioanele de sud, valea fluviului Nistru pe intervalul Camenca-Palanca, Răutul Inferior. ***Pe teritoriul site-ului*** este răspândit în complexele ”Copanca-Leuntea” și ”Tufa-Stânca Talmaza”. Preferă râpile împădurite







Coronella austriaca Laurenti, 1768 **– Şarpe-de-alun – Медянка**
Familia **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**




***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **EN**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **EN**), în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”), în Lista Operațională, în Lista roșie a Europei și a IUCN (categoria **VU**), inclusă în Anexa II a Convenției de la Berna și Anexele II și IV ale Directivei Habitate.

Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde aproape tot teritoriul Europei (cu excepție a Irlandei, o mare parte a Marii Britanie, centrul și sudul peninsulei Iberice) și se extinde până în vestul Kazahstanului și Caucaz.

Răspândirea în Republica Moldova: întreg teritoriu, dar având o distribuție neuniformă. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca Leuntea”, ”Tufa-Stînca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Cârnățeni”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”. Manifestă preferință ecotonurilor silvice şi sectoarelor de stepă crescute cu arbuşti.






Elaphe quatuorlineata (Lacepede, 1789) **– Şarpe-cu-patru-dungi – Полоз четырехполосый**
Familia **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**



***Statutul*: specie critic periclitată – CR.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Lista Operațională, în Anexa II a Convenţiei de la Berna şi Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: sud-estul Europei, Asia Mică, Caucaz, sud-vestul Kazahstanului, nord-vestul Turkmenistanului și vestul Iranului. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** zona de stepă, dar în prezent este pe cale de dispariţie, formând câteva populaţii izolate. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexul ”Cioburciu-Răscăieți” pe coline stepizate.






Natrix tessellata Laurenti, 1768 **– Şarpe-de-apă – Уж водяной**
Familia **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III**), inclusă în lista Convenţiei de la Berna și în Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: Europa de Sud, Centrală, peninsula Balcanică, Asia Mică și Centrală, până la Golful Persic și lacul Balhaș. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** specie obişnuită, mai des întâlnită în lunca Prutului, Nistrului şi a unor afluenţi ai lor. Local poate fi numeroasă (în special în preajma gospodăriilor piscicole). ***Pe teritoriul site-ului*** este răspândită în toate complexele cu bazine acvatice.






Zamenis longissimus Laurenti, 1768 **– Şarpele-lui-Esculap – Полоз Эскулапов**
Familia **Colubridae** Oppel, 1811 **– Colubride – Ужеобразные**

***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **EN**), Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Зникаючий**”), în Lista Operațională, în Anexa II a Convenţiei de la Berna și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: centrul și sudul Europei (inclusiv România și Republica Moldova), perimetrul Mării Caspice, Turcia, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** lunca Nistrului, parțial de-a lungul Prutului și Răutului Inferior ***Pe teritoriul site-ului*** a fost înregistrată în complexele silvice ”Copanca Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Zaozernoe-Nucari”, unde formează populaţii locale.







Familia **Emydidae** Rafinesque, 1815 **– Emidide – Американские пресноводные черепахи**


1. ***Emys orbicularis*** Linnaeus, 1758 **– Broasca țestoasă de-apă – Черепаха болотная**

Emys orbicularis Linnaeus, 1758 **– Broasca țestoasă de-apă – Черепаха болотная**
Familia **Emydidae** Rafinesque, 1815 **– Emidide – Американские пресноводные черепахи**

***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **EN**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), în Lista Operațională, Lista roșie a Europei și a IUCN (categoria **NT**), în Anexa III a Convenției de la Berna și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: Europa Centrală și de Sud, Asia Mică, nord-vestul Africii. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sporadic, pe întreg teritoriu, fiind mai frecventă în luncile Prutului şi Nistrului, în unele gospodării piscicole. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în toate complexele cu bazine acvatice, prevalând în ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Tudora-Palanca”.







Familia **Lacertidae** Bonoparte, 1831 **– Lacertide – Ящерицы настоящие**


1. ***Lacerta agilis*** Linnaeus, 1758 **– Şopârla ageră (Şopârla cenuşie) – Ящерица прыткая**
2. ***Lacerta viridis*** Linnaeus, 1758 **– Şopârla verde – Ящерица зеленая**

Lacerta agilis Linnaeus, 1758 **– Şopârla ageră (Şopârla cenuşie) – Ящерица прыткая**
Familia **Lacertidae** Bonoparte, 1831 **– Lacertide – Ящерицы настоящие**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Este inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”), listele Convenţiei de la Berna și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: o parte mare a Eurasiei - de la sudul Angliei și centrul Franței până la vestul Chinei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe întreg teritoriul țării (cu excepţia Codrilor Centrali). Specie cu plasticitate ecologică sporită în condiţiile de agrolandșaft. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în toate complexele, preferând sectoarele deschise.






Lacerta viridis Linnaeus, 1758 **– Şopârla verde – Ящерица зеленая**
Familia **Lacertidae** Bonoparte, 1831 **– Lacertide – Ящерицы настоящие**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Este inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий**”), în listele Convenției de la Berna și în Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: arealul speciei se extinde din centrul și sudul Europei până la litoralul estic al Mării Negre. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** specie obişnuită pe întreg teritoriul țării (cu excepţia unor raioane din zona de stepă). ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în toate complexele, prevalând în cele cu sectoarele silvice – ”Copanca Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Cârnățeni”, ”Purcari” și ”Împărăteasa”.







Clasa **Aves** Linnaeus, 1758 **– Păsări – Птицы**

Catalogul speciilor de păsări din site-ul Ramsar ”Nistrul de Jos”, incluse în diferite documente de protecție la nivel național și internațional, prezintă o listă adnotată a taxonilor, care se întâlnesc pe acest teritoriu. Împreună cu speciile rare, în atlas sunt prezentate și multe păsări obișnuite sau chiar numeroase, dar care totuși au fost incluse în listele Convențiilor de la Berna, Bonn, ș.a. (de exemplu, *Corvus frugilegus* (Linnaeus, 1758), *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758, *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758), *Turdus merula* (Linnaeus, 1758), *Turdus philomelos* (Brehm, 1831), *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758), *Parus major* (Linnaeus, 1758), *Corvus cornix* (Linnaeus, 1758), *Lanius collurio* (Linnaeus, 1758), *Merops apiaster* Linnaeus, 1758 ș.a.).
Familiile și speciile în interiorul familiilor sunt plasate în mod alfabetic.
Pentru fiecare specie sunt prezentate următoarele caracteristici:

- denumirea în latină [145 și a.], română și rusă;
- apartenența la familie în limba latină [145 și a.];
- statutul (categoria de raritate);
- starea de protecție (includere în legislația ecologică a Republicii Moldova (categoriile de raritate ale speciilor protejate: I – specie dispărută, II – specie, amenințată cu dispariția, III – specie, efectivul căreia se micșorează catastrofal, ce poate să o puie în pericol de dispariție, IV – specie rară, V – specie nedeterminată, VI – specie restabilită, VII – specie insuficient studiată, VIII – specie, care nu provoacă îngrijorare) [199], Lista Operațională [88], Cartea Roșie a Republicii Moldova [9], Cartea Roșie a Transnistriei [112], Cartea Roșie a Ucrainei [186], Listele IUCN [21], Convenția de la Berna [11], Convenția de la Bonn [12], Directiva Europeană pentru conservarea speciilor rare de păsări (Directiva Păsări) [13];
- răspândirea generală [42, 44, 145 și a.];
- răspândirea în Republica Moldova [27, 43-45 și a.];
- răspândirea pe teritoriul site-ului – afilierea la complexele naturale;
- afilierea la habitate;
- informație despre ecologia și nutriția speciei [43-45 și a.];
- foto de Tișcencov A.A. și Romanovici N.A. Использованы материалы сайта www.wikipedia.org

Ornitofauna și speciile rare de păsări

Ornitofauna din site-ul Ramsar ”Nistrul de Jos” enumeră cca **200** specii [1, 2, 26, 27, 43-45, 52, 55-59, 64, 69-75, 80-82, 86, 87, 89-93, 112-117, 123-128, 131, 140, 141, 147-171, 196, 197]. În Atlas au fost incluse **183** specii de păsări, prezente în listele de conservare a naturii la nivel internațional și național. O parte dintre aceste specii cuibăresc pe teritoriul site-ului, altele – se întâlnesc aici numai în timpul migrației sau iarna. Răspândirea reproductivă a speciilor poate fi indicată numai pentru un punct sau câteva, iar în perioada migrațiilor ele se întâlnesc pretutindeni. Unele specii sunt atât de rare, că necesită măsuri de protecție specială. Pentru acestea este necesar un monitoring al stării populațiilor.

În Lista Roșie IUCN [21] sunt incluse 14 specii de păsări (speciile din categoria **LC** nu s-au luat în calcul). Dintre acestea o specie se atribuie la categoria periclitate (**EN**) - *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834); 5 specii sunt vulnerabile (**VU**) - *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758), *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758); 8 specii sunt aproape de starea vulnerabilă (categoria **NT**) – *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758), *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770), *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763), *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766), *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758), *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758), *Turdus iliacus* (Linnaeus, 1766), *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758).

Sub protecția statului în Republica Moldova [199] se află 56 specii: 13 sunt amenințate cu dispariția (categoria II) – *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758), *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Aquila pomarina* (Ch.L. Brehm, 1831), *Ardea alba* (Linnaeus, 1758), *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758), *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788), *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758), *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758), *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788), *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834), *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758), *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766); 3 specii, efectivul cărora se micșorează catastrofal, ce poate să le puie în pericol de dispariție (categoria III) – *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763), *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766), *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758); 12 specii rare (categoria IV) – *Ardea purpurea* (Linnaeus, 1766), *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769), *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758), *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758), *Columba oenas* (Linnaeus, 1758), *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus olor* (Gmelin, 1789), *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766), *Otus scops* (Linnaeus, 1758), *Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758), *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773), *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764); statutul la 7 specii nu a fost determinat (categoria V) - *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758), *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758), *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758), *Falco peregrinus* (Tunstal, 1771), *Milvus migrans* (Boddaert, 1783), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758); 9 specii sunt caracterizate ca insuficient studiate (categoria VII) – *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850), *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758), *Asio otus* (Linnaeus, 1758), *Caprimulgus europaeus* (Linnaeus, 1758), *Corvus corax* (Linnaeus, 1758), *Crex crex* (Linnaeus, 1758), *Falco subbuteo* (Linnaeus, 1758), *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758), *Podiceps ruficollis* (Pallas, 1764); starea la 12 specii nu provoacă îngrijorări (categoria VIII) – *Athene noctua* (Scopoli, 1769), *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758), *Columba palumbus* (Linnaeus, 1758), *Coracias garrulus* (Linnaeus, 1758),

Buteo buteo (Linnaeus, 1758), *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763), *Falco tinnunculus* (Linnaeus, 1758), *Phasianus colchicus* (Linnaeus, 1758), *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758), *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758), *Strix aluco* (Linnaeus, 1758), *Upupa epops* Linnaeus, 1758.

În Cartea Roșie a Republicii Moldova [9] sunt incluse 42 specii de păsări: 20 specii critic periclitate (categoria **CR**) – *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758), *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Aquila pomarina* (Ch.L. Brehm, 1831), *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763), *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770), *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758), *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788), *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766), *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758), *Columba oenas* (Linnaeus, 1758), *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758), *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788), *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834), *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764), *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), *Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758), *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758), *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773), *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758), *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766); 5 specii periclitate (categoria **EN**) – *Ardea alba* (Linnaeus, 1758), *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769), *Crex crex* (Linnaeus, 1758), *Falco peregrinus* (Tunstal, 1771), *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758); 17 specii vulnerabile (categoria **VU**) – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758), *Ardea purpurea* (Linnaeus, 1766), *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758), *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758), *Coracias garrulus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus olor* (Gmelin, 1789), *Dendrocopos medius* (Linnaeus, 1758), *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758), *Falco vespertinus* (Linnaeus, 1766), *Milvus migrans* (Boddaert, 1783), *Porzana parva* (Scopoli, 1769), *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766), *Porzana pusilla* (Pallas, 1776), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764), *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758).

În Cartea Roșie a Transnistriei [112] sunt incluse 38 specii: 6 specii periclitate (categoria **EN**) – *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763), *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770), *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788), *Columba oenas* (Linnaeus, 1758), *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758); 30 specii vulnerabile (categoria **VU**) – *Anas strepera* (Linnaeus, 1758), *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758), *Aquila pomarina* (Ch.L. Brehm, 1831), *Ardea alba* (Linnaeus, 1758), *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769), *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758), *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758), *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827), *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758), *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758), *Crex crex* (Linnaeus, 1758), *Coracias garrulus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758), *Cygnus olor* (Gmelin, 1789), *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758), *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788), *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758), *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834), *Falco peregrinus* (Tunstal, 1771), *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758), *Milvus migrans* (Boddaert, 1783), *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758), *Otus scops* (Linnaeus, 1758), *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), *Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758), *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773), *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758), *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Strix aluco* (Linnaeus, 1758); 1 specie cu statut nedeterminat (categoria **NE**) - *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766) și o specie cu deficit de date (categoria **DD**) - *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850).

În Lista Operațională, alcătuită în procesul de elaborare a Rețelei Ecoloice Naționale a Republicii Moldova, au fost incluse 30 specii de păsări [88].

Pe teritoriul site-ului se întâlnesc 34 specii, incluse în Cartea Roșie a Ucrainei [186], dintre care 7 specii cu categoria ”**Зникаючий**” – *Accipiter brevipes* (Severtzov, 1850), *Coracias garrulus* (Linnaeus, 1758), *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758), *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758), *Pelecanus onocrotalus* (Linnaeus, 1758), *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773), *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803); 12 specii cu categoria ”**Вразливий**” – *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758), *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758), *Aythya nyroca* (Guldenstadt, 1770), *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758), *Columba oenas* (Linnaeus, 1758), *Falco cherrug* (I.E. Gray, 1834), *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758), *Milvus migrans* (Boddaert, 1783), *Platalea leucorodia* (Linnaeus, 1758), *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766), *Rufibrenta ruficollis* (Pallas, 1769), *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764); 15 specii cu categoria ”**Рідкісний**” – *Anas strepera* (Linnaeus, 1758), *Aquila clanga* (Pallas, 1811), *Aquila pomarina* (Ch.L. Brehm, 1831), *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769), *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763), *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758), *Circaetus gallicus* (Gmelin, 1788), *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766), *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758), *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1827), *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758), *Hieraaetus pennatus* (Gmelin, 1788), *Falco peregrinus* (Tunstal, 1771), *Lanius excubitor* (Linnaeus, 1758), *Otus scops* (Linnaeus, 1758);

Lista Convenției de la Berna [11] este cea mai bogată în păsări, înregistrate în limitele site-ului – 132 specii. Păsările migrătoare sunt indicate în lista Convenției de la Bonn [12] – 65 specii.

Din lista Directivei Europene pentru păsări [13], 108 specii se întâlnesc în limitele site-ului Ramsar ”Nistrul de Jos”.

Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


1. ***Accipiter brevipes*** (Severtzov, 1850) **– Uliu-cu-picioare-scurte – Тювик европейский**
2. ***Accipiter gentilis*** (Linnaeus, 1758) **– Uliu porumbar – Ястреб-тетеревятник**
3. ***Accipiter nisus*** (Linnaeus, 1758) **– Uliu păsărar – Ястреб-перепелятник**
4. ***Aquila chrysaetos*** (Linnaeus, 1758) **– Acvilă de-munte – Беркут**
5. ***Aquila clanga*** (Pallas, 1811) – **Acvilă ţipătoare mare – Подорлик большой**
6. ***Aquila pomarina*** (Ch.L. Brehm, 1831) **– Acvilă ţipătoare mică – Подорлик малый**
7. ***Buteo buteo*** (Linnaeus, 1758) **– Șorecar comun – Канюк**
8. ***Buteo lagopus*** (Pontoppidan, 1763) **– Șorecar încălțat – Зимняк**
9. ***Buteo rufinus*** (Cretzschmar, 1827) **– Șorecar roșu – Курганник**
10. ***Circaetus gallicus*** (Gmelin, 1788) – **Şerpar** – **Змееяд**
11. ***Circus aeruginosus*** (Linnaeus, 1758) **– Erete de-stuf – Лунь болотный**
12. ***Circus cyaneus*** (Linnaeus, 1766) **– Erete vânăt – Лунь полевой**
13. ***Circus pygargus*** (Linnaeus, 1758) – **Erete sur** – **Лунь луговой**
14. ***Haliaeetus albicilla*** (Linnaeus, 1758) **– Codalb – Орлан-белохвост**
15. ***Hieraaetus pennatus*** (Gmelin, 1788) **– Acvilă pitică – Орел-карлик**
16. ***Milvus migrans*** (Boddaert, 1783) **– Gaie neagră – Коршун черный**
17. ***Pernis apivorus*** (Linnaeus, 1758) **– Viespar – Осоед**

Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) **– Uliu-cu-picioare-scurte – Тювик европейский**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **DD**) și a Ucrainei (categoria **Зникаючий**), listele Convențiilor de la Berna și Bonn, Directiva Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Balcani, Asia Mică, sudul Europei de Est, Kazahstanul de Vest, Transcaucasia, Iran. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pădurile de luncă ale Nistrului de Jos. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexul ”Răscăieţi-Olănești”. A fost semnalată în timp de iarnă în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”. Vânează în lizierile pădurilor, sectoarele de stepă și lunci. Se hrănește cu șopârle, insecte mari, rozătoare și păsări mici.







Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) **– Uliu porumbar – Ястреб-тетеревятник**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


Statutul**:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **V**), inclusă în Lista Operațională, listele Convențiilor de la Berna și Bonn.

Răspândirea generală: regiunile de pădure și munte ale Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cu regularitate diferită cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Chiţcani”. În timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în toate complexele. Vânează în diferite biotopuri. Se hrănește în principal cu păsări.








Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) **– Uliu păsărar – Ястреб-перепелятник**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **V**), inclusă în Lista Operațională, listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: zonele temperate și subtropicale ale Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”. În timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în toate complexele. Vânează în diferite biotopuri. Se hrănește în principal cu păsări mici.






Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – **Acvilă de-munte** – **Беркут**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – *Ястребиные***

***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**), în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulneravilă (categoria **VU**), Lisa operaţională, listele Convenţiilor de la Berna şi Bonn.
Răspândirea generală: Eurasia, America şi Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** specie politopică. Se întâlneşte rar şi neregular în timpul migraţiei. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte numai la migraţie în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.







Aquila clanga (Pallas, 1811) – **Acvilă ţipătoare mare** – **Подорлик большой**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**), în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie periclitată (categoria **EN**), Lista Operaţională, în Cartea Roșie a Ucraunei (categoria ”**Рідкісний**”), Convenţiile de la Berna şi Bonn, în Lista roșie IUCN (**VU**).



Răspândirea generală: zona de silvostepă a Europei de Est, ajungând până în China de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** foarte rar în timpul migraţiei. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește foarte rar în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi” și **”**Diculi-Cuţa-Maţarinskii” numai în timpul migrației.





Aquila pomarina (Ch.L. Brehm, 1831) – **Acvilă ţipătoare mică** – **Подорлик малый**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), Cartea Roşie a republicii Moldova (categoria **CR**), în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulneravilă (categoria **VU**), Lista Operaţională, Convenţiile de la Berna şi Bonn, Directiva Păsări.

Răspândirea generală: Europa de Est, Caucaz, Asia Mică şi Centrală, parţial în India. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** foarte rar şi neregular populează pădurile centrale şi cele de luncă. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește rar (complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”) și numai în timpul migrației.







Buteo buteo (Linnaeus, 1758) **– Șorecar comun – Канюк**

Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională, listele Convențiilor de la Berna și Bonn.



Răspândirea generală: nordul Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** din noiembrie până în martie – toate raioanele. ***Pe teritoriul sitului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chițcani”. În timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în toate complexele. Vânează în câmpuri, loturi părăsite, lunci și sectoare de stepă, în liziere de păduri. Se hrănește în principal cu șoareci.






Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) **– Șorecar încălțat – Зимняк**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională, listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: nordul Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** din noiembrie până în martie – toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în toate complexele. Vânează în câmpuri, loturi părăsite, lunci și parcele de stepă, în liziere de păduri. Se hrănește în principal cu șoareci și păsări mici.







Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) **– Șorecar roșu – Курганник**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**) și a Ucrainei (**Рідкісний**), listele Convențiilor de la Berna și Bonn, Directiva Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).



Răspândirea generală: Europa și Asia de Nord (cu excepția zonei de tundră), America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** cuibărește în raionul Rezina; în timpul migrației și iarna – raioanele din sudul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna a fost semnalată în complexul ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Vânează în lunci, terenuri nelucrate, câmpuri, în lizierile pădurilor și tufărișuri. Se hrănește în principal cu soareci, păsări mici, etc.








Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) – **Şerpar** – **Змееяд**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

***Statutul*:** specie critic periclitată **– CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie periclitată (categoria **EN**), Lista Operaţională, Convenţiile de la Bonn şi Berna.

Răspândirea generală: sudul Europei de Vest, Africa. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se întâlneşte în timpul migraţiei de-a lungul luncilor Nistrului şi Prutului. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte foarte rar, numai în complexul ”Cioburciu-Răscăeţi”.







Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) **– Erete de-stuf – Лунь болотный**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**


***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Lista Operațională, listele Convențiilor de la Berna și Bonn, Directiva Păsări.



Răspândirea generală: zona temperată a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raionele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. În timpul migrației și translocărilor de nutriție adițional a fost semnalat în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovîi cut”. Vânează în preajma bazinelor acvatice, în lunci, terenuri nelucrate și câmpuri agricole. Se hrănește în principal cu vertebrate semiacvatice mici: păsări, mamifere mici (șoareci, ondatră, ș.a.), broaște, etc.





Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) **– Erete vânăt – Лунь полевой**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **III**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Cartea Roşie a Transnistriei (categoria **NE**), în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria **Рідкісний**), listele Convențiilor de la Berna și Bonn, Directiva Păsări.

Răspândirea generală: Europa și Asia de Nord (fără zona tundrei), America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației – toate raionele, iarna – raioanele de sud. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în toate complexele. Vânează în lunci, terenuri nelucrate, câmpuri, liziere de păduri. Se hrănește în principal cu șoareci, păsări mici, ș.a.






Circus pygargus (Linnaeus, 1758) – **Erete sur** – **Лунь луговой**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulneravilă (categoria **VU**), Lista Operaţională, în Cartea Roşie a Ucraunei (categoria ”**Вразливий**”), Convenţiile de la Berna şi Bonn.
Răspândirea generală: Europa Centrală şi de Sud, în nord-vestul Africii, sudul Siberiei, ajungând până la Enisei, în Asia Mică şi Centrală.
Răspândirea în Republica Moldova: a fost observată în lunca Nistrului şi râurilor din sudul ţării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte sporadic în timpul migraţiei în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.






Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) **– Codalb – Орлан-белохвост**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**) și inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Republicii Moldova, în Cartea Roșie a Transnistriei și în Cartea Roşie a Ucrainei, în lista Convenției de la Bonn.
Răspândirea generală: populează zonele temperate și nordice ale Eurasiei - de la tundra sudică până la Turcia, Iran, China de Est, la fel și în sudul Groenlandei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se înâlnește pe tot teritoriul țării, în preajma bazinelor acvatice mari cu pește mult, în toate anotimpurile anului. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migraţiei și vânatului se întâlneşte în complexele ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovîi cut” și ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.








Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – **Acvilă pitică** – **Орел-карлик**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulneravilă (categoria **VU**), Lista Operaţională, în Cartea Roșie a Ucraunei (categoria ”**Рідкісний**”), Convenţiile de la Berna şi Bonn, Directiva Păsări.
Răspândirea generală: sudul Europei, nord-vestul Africii, Asia Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în păduri, preponderent de-a lungul malurilor abrupți ale râurilor, în special ale Nistrului. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Chiţcani”, stabil cuibărește în pădurile complexului ”Cioburciu-Răscăeţi”.





Milvus migrans (Boddaert, 1783) **– Gaie neagră – Коршун черный**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**


Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **V**), inclusă în Lista Operațională, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria **Вразливий**); în Convenţiile de la Bonn şi Berna, Directiva Păsări.

Răspândirea generală: Europa, Asia (fără partea nordică de taiga și tundră), Africa, insulele arhipelagului Indo-Australian, Australia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** zonele de pădure și silvostepă, pădurile de luncă din zona de stepă. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.



În timpul migrației și nutriției se întâlnește în toate complexele. Vâneză în preajma bazinelor acvatice, în luncile umede și parcele inundabile, în câmpuri. Se hrănește cu amfibieni și reptile, pește, cadavre, mamifere mici, păsări și insecte mari.






Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) **– Viespar – Осоед**
Familia **Accipitridae** (Vieillot, 1816) **– Accipitride – Ястребиные**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **III**), inclusă în Lista Operațională, inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **EN**); în Convenţiile de la Bonn şi Berna, Directiva Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa, Caucaz și Transcaucasia, Asia Mică, Iran, Siberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** regiunile forestiere. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexul ”Chițcani”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Viesparul poate să migreze solitar sau în stoluri din câteva zeci de indivizi. Vânează în păduri, tufișuri, de-a lungul dambelor și în alte biotopuri. Se hrănește în principal cu insecte himenoptere: viespe, gărgăuni, bondari, fagurile lor cu larve, uneori consumă gândaci, fluturi, cosași, șopârle, broaște, șoareci, etc.





Familia **Aegithalidae** Reichenbach, 1850 **– Aegitalide – Длиннохвостые синицы**


1. ***Aegithalos caudatus*** (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi codat – Синица длиннохвостая**

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi codat – Синица длиннохвостая**
Familia **Aegithalidae** Reichenbach, 1850 **– Aegitalide – Длиннохвостые синицы**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (категория **VII**) și inclusă în Lista Operațională.
Răspândirea generală: areal disiunctiv – în Eurasia, de la oceanul Atlantic până la litoralul Pacificului. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pădurile de luncă ale Nistrului și Prutului, biotopurile silvice din zona de Centru și Nord. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. În timpul migrației și iarna se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate.





Familia **Alaudidae** Vigors, 1825 **– Alaudide – Жаворонковые**


1. ***Alauda arvensis*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocârlie de-câmp – Жаворонок полевой**
2. ***Lullula arborea*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocârlie de-pădure – Жаворонок лесной**

Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) **– Ciocârlie de-câmp – Жаворонок полевой**
Familia **Alaudidae** Vigors, 1825 **– Alaudide – Жаворонковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Eurasia și Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.








Lullula arborea (Linnaeus, 1758) **– Ciocârlie de-pădure – Жаворонок лесной**
Familia **Alaudidae** Vigors, 1825 **– Alaudide – Жаворонковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa și Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile cu arbori și arbuști din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Chițcani”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.








Familia **Alcedinidae** Rafinesque, 1815 **– Alcedinide – Зимородковые**

1**. *Alcedo atthis*** (Linnaeus, 1758) **– Pescăraș albastru – Зимородок**

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) **– Pescăraș albastru – Зимородок**
Familia **Alcedinidae** Rafinesque, 1815 **– Alcedinide – Зимородковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **V**), inclusă în Lista Operațională și listele Convenției de la Berna, Directiva Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zonele sudice și temperate ale Eurasiei, Africa de Nord, Noua Guinee, Indonesia, Noua Zeelandă. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în malurile abrupte ale Nistrului, Turunciuc și alte bazine acvatice în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu pește mic.





Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

1. ***Anas acuta*** (Linnaeus, 1758) **– Rață sulițar – Шилохвость**
2. ***Anas clypeata*** (Linnaeus, 1758) **– Rață lingurar – Широконоска**
3. ***Anas crecca*** (Linnaeus, 1758) **– Rață mică – Чирок-свистунок**
4. ***Anas penelope*** (Linnaeus, 1758) **– Rață fluierătoare – Свиязь**
5. ***Anas plathyrhynchos*** (Linnaeus, 1758) **– Rață mare – Кряква**
6. ***Anas querquedula*** (Linnaeus, 1758) **– Rață cârâitoare – Чирок-трескунок**
7. ***Anas strepera*** (Linnaeus, 1758) **– Rață pestriță – Утка серая**
8. ***Anser albifrons*** (Scopoli, 1769) **– Gârliță mare – Казарка белолобая**
9. ***Anser anser*** (Linnaeus, 1758) **– Gâscă de-vară – Гусь серый**
10. ***Anser erythropus*** (Linnaeus, 1758) **– Gârliţă mică – Пискулька**
11. ***Anser fabalis*** (Lath, 1787) **– Gâscă de-semănătură – Гуменник**
12. ***Aythya ferina*** (Linnaeus, 1758) **– Rață-cu-cap-castaniu – Нырок красноголовый**
13. ***Aythya fuligula*** (Linnaeus, 1758) **– Rață moțată – Чернеть хохлатая**
14. ***Aythya marila*** (Linnaeus, 1761) **– Rață-cu-cap-negru – Чернеть морская**
15. ***Aythya nyroca*** (Guldenstadt, 1770) **– Rață roșie – Нырок белоглазый**
16. ***Bucephala clangula*** (Linnaeus, 1758) **– Rață sunătoare – Гоголь**
17. ***Cygnus cygnus*** (Linnaeus, 1758) **– Lebădă de-iarnă – Лебедь-кликун**
18. ***Cygnus olor*** (Gmelin, 1789) **– Lebădă de-vară – Лебедь-шипун**
19. ***Rufibrenta ruficollis*** (Pallas, 1769) **– Gâscă-cu-gât-roșu – Казарка краснозобая**
20. ***Tadorna ferruginea*** (Pallas, 1764) **– Călifar roșu – Огарь**
21. ***Tadorna tadorna*** (Linnaeus, 1758) **– Călifar alb – Пеганка**

Anas acuta (Linnaeus, 1758) **– Rață sulițar – Шилохвость**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: populează diferite bazine acvatice ale Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației și iarna se întâlnește pe diferite bazine acvatice mari. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte în complexul ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele, care au bazine acvatice mari sau adiacente Nistrului și Turunciucului. Se hrănește cu nevertebrate, cu părțile verzi ale plantelor și semințe.






Anas clypeata (Linnaeus, 1758) **– Rață lingurar – Широконоска**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

Statutul**:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție**:** în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: larg răspândită în zona temperată a Eurasiei și vestul Americii de Nord – de la tundra sudică până la zona de silvostepă și stepă. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** populații cu efectiv mic în stufărișurile cursului inferior al Nistrului și Prutului. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost observată în toate complexele în timpul migrației, cu excepția ”Popeasca” și ”Zaozernoe-Nucari”. Se hrănește exclusiv cu hrană animală – artropode acvatice și larvele lor, moluște gastropode.







Anas crecca (Linnaeus, 1758) **– Rață mică – Чирок-свистунок**

Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).


Răspândirea generală: arealul de cuibărire cuprinde zona temperată a Eurasiei – de la tundra sudică până la silvostepă. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației se întâlnește la apă mică în bazinile acvatice naturale și artificiale. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migraţiei se întâlneşte în complexele ”Lunca Talmaza” și ”Tudora-Palanca”.








Anas penelope Linnaeus, 1758 **– Rață fluierătoare – Свиязь**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: este larg răspândită în Eurasia, dar partea majoră a păsărilor cuibărește în tundră, silvotundră și taigaua de nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** specie cu efectiv mic, dar regular întâlnit în timpul migrației. La popas și pentru a se hrăni se oprește la bazine cu apă mică și cele înmlăștinite. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna se întâlneşte în complexele ”Lunca Talmaza” și ”Grădina Turcească”.






Anas plathyrhynchos (Linnaeus, 1758) **– Rață mare – Кряква**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: larg răspândită în emisfera nordică. Cuibărește și în zona arctică, la nord de latitudinea 70°, la fel și în clima subropicală – la sud de latitudinea 35° în Africa de Nord și până latitudinea 20° de nord în Orientul Mijlociu. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este cea mai răspândită specie, obișnuită la cuibărit și numeroasă la migrație. Populează toate bazinele acvatice cu vegetație din plante superioare supraacvatice, preferând lacuri și iazuri cu apă stătătoare sau slab curgătoare. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației, nutriției și cuibărit a fost semnalată în toate complexele.








Anas querquedula Linnaeus, 1758 **– Rață cârâitoare – Чирок-трескунок**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: cuibărește în zonele de pădure și stepă ale Eurasiei, spre nord până la silvotundră. Mai abuntentă este la sudul arealului. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** la cuibărit și în timpul migrației este specie obișnuită. Se întâlnește în bazine acvatice mari, cu maluri deschise de luncă și apă mică. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației, nutriției și la cuibărit a fost semnalată în toate complexele (cu excepția ”Popeasca” și ”Zaozernoe-Nucari”), cu bazine acvatice potrivite.





Anas strepera (Linnaeus, 1758) **– Rață pestriță – Утка серая**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**) și a Ucrainei (categoria **Рідкісний**), listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: zonele de nord și temperate ale Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** diferite bazine acvatice în preajma Nistrului și Prutului. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Purcari” și ”Crocmaz-Tudora”. În timpul migrației se întâlnește practic în toate complexele, care dispun de lacuri sau sunt adiacente Nistrului. Se hrănește cu părțile verzi și semințe ale diferitor plante (în principal acvatice).





Anser albifrons (Scopoli, 1769) **– Gârliță mare – Казарка белолобая**

Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări.

Răspândirea generală: arealul este circumpolar, cuprinzând zonele de tundră și silvotundră ale Eurasiei și Americii de Nord. În partea europeană a arealului spre vest atinge peninsula Kanin. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe tot teritoriu, în timpul migrațiilor de toamnă și primăvară. ***Pe teritoriul site-ului*** în perioada migrației, în stoluri a câte zeci de păsări în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.





Anser anser (Linnaeus, 1758) **– Gâscă de-vară – Гусь серый**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**


***Statutul*:** уязвимый вид – **VU.**

***Starea de protecţie*:** în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări.

Răspândirea generală: Eurasia – de la subtropici, stepele sidice și bazine acvatice până la sudul zonei de taiga. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se întâlnește în raioanele de sud. Este rară la cuibărit și în impul migrației. Cuibărește în bazinele acvatice cu apă mică și mult stufăriș. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte în timpul migraţiei în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, iar cuibărește numai în complexul ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.









Anser erythropus (Linnaeus, 1758) – **Gârliţă mică** – **Пискулька**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Cartea Roşie a Ucraunei (categoria ”**Вразливий**”), IUCN (categoria **VU**), Convenţiile de la Bonn şi Berna, listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: în zonele de tundră și silvotundră ale Palearcticii. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** la sudul țării, în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește rar și numai în zbor în complexele ”Crocmaz-Tudora” și **”**Diciuli-Cuţa-Maţarinskii”.








Anser fabalis (Lath, 1787) – **Gâscă de-semănătură** – **Гуменник**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

***Statutul*:** specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Convenţiile de la Berna şi Bonn, Directiva Păsări.
Răspândirea generală: populează zonele de tundră, silvotundră și taiga.
Răspândirea în Republica Moldova: a fost întâlnită mai des la sudul țării, în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost observată în perioada migrației a gâștelor, destul de rar și în stare de tranzit în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.







Aythya ferina (Linnaeus, 1758) **– Rață-cu-cap-castaniu – Нырок красноголовый**

Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Lista roșie IUCN ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: larg răspândită în Eurasia extratropicală. Mai numeroasă este în bazinele acvatice ale zonelor de stepă, silvostepă și de pădure (partea sudică). ***Răspândirea în Republica Moldova:*** cuibărește în stufărișurile Prutului, mai rar – ale Nistrului, pe grămezi din resturi vegetale. După perioada de cuibărit se întâlnește în bazine acvatice cu apă stătătoare sau curgătoare – lacuri cu vegetație superioară și iazuri din gospodăriile piscicole, iernând în număr restrâns pe parcelele de apă libere de gheață. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele cu bazine acvatice mici în locuri ferite de deranj. Se hrănește preponderent cu semințe și părțile vegetative ale plantelor acvatice.





Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) **– Rață moțată – Чернеть хохлатая**

Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: zona temperată a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației și iarna se întâlnește în preajma bazinelor acvatice mari (Nistru, Prut, rezervorul Cuciurgan, ș.a.). ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna se întâlnește în complexele adiacente Nistrului. Se hrănește în principal cu nevertebrate acvatice și pește mic.






Aythya marila (Linnaeus, 1761) **– Raţă-cu-cap-negru – Чернеть морская**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: nordul Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrațiilor, uneori se întâlnește în bazinele acvatice mari (Nistru, rezervorul Cuciurgan). ***Pe teritoriul sitului*** în timpul migrației a fost observată în complexul ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”, sunt posibile semnalări în complexele, adiacente Nistrului. Se hrănește în principal cu nevertebrate și plante acvatice.







Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) **– Rață roșie – Нырок белоглазый**

Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**


Statutul**:** specie periclitată – **EN.**

Starea de protecţie: inclusă în Lista roșie IUCN ca specie aproape periclitată (categoria **NT**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, a Transnistriei și a Ucrainei.

Răspândirea generală: la cuibărit se întâlnește în mare parte a Palearcticii – de la Maroc și peninsula Iberică până la poalele munților Altai și cursul superior al râului Huang He. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se întâlnește în biotopurile mlăștinoase, cu stufăriș din cursurile inferioare ale Nistrului și Prutului. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migraţiei se întâlneşte în complexele ”Copanca-Leuntea” și ”Lunca Talmaza”.







Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) **– Rață sunătoare – Гоголь**

Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**) și a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний”**), în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: zona de pădure a Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației și iarna se întâlnește în preajma bazinelor acvatice mari (Nistru, Prut, rezervorul Cuciurgan, ș.a.). ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna se întâlnește în complexele adiacente Nistrului. Se hrănește cu nevertebrate acvatice și pește mic.





Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) **– Lebădă de-iarnă – Лебедь-кликун**

Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roșie a Republicii Moldova și în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний”**) și în listele Directivei Păsări.

Răspândirea generală: Asia de Nord, Europa - mai sus de 55° longitudine nord. Iernile le petrece preponderent pe malurile oceanului Atlantic, mărilor Balice și Negre. Un număr mic din populația acestei specii migrează și iernează în Italia.

Răspândirea în Republica Moldova: în timpul migrațiilor de iarnă, poate fi întâlnită în bazine acvatice mari (Nistru, Prut, rezervorul Cuciurgan, ș.a.), uneori în stolurile lebădăi de vară. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna indivizi solitari și grupuri mici se întâlnesc în complexele adiacente Nistrului. Se hrănește cu nevertebrate acvatice și pește mic.






Cygnus olor (Gmelin, 1789) **– Lebădă de-vară – Лебедь-шипун**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Lista Operațională și în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний**”) și listele Directivei Păsări.
Răspândirea generală: zona de pădure a Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** la cuibărit se întâlnește în bazine acvatice mari (Nustru, Prut, rezervorul Cuciurgan, ș.a.), în timpul migrației și iarna se întâlnesc aglomerații din câteva zeci de indivizi. ***Pe teritoriul site-ului*** in timpul migrației și iarna se întâlnește în complexele, adiacente Nistrului. Se hrănește în principal cu plante acvatice, dar poate să consume și nevertebrate.





Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) **– Gâscă-cu-gât-roșu – Казарка краснозобая**

Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**


***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **V**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Вразливий”**), inclusă în Lista roșie IUCN ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).



Răspândirea generală: zona de tundră și silvotundră a Siberiei de Vest. Iernează pe litoralul Mării Caspice și al Mării Negre. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației și iarna se întâlnește în raioanele de sud. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna poate fi observată în zbor în toate complexele. A fost semnalată în complexul ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”. Se hrănește cu diferite plante, mai ales pe câmpuri cu graminee de toamnă.






Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) **– Călifar roșu – Огарь**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Lista Operațională și în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **VU**); inclusă în Cartea Roşie a Ucrainei, listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: până nu demult a populat exclusiv bazine acvatice cu apă mică din zona de stepe sudice și semideșerturi, de la Bulgaria până în Manciuria. În ultimele decenii arealul călifarului roșu semnificativ s-a extins spre nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** anterior putea fi întâlnit rar în Gagauzia și în sectoarele cu maluri argiloase în preajma satelor Copanca și Leuntea. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte în complexul ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.






Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) – **Călifar alb** – **Пеганка**
Familia **Anatidae** Vigors, 1825 **– Anatide – Утиные**

***Statutul*:** specie vulnerabilă **– VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **V**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **VU**), Lista Operaţională, Convenţia de la Berna.
Răspândirea generală: litoralul maritim și bazinele acvatice din nordul Europei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sudul țării, în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost întâlnită rar în complexele ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca” și **”**Diciuli-Cuţa-Maţarinskii”), de obicei, în zbor în timpul migrației.







Familia **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**

1. ***Ardea alba*** (Linnaeus, 1758) **– Egretă mare – Цапля белая большая**
2. ***Ardea purpurea*** (Linnaeus, 1766) **– Stârc roşu – Цапля рыжая**
3. ***Ardeola ralloides*** (Scopoli, 1769) **– Stârc galben – Цапля желтая**
4. ***Botaurus stellaris*** (Linnaeus, 1758) **– Buhai de-baltă – Выпь большая**
5. ***Egretta garzetta*** (Linnaeus, 1766) **– Egretă mică – Цапля малая белая**
6. ***Nycticorax nycticorax*** (Linnaeus, 1758) **– Stârc de-noapte – Кваква**

Ardea alba (Linnaeus, 1758) – **Egretă mare** – **Цапля белая большая**
Familia **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**


Statutul**:** specie periclitată – **EN**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN**) și în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulneravilă (categoria **VU**), Lista Operaţională, Convenţiile de la Bonn şi Berna, Directiva Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).



Răspândirea generală: specie cosmopolită de tipul faunistic chinez. În Europa are un areal discontinuu. Este răspândită în zonele temperate tropicale. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este întâlnită prin mai multe bazine acvatice. De obicei cuibărește în stufărişuri, sau mai rar - pe copaci, în grupuri, sau colonii, izolat de alte egrete. Suprafaţa zonei de populare cu anii se măreşte, cum şi perioada activităţii anuale. Mai des este întâlnită în luncile râurilor mari ale ţării. ***Pe teritoriul site-ului*** este specie obişnuită la nutriție în majoritatea bazinelor acvatice. La cuibărit nu a fost semnalată.






Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) – **Stârc roşu** – **Цапля рыжая**
Familia **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) şi Lista Operaţională. Inclusă în listele Convenţiilor de la Berna şi Bonn, Directiva Păsări.

Răspândirea generală: Europa, spre est până în Asia Centrală, Extremul Orient, India, China, în estul Africii. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** cuibăreşte pe tot teritoriul, cu densitatea mai mare în mlaştinile râurilor Nistru şi Prut, în bazine acvatice mari şi mici. Populaţia şi răspândirea speciei este foarte instabilă. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte în majoritatea bazinelor acvatice: în complexele "Grădina Turcească", "Lunca Talmaza", "Lunca Olăneşti-Crocmaz","Crocmaz-Tudoara", "Diculi-Cuţa-Maţarinskii", ş. a.






Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) – **Stârc galben** – **Цапля желтая**
Familia **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**



***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie periclitată (categoria **EN**), în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), Lista Operaţională, în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний**”), listele Convenţiei de la Berna și Directiva Păsări.

Răspândirea generală: este răspândită în Europa de Sud-Est, Transcaucasia, Asia Mică şi Centrală, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sudul ţării. Anume, datorită arealului său sudic este rară. Cuibăreşte în bazine acvatice din inferiorul râurilor Prut şi Nistru. Efectivul populaţiei de la Nistru e instabil şi mai scăzut. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte destul de rar în calitate de oaspete la nutriție și pasaj, cu mai multe şanse de înregistrare în complexele sudice, de exemplu, “Crocmaz-Tudoara”, “Tudoara-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”, ș.a.






Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – **Buhai de-baltă** – **Выпь большая**
Familia **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), Cartea Roșie a Transnistriei, în Lista Operaţională, listele Convenţiilor de la Bonn şi Berna, Directiva Păsări.



Răspândirea generală: în unele regiuni din Europa. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se întâlneşte pe alocuri în zonele umede ale ţării. Preferă bazinele acvatice de luncă, cu apă mică şi vegetaţie acvatică bogată şi dezvoltată în spaţiu. Este foarte dependentă de aspectul acumulativ al resurselor trofice şi de cuibărit. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte rar. Cuibăreşte în complexele ”Grădina Turcească”, “Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, “Crocmaz-Tudoara”, “Tudoara-Palanca”, ”Dubovîi cut”, ”Saghi-Kazaceşti” şi ”Diciuli-Cuţa-Maţarinskii”.




Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) **– Egretă mică – Цапля малая белая**
Familia **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**

Statutul**:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: larg răspândită în emisfera Estică, populează partea de sud a Europei Centrale, Africa de Nord și Centrală, Asia de Sud-Est, Australia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** stufărișurile Nistrului și Prutului de Jos, dar în căutare de hrană vizitează și alte bazine acvatice. ***Pe teritoriul site-ului*** în perioada caldă a anului cu regularitate a fost întâlnită în toate complexele cu bazine acvatice temporare mici, de obicei în stoluri mixte cu alte egrete. Se hrănește în principal cu animale acvatice și semiacvatice mici: pești, amfibieni, reptile, crustacee, insecte și larvele lor.







Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) **– Stârc de-noapte – Кваква**

Familia **Ardeidae** Leach, 1820 **– Ardeide – Цаплевые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna**.**

Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde zonele tropicale și temperate de pe toată Terra. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pădurile din luncile Nistrului și Prutului. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost cu regularitate întâlnită în perioada cuibăritului și în timpul migrației în toate comlexele site-ului.






Familia **Caprimulgidae** Vigors, 1825 **– Caprimulgide** – **Козодоевые**


1. ***Caprimulgus europaeus*** (Linnaeus, 1758) **– Caprimulg – Козодой**

Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) **– Caprimulg – Козодой**
Familia **Caprimulgidae** Vigors, 1825 **– Caprimulgide** – **Козодоевые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VII**), inclusă în Lista Operațională și listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde nordul Africii și Eurasia – de la Europa de Vest până în Transbaikalia și China Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pădurile tinere de stejar, cu copaci bătrâni solitari și subarboret bine dezvoltat. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost întâlnită în perioada de cuibărit, nutriție și în timpul migrației în majoritatea parcelelor studiate, cu excepția complexelor ”Popeasca”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Chiţcani”. Se hrănește în principal cu insecte nocturne zburătoare.





Familia **Certhiidae** Leach, 1820 **– Certiide – Пищуховые**


1. ***Certhia familiaris*** (Linnaeus, 1758) **– Cojoaică de-pădure – Пищуха**

Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) **– Cojoaică de-pădure – Пищуха**
Familia **Certhiidae** Leach, 1820 **– Certiide – Пищуховые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: zona temperată a Europei, Asiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biocenozele forestiere preponderent din raioanele de centru și nord, la fel și pădurile de luncă. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”. În timpul migrației și iarma la fel poate fi întâlnită și în complexele ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate.






Familia **Charadriidae** (Vigors, 1825) **– Charadriide** – **Ржанковые**

1. ***Charadrius dubius*** (Scopoli, 1786) **– Prundăraș gulerat mic – Малый зуек**
2. ***Vanellus vanellus*** (Linnaeus, 1758) **– Nagâț – Чибис**

Charadrius dubius (Scopoli, 1786) **– Prundăraș gulerat mic – Малый зуек**
Familia **Charadriidae** (Vigors, 1825) **– Charadriide** – **Ржанковые**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Răspândirea generală: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde o parte mare a Eurasiei și nordul Africii. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** a fost întâlnită în sudul țării în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației se întâlneşte în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olăneşti”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.








Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) **– Nagâț – Чибис**
Familia **Charadriidae** (Vigors, 1825) **– Charadriide** – **Ржанковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Lista roșie IUCN ca specie aproape periclitată (categoria **NT**), listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa, Asia. Iernează pe litoralul Mării Mediterane și în Transcaucasia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sporadic pe tot teritoriu, în luncile râurilor, zonele cu pajiști inundabile. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește la cuibărit și în perioada de migrație în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”.





Familia **Ciconiidae** Gray, 1840 **– Ciconiide – Аистовые**

1. ***Ciconia ciconia*** (Linnaeus, 1758) – **Barză albă** – **Аист белый**

2. ***Ciconia nigra*** (Linnaeus, 1758) – **Barză neagră** – **Аист черный**


Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) – **Barză albă** – **Аист белый**
Familia **Ciconiidae** Gray, 1840 **– Ciconiide – Аистовые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), Lista Operaţională, Convenţiile de la Bonn şi Berna, Directiva Păsări.

Răspândirea generală: Europa, Africa de Nord, Asia, Extremul Orient, Japonia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele.
Pe teritoriul site-ului cuibărește în localități și este întâlnită în toate complexele site-ului, cu excepția ”Popeasca” și ”Purcari”. S-a adaptat să populeze localitățile rurale, deseori construind cuiburile chiar pe stâlpii ai rețelei electrice și telefonice.





Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – **Barză neagră** – **Аист черный**
Familia **Ciconiidae** Gray, 1840 **– Ciconiide – Аистовые**


***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**), în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulneravilă (categoria **VU**), Lista Operaţională. Inclusă în Cartea Roșie a Ucraunei (categoria ”**Рідкісний**”), Convenţiile de la Bonn şi Berna, Directiva Păsări.

Răspândirea generală: de la Oceanul Atlantic până la Oceanul Pacific, prin zona Palearctică între 30° şi 60° latitudine nordică. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se întâlneşte rar, întâlnit mai des în timpul migraţiei, la cuibărit – sporadic în pădurile din centru şi sudul țării. Preferă biotopurile din păduri dese, în apropierea mlaştinilor şi îndepărtate de zone populate de om. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte rar, în complexele din lunca Nistrului. La cuibărit a fost observată numai în pădurile din complexele ”Lunca Talmaza”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii” și ”Chiţcani”.







Familia **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**


1. ***Columba oenas*** (Linnaeus. 1758) – **Porumbel de-scorbură** – **Клинтух**
2. ***Columba palumbus*** (Linnaeus, 1758) **– Porumbel gulerat – Вяхирь**
3. ***Streptopelia decaocto*** (Frivaldszky, 1838) **– Guguștiuc – Горлица кольчатая**
4. ***Streptopelia turtur*** (Linnaeus, 1758) **– Turturică – Горлица обыкновенная**

Columba oenas (Linnaeus. 1758) – **Porumbel de-scorbură** – **Клинтух**
Familia **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**

***Statutul*: specie ritic periclitată – CR.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**), în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie periclitată (categoria **EN**), Lista Operaţională, Directiva Păsări.
Răspândirea generală: pădurile mixte și de foioase din Europa, Iran, Iraq, Asia Mică, sudul Siberiei de Vest, China de Vest, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** anterior cuibărea, iar în prezent se întâlnește numai în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** este specie migrătoare. Se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.








Columba palumbus (Linnaeus, 1758) **– Porumbel gulerat – Вяхирь**
Familia **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională, listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zonele temperate ale Europei și Siberiei de Vest, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și poate fi observată în timpul migrației în toate complexele. Populează pădurile de toate tipurile și plantații de arbori. Uneori poate fi semnalat și iarna. Se hrănește cu semințe și părțile verzi ale plantelor.






Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) **– Guguștiuc – Горлица кольчатая**
Familia **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa, Asia Centrală, India, nordul Chinei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în localități învecinate cu biocenozele naturale. În timpul migrațiilor de nutriție a fost semnalată în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi” (cuibărește), ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu semințe și părțile verzi ale plantelor.








Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) **– Turturică – Горлица обыкновенная**
Familia **Columbidae** (Illiger, 1811) **– Columbide – Голубиные**



***Statutul*:** specie aproape amenințată – **NT.**
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Lista roșie IUCN ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și listele Convenției de la Bonn.
Răspândirea generală: Europa, Asia Centrală și Kazahstan, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** tot teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** în prezent este o specie obișnuită și larg răspândită. Cuibărește și poate fi întâlnită în timpul migrației în toate complexele. Populează lizierile pădurilor, perdelele forestiere și grupuri de arbori solitari, învecinate cu cămpuri agricole. Se hrănește cu semințe și părțile verzi ale plantelor.





Familia **Coraciidae** Vigors, 1825 **– Coraciide – Сизоворонковые**

1. ***Coracias garrulus*** (Linnaeus, 1758) **– Dumbrăveancă – Сизоворонка**

Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) **– Dumbrăveancă – Сизоворонка**
Familia **Coraciidae** Vigors, 1825 **– Coraciide – Сизоворонковые**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Зникаючий”**), în listele Convenţiilor de la Bonn şi Berna, Directivei Păsări.

Răspândirea generală: zonele de silvostepă și stepă ale Europei, Asia de Sud-Vest Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** raioanele de sud. ***Pe teritoriul site-ului*** cu diferită regularitate cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Chiţcani”. În timpul migrației poate fi întâlnită în toate complexele. Se hrănește cu insecte mari, șopârle, etc.





Familia **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**


1. ***Corvus corax*** (Linnaeus, 1758) **– Corb – Ворон**
2. ***Corvus cornix*** (Linnaeus, 1758) **– Cioară grivă – Ворона серая**
3. ***Corvus frugilegus*** (Linnaeus, 1758) **– Cioară de-semănătură – Грач**
4. ***Corvus monedula*** (Linnaeus, 1758) **– Stăncuță – Галка**
5. ***Garrulus glandarius*** (Linnaeus, 1758) **– Gaiță – Сойка**
6. ***Pica pica*** (Linnaeus, 1758) **– Coțofană – Сорока**

Corvus corax (Linnaeus, 1758) **– Corb – Ворон**
Familia **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **VIII**). Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova.
Răspândirea generală: o parte mare a Eurasiei, Africa de Nord, America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** anul împrejur în toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chițcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. În perioada toamnă-iarnă se întâlnește în toate complexele. Dieta constă din hrană de origine animală și vegetală.






Corvus cornix (Linnaeus, 1758) **– Cioară grivă – Ворона серая**
Familia **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa Centrală, de Nord și de Est, Siberia de Vest, Asia de Sud-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** anul împrejur în toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și este semnalată în timpul migrației și iarna în toate complexele. Dieta constă din hrană de origine animală și vegetală.








Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) **– Cioară de-semănătură – Грач**
Familia **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: o parte mare a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** anul împrejur în toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna se întâlnește în toate complexele. Dieta constă din hrană de origine animală și vegetală.






Corvus monedula (Linnaeus, 1758) **– Stăncuță – Галка**
Familia **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Eurasia de Vest și Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** anul împrejur în toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** la cuibărit a fost semnalată în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”. În timpul migrației și iarna se întâlnește la fel în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazacești”, ”Dubovâi cut”. Dieta constă din hrană de origine animală și vegetală.






Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) **– Gaiță – Сойка**
Familia **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa, Africa de Nord-Vest, Asia Mică, Siberia, estul Chinei, Asia de Sud-Est. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile de pădure din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazacești”, ”Dubovâi cut”. În timpul migrației și iarna se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate, fructe, etc.






Pica pica (Linnaeus, 1758) **– Coțofană – Сорока**
Familia **Corvidae** Vigors, 1825 **– Corvide – Врановые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: o parte mare a Eurasiei, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** anul împrejur în toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chițcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. În timpul migrației și iarna se întâlnește în toate complexele. Dieta constă din hrană de origine animală și vegetală.






Familia **Emberizidae** Vigors, 1831 **– Emberizide – Овсянковые**


1. ***Emberiza citrinella*** (Linnaeus, 1758) **– Presură galbenă – Овсянка обыкновенная**
2. ***Emberiza hortulana*** Linnaeus, 1758 **– Presură de-grădini – Овсянка садовая**
3. ***Emberiza schoeniclus*** (Linnaeus, 1758) **– Presură de-stuf – Овсянка камышовая**

Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) **– Presură galbenă – Овсянка обыкновенная**
Familia **Emberizidae** Vigors, 1831 **–** ***Emberizide*** **– Овсянковые**

Statutul**:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: zonele temperate și de nord ale Eurasiei – de la oceanul Atlantic până la lacul Baikal. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele.
Pe teritoriul site-ului cuibărește și se întâlnește în timpul migrației și iarna în toate complexele. Se hrănește cu semințe de plante și nevertebrate.







Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 **– Presură de-grădini – Овсянка садовая**
Familia **Emberizidae** Vigors, 1831 **– *Emberizide* – Овсянковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.


Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: Eurasia. Arealul european este întrerupt în partea de centru și de vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele.

Pe teritoriul site-ului cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.







Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) **– Presură de-stuf – Овсянка камышовая**
Familia **Emberizidae** Vigors, 1831 **– *Emberizide* – Овсянковые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Europa și Asia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile mlăștinoase și de baltă din toate raioanele.

Pe teritoriul site-ului cuibărește în complexele ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuța-Mațarinskii”. Poate fi întâlnită și iarna. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.





Familia **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**

1. ***Falco cherrug*** (I.E. Gray, 1834) – **Şoim dunărean** – **Балобан**
2. ***Falco peregrinus*** (Tunstal, 1771) – **Şoim călător** – **Сапсан**
3. ***Falco subbuteo*** (Linnaeus, 1758) **– Șoimul rândunelelor – Чеглок**
4. ***Falco tinnunculus*** (Linnaeus, 1758) **– Vânturel roșu – Пустельга обыкновенная**
5. ***Falco vespertinus*** (Linnaeus, 1766) **– Vânturel de-seară – Кобчик**


Falco cherrug (I.E. Gray, 1834) – **Şoim dunărean** – **Балобан**
Familia **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**




***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**), în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulneravilă (categoria **VU**), Lista Operaţională, în Cartea Roșie a Ucraunei (categoria ”**Вразливий**”), în Lista roșie IUCN (**EN**), listele Convenţiilor de la Berna şi Bonn, Directivei Păsări.

Răspândirea generală: Europa Centrală şi de Est, Caucaz, Siberia de Vest, Asia Centrală şi de Sud-Est. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** cuibărește, dar rar.

Pe teritoriul site-ului este pasăre trecătoare și migrătoare. Se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu mamifere mici, păsări, însă preferă popândăi. Pentru înmulțire ocupă cuiburile altor specii de păsări pe arbori și stâlpi ai rețelei electrice de înaltă tensiune.






Falco peregrinus (Tunstal, 1771) – **Şoim călător** – **Сапсан**
Familia **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**



***Statutul*:** specie critic periclitată **– CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **V**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**), în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulneravilă (categoria **VU**), Lista Operaţională, Convenţiile de la Berna şi Bonn.
Răspândirea generală: stepele din Eurasia și America de Sud, evită pădurile umede subtropicale. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este specie rară, care migrează de-a lungul pădurilor și luncilor râurilor. ***Pe teritoriul site-ului*** specie migrătoare, semnalată în toate complexele, cu excepția ”Popeasca” și ”Zaozernoe-Nucari”. Vânează preponderent păsări, inclusiv și cele de baltă.





Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) **– Șoimul rândunelelor – Чеглок**
Familia **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**


***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VII**), inclusă în Lista Operațională şi listele Convențiilor de la Berna și Bonn.

Răspândirea generală: Eurasia și Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cu regularitate cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. În timpul migrației a fost întâlnită în toate complexele. Vânează în diferite biotopuri, preponderent insecte mari și păsări mici.









Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) **– Vânturel roșu – Пустельга обыкновенная**

Familia **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.


Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională și listele Convențiilor de la Berna și Bonn.



Răspândirea generală: toată Eurasia, cu excepția regiunilor nordice, Africa. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cu regularitate diferită cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.








În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Vânează în câmpuri, lunci și sectoare de stepă, liziere de pădure. Se hrănește cu șoareci, insecte mari, șopârle, etc.

Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) **– Vânturel de-seară – Кобчик**
Familia **Falconidae** Vigors, 1824 **– Falconide – Соколиные**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Lista Operațională, în Lista roșie IUCN ca specie aproape vulnerabilă (categoria **NT**), în listele Convenţiilor de la Bonn și Berna, Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: zonele de stepă și silvostepă ale Europei de Est, Siberiei și Kazahstanului. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** preponderent raioanele de sud. ***Pe teritoriul site-ului*** cu regularitate diferită cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Vânează în câmpuri, lunci și sectoare de stepă, liziere de pădure. Se hrănește în principal cu insecte.





Familia **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**

1. ***Acanthis cannabina*** (Linnaeus, 1758) **– Cânepar – Коноплянка**
2. ***Carduelis carduelis*** (Linnaeus, 1758) **– Sticlete – Щегол**
3. ***Chloris chloris*** (Linnaeus, 1758) **– Florinte – Зеленушка**
4. ***Coccothraustes coccothraustes*** (Linnaeus, 1758) **– Botgros – Дубонос**
5. ***Spinus spinus*** (Linnaeus, 1758) **– Scatiu – Чиж**

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) **– Cânepar – Коноплянка**
Familia **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**


***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.


Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Europa, Africa de Nord, Asia Mică, de Sud-Vest și Centrală.

Răspândirea în Republica Moldova: toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chițcani”. În timpul migrației și iarna se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu semințe de plante.








Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) **– Sticlete – Щегол**
Familia **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Africa de Nord, Asia de Sud-Vest și Siberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și poate fi întâlnită în timpul migrației și iarna în toate complexele. Se hrănește cu semințe de plante.








Chloris chloris (Linnaeus, 1758) **– Florinte – Зеленушка**
Familia **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Africa de Nord-Vest, Asia Mică și Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și poate fi întâlnită în timpul migrației și iarna în toate complexele. Se hrănește cu semințe de plante.






Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) **– Botgros – Дубонос**
Familia **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Eurasia și Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chițcani”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. În timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în toate complexele. Se hrănește cu semințe de plante.








Spinus spinus (Linnaeus, 1758) **– Scatiu – Чиж**
Familia **Fringillidae** Leach, 1820 **– Fringilide – Вьюрковые**

Statutul**:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: zona de pădure a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației și iarna - în toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în toate complexele. Se hrănește cu semințe de plante.







Familia **Gaviidae** Forster, 1788 **– Gaviide – Гагары**


1. ***Gavia arctica*** (Linnaeus, 1758) **– Cufundar polar – Гагара чернозобая**

Gavia arctica (Linnaeus, 1758) **– Cufundar polar – Гагара чернозобая**
Familia **Gaviidae** Forster, 1788 **– Gaviide – Гагары**



***Statutul*:** specie aproape amenințată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: preponderent în zonele de nord ale Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în bazine acvatice mari (Nistru, Prut rezervorul Cuciurgan, ș.a.). ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației, uneori și iarna, rar se întâlnește la Nistru, în complexele învecinate. Se hrănește cu pește și nevertebrate acvatice.





Familia **Hirundinidae** Vigors, 1825 **– Hirundinide – Ласточковые**


1. ***Delichon urbica*** (Linnaeus, 1758) **– Lăstun de-casă – Ласточка городская**
2. ***Hirundo rustica*** (Linnaeus, 1758) **– Rândunică – Ласточка деревенская**
3. ***Riparia riparia*** (Linnaeus, 1758) **– Lăstun de-mal – Ласточка береговая**

Delichon urbica (Linnaeus, 1758) **– Lăstun de-casă – Ласточка городская**
Familia **Hirundinidae** Vigors, 1825 **– Hirundinide – Ласточковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: o parte mare a Eurasiei, nord-vestul Africii. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în localități învecinate cu biocenoze naturale. În timpul migrației și nutriției a fost semnalată în spațiul aerian al tuturor complexelor. Se hrănește cu insecte.








Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) **– Rândunică – Ласточка деревенская**
Familia **Hirundinidae** Vigors, 1825 **– Hirundinide – Ласточковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: o parte mare a Eurasiei și Americii de Nord, nord-vestul Africii. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în localități învecinate cu biocenoze naturale. În timpul migrației și nutriției a fost semnalată în spațiul aerian al tuturor complexelor. Se hrănește cu insecte.







Riparia riparia (Linnaeus, 1758) **– Lăstun de-mal – Ласточка береговая**
Familia **Hirundinidae** Vigors, 1825 **– Hirundinide – Ласточковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.


Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională și listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Eurasia și America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele.

Pe teritoriul site-ului cuibărește în malurile abrupte ale Nustrului și Turunciucului, în complexele ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. În timpul migrației și nutriției a fost semnalată în spațiul aerian al tuturor complexelor. Se hrănește cu insecte.







Familia **Laniidae** Rafinesque, 1815 **– Laniide – Сорокопутовые**


1. ***Lanius collurio*** (Linnaeus, 1758) **– Sfrânciоc roșiatic – Жулан**
2. ***Lanius excubitor*** (Linnaeus, 1758) **– Sfrânciоc mare – Сорокопут серый**
3. ***Lanius minor*** (Gmelin, 1788) **– Sfrânciоc-cu-fruntea-neagră – Сорокопут чернолобый**

Lanius collurio (Linnaeus, 1758) **– Sfrâncioc roșiatic – Жулан**
Familia **Laniidae** Rafinesque, 1815 **– Laniide – Сорокопутовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa și Asia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile cu tufăriș în toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și poate fi întâlnit în timpul migrației în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate, șopârle, etc.






Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) **– Sfrâncioc mare – Сорокопут серый**
Familia **Laniidae** Rafinesque, 1815 **– Laniide – Сорокопутовые**

***Statutul*:** specie neameninţată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Cartea Roșie a Ucrainei (categoria **Рідкісний**) și listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: zonele de nord ale Eurasiei și Americii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** iarna se întâlnește în toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** iarna și în timpul migrației a fost semnalat în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu șoareci, păsări mici, etc.








Lanius minor (Gmelin, 1788) **– Sfrâncioc-cu-fruntea-neagră – Сорокопут чернолобый**
Familia **Laniidae** Rafinesque, 1815 **– Laniide – Сорокопутовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa de Sud și de Est, Asia – spre est până la Omsk și vestul Altaiului. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** liziere de pădure, perdele forestiere, preponderent în raioanele de centru și sud. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”. Se hrănește cu nevertebrate.






Familia **Laridae** Vigors, 1825 **– Laride – Чайковые**

1. ***Larus cachinnans*** Pallas, 1811 **– Pescăruș pontic – Чайка-хохотунья**
2. ***Larus canus*** (Linnaeus, 1758) **– Pescăruș sur – Сизая чайка**
3. ***Larus ridibundus*** (Linnaeus, 1766) **– Pescăruș râzător – Озерная чайка**


Larus cachinnans Pallas, 1811 **– Pescăruș pontic – Чайка-хохотунья**
Familia **Laridae** Vigors, 1825 **– Laride – Чайковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: de pe coasta mediteraneană a peninsulei Iberice la est până la atingerile inferioare ale Kerulenului și Lacului Dalaynor. La nord, spre coastele nordice ale Mării Mediterane, Negre, Azov, Caspice și în partea inferioară a râurilor care curg în ele. La sud până la coasta de sud a Mării Mediterane, Asia Mică, Lacul Sevan, coasta de sud a Mării Caspice, a lacurilor Issyk-Kul și Lobnor. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe tot teritoriul în bazine acvatice mari. ***Pe teritoriul site-ului*** cu regularitate se întâlnește la nutriție în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Diculi-Cuța-Mațarinskii”. Se hrănește în principal cu pește mic.






Larus canus (Linnaeus, 1758) **– Pescăruș sur – Чайка сизая**
Familia **Laridae** Vigors, 1825 **– Laride – Чайковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: arealul cuprinde teritoriul de la Islanda până la peninsula Kamceatka. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este atașată de bazine acvatice mari – lucuri, iazuri mari, rezervoare. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în timpul nutriției în complexele ”Dubovâi cut”, ”Saghi-Kazaceşti” și ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.








Larus ridibundus (Linnaeus, 1766) **– Pescăruș râzător – Чайка озерная**
Familia **Laridae** Vigors, 1825 **– Laride – Чайковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: toată Eurasia – de la Islanda și insulele Britanice până la peninsula Kamceatka și ținutul Primorsk al Rusiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pretutindeni, specie comună, iar pe alocuri – numeroasă. Mai des se întâlnește în acumulătoare de apă mari și gospodării piscicole; cu regularitate iernează pe partea fără gheață a rezervorului Cuciurgan. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte la nutriție în bazinele acvatice din complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Diculi-Cuța-Mațarinskii”. Se hrănește în principal cu pește mic.





Familia **Meropidae** Rafinesque, 1815 **– Meropide – Щурковые**


1. ***Merops apiaster*** Linnaeus, 1758 **– Prigorie – Щурка золотистая**

Merops apiaster Linnaeus, 1758 **– Prigorie – Щурка золотистая**
Familia **Meropidae** Rafinesque, 1815 **– Meropide – Щурковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: Europa, Asia de Vest, Africa de Nord-Vest și de Sud.
Răspândirea în Republica Moldova: toate raioanele.
Pe teritoriul site-ului cuibărește în complexul ”Tufa-Stânca Talmaza”. În timpul migrației și zboruri de nutriție a fost întâlnită în toate complexele. Se hrănește cu insecte zburătoare.






Familia **Motacillidae** (Horsfield, 1821) **– Motacilide – Трясогузковые**


1. ***Anthus campestris*** (Linnaeus. 1758) **– Fâsă de-câmp – Конек полевой**
2. ***Anthus pratensis*** (Linnaeus. 1758) **– Fâsă de-luncă – Конек луговой**
3. ***Anthus trivialis*** (Linnaeus, 1758) **– Fâsă de-pădure – Конек лесной**
4. ***Motacilla alba*** (Linnaeus, 1758) **– Codobatură albă – Трясогузка белая**
5. ***Motacilla flava*** (Linnaeus, 1758) **– Codobatură galbenă – Трясогузка желтая**

Anthus campestris (Linnaeus. 1758) – **Fâsă de-câmp** – **Конек полевой**
Familia **Motacillidae** (Horsfield, 1821) **– Motacilide – Трясогузковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: regiunile centrale și sudice ale Europei, Asia Mică, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe tot teritoriu, în număr mic. ***Pe teritoriul site-ului*** la cuibărit a fost semnalat practic pretutindeni.








Anthus pratensis (Linnaeus. 1758) – **Fâsă de-luncă** – **Конек луговой**
Familia **Motacillidae** (Horsfield, 1821) **– Motacilide – Трясогузковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Lista roșie IUCN ca specie aproape periclitată (categoria **NT**) și listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: regiunile centrale și sudice ale Europei, Asia Mică, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** lunca Nistrului, Prutului, Răutului și altor râuri, dar este extrem de rară. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește sporadic în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”.






Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) **– Fâsă de-pădure – Конек лесной**
Familia **Motacillidae** (Horsfield, 1821) **– Motacilide – Трясогузковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Asia de Nord și Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în biotopurile cu arbori și arbuști din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Chiţcani”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.








Motacilla alba (Linnaeus, 1758) **– Codobatură albă – Трясогузка белая**
Familia **Motacillidae** (Horsfield, 1821) **– Motacilide – Трясогузковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: o parte mare a Eurasiei, nordul Africii, Alaska. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chițcani”, ”Saghi-Kazacești”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.






Motacilla flava (Linnaeus, 1758) **– Codobatură galbenă – Трясогузка желтая**
Familia **Motacillidae** (Horsfield, 1821) **– Motacilide – Трясогузковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, nordul Africii, în Asia – de la Turcia până la China de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul sitului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chițcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate.







Familia **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**

1. ***Ficedula albicollis*** (Temminck, 1815) **– Muscar gulerat – Мухоловка-белошейка**
2. ***Ficedula hypoleuca*** (Pallas, 1764) **– Muscar negru – Мухоловка-пеструшка**
3. ***Ficedula parva*** (Bechstein, 1794) **– Muscar mic – Мухоловка малая**
4. ***Muscicapa striata*** (Pallas, 1764) **– Muscar sur – Мухоловка серая**

Ficedula albicollis (Temminck, 1815) **– Muscar gulerat – Мухоловка-белошейка**
Familia **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: Europa și Asia de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pădurile din luncile Nistrului și Prutului, biotopurile forestiere din centrul și nordul țării.

Pe teritoriul saitului cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olănești”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate, fructe și semințe de plante.







Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) – **Muscar negru** – **Мухоловка-пеструшка**
Familia **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**

Statutul**:** specie vulnerabilă **– VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), listele Convenţiei de la Berna.
Răspândirea generală: pădurile Europei, Siberiei de Vest şi Africii de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe întreg teritoriu, unde sunt păduri nu prea dese. Începând cu anii 90, efectivul speciei treptat a scăzut. ***Pe teritoriul site-ului*** în ultima perioadă se întâlneşte numai la migraţie în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Chiţcani”, ”Dubovîi cut”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.







Ficedula parva (Bechstein, 1794) **– Muscar mic – Мухоловка малая**
Familia **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.


Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: Europa și practic toată jumătatea nordică a Asiei. Are populații insulare în Caucaz și Crimeea. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** stejaretele din raioanele de nord.

Pe teritoriul site-ului în timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.








Muscicapa striata (Pallas, 1764) **– Muscar sur – Мухоловка серая**
Familia **Muscicapidae** Vigors, 1825 **– Muscicapide – Мухоловковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Eurasia – de la litoralul Atlantic până la Transbaikalia, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere și localitățile din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește, iar în timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Familia **Oriolidae** (Vigors, 1825) **– Oriolide – Иволговые**


1. ***Oriolus oriolus*** (Linnaeus, 1758) **– Grangur – Иволга**

Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) **– Grangur – Иволга**
Familia **Oriolidae** (Vigors, 1825) **– Oriolide – Иволговые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: zona temperată a Europei și Asiei, spre est până la Enisei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și poate fi întâlnită în timpul migrației în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Familia **Pandionidae** (Bonoparte, 1854) **– Pandionide – Скопиные**

1. ***Pandion haliaetus*** (Linnaeus, 1758) **– Uligan pescar – Скопа**

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) **– Uligan pescar – Скопа**
Familia **Pandionidae** (Bonoparte, 1854) **– Pandionide – Скопиные**




***Statutul*:** specie periclitată – **EN.**

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Зникаючий”**), în listele Convenţiilor de la Bonn şi Berna, Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: cosmopolit, pe toată Terra, cu excepția Antarctidei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migraţiei în toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în timpul migraţiei în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. Vânează în bazine acvatice. Se hrănește cu pește.





Familia **Panuridae** Des Murs, 1860 **– Panuride – Суторовые**

1. ***Panurus biarmicus*** (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi de-stuf – Синица усатая**

Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi de-stuf – Синица усатая**
Familia **Panuridae** Des Murs, 1860 **– Panuride – Суторовые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (cateoria **VII**) și inclusă în Lista Operațională și în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: specie cu areal insular – Eurasia, de la Spania până la estul bazinului râului Sungari. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile de baltă din toate raioanele.

Pe teritoriul site-ului cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Poate fi întâlnită și iarna. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.





Familia **Paridae** Vigors, 1825 **– Paride – Синицевые**


1. ***Parus caeruleus*** (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi albastru – Лазоревка**
2. ***Parus major*** (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi mare – Синица большая**

Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) **– Piţigoi albastru – Лазоревка**
Familia **Paridae** Vigors, 1825 **– Paride – Синицевые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Asia de Vest și Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul sitului*** cuibărește, la fel poate fi observată în timpul migrației și iarna în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.






Parus major (Linnaeus, 1758) **– Pițigoi mare – Синица большая**
Familia **Paridae** Vigors, 1825 **– Paride – Синицевые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Europa, Orientul Apropiat, Asia Centrală și de Nord, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește, la fel poate fi observată în timpul migrației și iarna în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.





Familia **Pelecanidae** Rafinesque, 1815 **– Pelecanide – Пеликановые**

1. ***Pelecanus onocrotalus*** (Linnaeus, 1758) – **Pelican comun** – **Пеликан розовый**

Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) – **Pelican comun** – **Пеликан розовый**
Familia **Pelecanidae** Rafinesque, 1815 **– Pelecanide – Пеликановые**


***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **EN**), în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), în Lista Operaţională, în Cartea Roșie a Ucraunei (categoria ”**Зникаючий**”), listele Convenţiilor de la Bonn şi Berna, Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).



Răspândirea generală: cuibăreşte în sud-estul Europei, în nord-estul Africii şi în Asia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în sudul ţării, în luncile Nistrului şi Prutului în bazine acvatice mari, unde soseşte pentru nutriție în perioada după cuibărit şi în migraţie. ***Pe teritoriul site-ului*** poate fi întâlnită în stoluri, care zboară oriunde, însă mai des în partea sudică, în complexele ”Împărăteasa”, “Crocmaz-Tudoara”, “Tudoara-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.





Familia **Phalacrocorocidae** Reichenbach, 1849 **– Falacrocorocide – Баклановые**

1. ***Phalacrocorax pygmaeus*** (Pallas, 1773) **– Cormoran mic – Баклан малый**

Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) – **Cormoran mic** – **Баклан малый**
Familia **Phalacrocorocidae** Reichenbach, 1849 **– Falacrocorocide – Бакла**новые


***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie critic periclitată (categoria **CR**), în Cartea Roşie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**) și în Cartea Roșie a Ucraunei (categoria ”**Зникаючий**”), în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: Europa. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** specie cu areal sudic, răspândită numai într-un segment mic din sudului ţării. Cuibăreşte în lunca râului Prut şi foarte rar - a Nistrului. Mai frecventă este în preajma gospodăriilor piscicole. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte foarte rar în calitate de oaspete în complexele ”Grădina Turcească” ”Crocmaz-Tudora” ”Tudora-Palanca”, **”**Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Cuibărește în biotopul acvatic din complexul ”Lunca Talmaza”, în colonie mixtă pe malul lacului Adana cu cormoranul mare şi stârci.









Familia **Phasianidae** Horsfield, 1821 **– Fasianide – Фазановые**


1. ***Coturnix coturnix*** (Linnaeus, 1758) **– Prepeliță – Перепел**
2. ***Perdix perdix*** (Linnaeus, 1758) **– Potârniche – Куропатка серая**
3. ***Phasianus colchicus*** (Linnaeus, 1758) – **Fazan – Фазан**

Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) **– Prepeliță – Перепел**
Familia **Phasianidae** Horsfield, 1821 **– Fasianide – Фазановые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa, Asia (până la lacul Baikal), Africa. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în pajiști și parcele de stepă în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu plante și nevertebrate.





Perdix perdix (Linnaeus, 1758) **– Potârniche – Куропатка серая**
Familia **Phasianidae** Horsfield, 1821 **– Fasianide – Фазановые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Europa, Asia Mică, Kazahstan și sudul Siberiei de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** este specie cu efectiv redus, dar răspândită larg.

Cuibărește în lunci, parcele ruderale și de stepă, printre arbuști și în lizierile pădurilor din toate complexele. Iernează potârnichii în aceleași biotopuri sau în câmpuri de culturi graminee. Se hrănește cu plante și nevertebrate.








Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) **– Fazan – Фазан**
Familia **Phasianidae** Horsfield, 1821 **– Fasianide – Фазановые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională și listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: introdus în multe regiuni din Europa. Arealul de origine – zonele subtropicale și tropicale ale Asiei, de la Turcia până la Coreea. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și iernează în diferite biotopuri în toate complexele. Se hrănește în principal cu plante și nevertebrate.







Familia **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**


1. ***Dendrocopos major*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare pestriță mare – Дятел большой пестрый**
2. ***Dendrocopos medius*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare de-stejar – Дятел пестрый средний**
3. ***Dendrocopos minor*** (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare pestriță mică – Дятел малый пестрый**
4. ***Dendrocopos syriacus*** (Hemprich et Ehrenberg, 1833) **– Ciocănitoare de-grădini – Дятел сирийский**
5. ***Jynx torquilla*** (Linnaeus, 1758) **– Capântortură – Вертишейка**
6. ***Picus canus*** Gmelin, 1788 **– Ghionoaie sură – Дятел седой**

Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare pestriță mare – Дятел большой пестрый**
Familia **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: zonele temperate ale Eurasiei, Asia de Sud-Est, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și poate fi întâlnită în timpul migrației și iarna în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate, fructe și semințe de plante.






Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) – **Ciocănitoare de-stejar** – **Дятел пестрый средний**
Familia **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**

***Statutul*:** specie vulnerabilă **– VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), în listele Convenţiei de la Berna.
Răspândirea generală: regiunile centrale și sudice ale Europei, Asia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** Codrii centrali, luncile Nistrului și Prutului. ***Pe teritoriul site-ului*** este specie rară, care cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, **”**Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Chiţcani”, ”Dubovîi cut”, ”Saghi-Kazaceşti”, **”**Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.








Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) **– Ciocănitoare pestriță mică – Дятел малый пестрый**
Familia **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: zonele temperate și nordice ale Eurasiei, nordul Africii (Tunisia). ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele
Pe teritoriul site-ului cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Împărăteasa”, ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. În timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate, fructe și semințe de plante.





Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg, 1833) **– Ciocănitoare de-grădini – Дятел сирийский**
Familia **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.


Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: Europa de Sud, Centrală și de Est, Asia de Sud-Vest, vestul Iranului, Iraq. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** localități, perdele forestiere și alte habitate arboricole din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost semnalată la cuibărit în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Este specie sedentară. Se hrănește cu nevertebrate, fructe și semințe de plante.






Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) **– Capântortură – Вертишейка**
Familia **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: zona temperată a Eurasiei, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diciuli-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate.





Picus canus Gmelin, 1788 **– Ghionoaie sură – Дятел седой**
Familia **Picidae** Vigors, 1825 **– Picide – Дятловые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: zona temperată a Eurasiei, Asia de Sud-Est. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pădurile din luncile Nistrului și Prutului, pădurile din centrul și nordul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chițcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. În timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate.





Familia **Podicipedidae** Bonoparte, 1831 **– Podicipedide – Поганковые**


1. ***Podiceps ruficollis*** (Pallas, 1764) **– Corcodel mic – Поганка малая**

Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) **– Corcodel mic – Поганка малая**
Familia **Podicipedidae** Bonoparte, 1831 **– Podicipedide – Поганковые**

***Statutul*:** specie aproape amenințată – **NT.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VII**), inclusă în Lista Operațională și listele Convenției de la Bonn.
Răspândirea generală: specia este larg, dar neregular răspândită în Eurasia, Africa, Australia și Noua Guinee. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în bazine acvatice mari (Nistru, Prut, rezervorul Cuciurgan, ș.a.). ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna poate fi întâlnită în complexele învecinate cu Nistru. Se hrănește preponderent cu nevertebrate acvatice.







Familia **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**


1. ***Crex crex*** (Linnaeus, 1758) **– Cristel de-câmp – Коростель**
2. ***Fulica atra*** (Linnaeus, 1758) **– Lișiță – Лысуха**
3. ***Gallinula chloropus*** (Linnaeus, 1758) **– Găinușă de-baltă – Камышница**
4. ***Porzana parva*** (Scopoli, 1769) **– Cresteţ cenuşiu – Погоныш малый**
5. ***Porzana porzana*** (Linnaeus, 1766) **– Cresteț pestriț – Погоныш обыкновенный**
6. ***Porzana pusilla*** (Pallas, 1776) **– Cresteţ mic – Погоныш крошка**
7. ***Rallus aquaticus*** (Linnaeus, 1758) **– Cârstel de-baltă – Пастушок**

Crex crex (Linnaeus, 1758) **– Cristel de-câmp – Коростель**
Familia **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VII**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **EN**), în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), listele Convenţiilor de la Bonn şi Berna, listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zona temperată a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. În timpul migrației poate fi întâlnită în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și diferite plante.







Fulica atra (Linnaeus, 1758) **– Lișiță – Лысуха**
Familia **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: Eurasia, nordul Africii, Australia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** specie obișnuită pe întreg teritoriu al țării, populează bazine acvatice cu apă stătătoare, bogate în vegetație. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuța-Mațarinskii”, la nutriție - în complexul ”Cioburciu-Răscăieți”. Se hrănește preponderent cu plante.







Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) **– Găinușă de-baltă – Камышница**
Familia **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**


***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova inclusă în Lista Operațională. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: arealul speciei de tip cosmopolit, inclusiv zonele tropicale și temperate. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** bazine acvatice cu apă stătătoare, crescute cu stuf. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Purcari”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. Nutriție mixtă – părțile verzi ale plantelor, semințe, nevertebrate.









Porzana parva (Scopoli, 1769) – **Cresteţ cenuşiu** – **Погоныш малый**
Familia **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**

Statutul**:** specie vulnerabilă **– VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **III**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), listele Convenţiilor de la Bonn şi Berna.
Răspândirea generală: zona de stepă din Europa – până la Marea Caspică, Africa de Nord, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se întâlneşte sporadic pe întreg teritoriu. Populează zonele de mlaştină şi bazinele acvatice. ***Pe teritoriul site-ului*** este destul de rară în majoritatea zonelor umede (complexele ”Grădina Turcească”, **”**Lunca Talmaza”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”).








Porzana porzana (Linnaeus, 1766) **– Crestеț pestriț – Погоныш обыкновенный**
Familia **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn.
Răspândirea generală: de la Europa de Vest până la lacul Baikal. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe întreg teritoriu este specie obișnuită, dar cu efectiv mic, în locuri umede pe malurile bazinelor acvatice; evită stufărișuri, preferând aglomerații de rogoz și alte plante înnalte. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora” și ”Tudora-Palanca”.








Porzana pusilla (Pallas, 1776) **– Crestеţ mic – Погоныш крошка**
Familia **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**

Statutul**:** specie vulnerabilă **– VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), în listele Convenţiilor de la Berna şi Bonn.
Răspândirea generală: Europa, Asia, Africa şi Australia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sporadic pe întreg teritoriu. Populează zonele de mlaştină şi bazinele acvatice. ***Pe teritoriul site-ului*** este destul de rară în zonele umede din complexele ”Crocmaz-Tudora” și ”Tudora-Palanca”.








Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) **– Cârstel de-baltă** – **Пастушок**
Familia **Rallidae** Bonoparte, 1831 **– Ralide – Пастушковые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zona temperată a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe întreg teritoriu al țării este puțin numeroasă sau rară, fiind întâlnită pe malurile bazinelor acvatice și stufărișuri. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora” și ”Tudora-Palanca”.





Familia **Recurvirostridae** (Bonoparte, 1854) **– Recurvirostride – Шилоклювковые**


1. ***Himantopus himantopus*** (Linnaeus, 1758) **– Piciorong – Ходулочник**

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) **– Piciorong – Ходулочник**
Familia **Recurvirostridae** (Bonoparte, 1854) **– Recurvirostride – Шилоклювковые**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), în listele Convenției de la Bonn.
Răspândirea generală: sectoarele mlăștinoase din zonele tropicale și temperate. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în raioanele sudice se întâlnește în bazinele acvatice naturale sau construite cu apă mică. ***Pe teritoriul site-ului*** la cuibărit a fost semnalată în complexele ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”, în timpul migrației și nutriției poate fi întâlnită în toate complexele, cu condiții de trai prielnice.







Familia **Remizidae** Olphe-Galliard, 1891 **– Remizide – Ремезовые**

1. ***Remiz pendulinus*** (Linnaeus, 1758) **– Boicuș – Ремез**

Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) **– Boicuș – Ремез**
Familia **Remizidae** Olphe-Galliard, 1891 **– Remizide – Ремезовые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.


Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională.

Răspândirea generală: Eurasia, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile de baltă din toate raioanele.

Pe teritoriul site-ului cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.







Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**


1. ***Actitis hypoleucos*** (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-munte – Перевозчик**
2. ***Calidris alpina*** (Linnaeus, 1758) **– Fugaci de-ţărm – Чернозобик**
3. ***Calidris ferruginea*** (Pontoppidan, 1763) **– Fugaci roşcat – Краснозобик**
4. ***Calidris minuta*** (Leisl. 1812) **– Fugaci mic – Кулик-воробей**
5. ***Gallinago gallinago*** (Linnaeus, 1758) **– Becațină comună – Бекас**
6. ***Limosa limosa*** (Linnaeus, 1758) **– Sitar de-mal – Веретенник большой**
7. ***Lymnocryptes minimus*** (Brunnich, 1764) **– Becațină mică – Гаршнеп**
8. ***Numenius arquata*** (Linnaeus, 1758) **– Culic mare – Кроншнеп большой**
9. ***Philomachus pugnax*** (Linnaeus, 1758) **– Bătăuș – Турухтан**
10. ***Scolopax rusticola*** (Linnaeus, 1758) **– Sitar de-pădure – Вальдшнеп**
11. ***Tringa erythropus*** (Pallas, 1764) **– Fluierar negru – Щеголь**
12. ***Tringa glareola*** (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-mlaștină – Фифи**
13. ***Tringa nebularia*** (Gunnerus, 1767) **– Fluierar-cu-picioare-verzi – Большой улит**
14. ***Tringa ochropus*** (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-zăvoi – Черныш**
15. ***Tringa stagnatilis*** (Bechstein, 1803) **– Fluierar de-lac – Поручейник**
16. ***Tringa totanus*** (Linnaeus. 1758) **– Fluierar-cu-picioare- roşii – Травник**

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-munte – Перевозчик**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde o parte mare a Eurasiei – de la tundrele sudice în nord până la deșerturile zonei temperate, spre sud și de la oceanul Atlantic, până la cel Pacific. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se întâlnește în toată țara pe malurile răurilor, lacurilor și iazurilor mari, evitând mlaștinile. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte în timpul migraţiei în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”. La cuibărit a fost semnalată în complexele ”Grădina Turcească” și ”Împărăteasa”.






Calidris alpina (Linnaeus, 1758) – **Fugaci de-ţărm** – **Чернозобик**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

***Statutul*:** specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenţiilor de la Berna şi Bonn.
Răspândirea generală: populează zona de tundră. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** uneori se întâlneşte în sudul ţării în timpul migraţiei. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost semnalată în timpul migraţiei în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.








Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) – **Fugaci roşcat** – **Краснозобик**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*: specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Lista roșie IUCN ca specie aproape periclitată (categoria **NT**), inclusă în listele Convenţiilor de la Berna şi Bonn.
Răspândirea generală: populează tundra uscată și mlaștinoasă. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** uneori se întâlnește în sudul țării în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** este rară și numai în timpul migrației. A fost semnalată în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.






Calidris minuta (Leisl. 1812) – **Fugaci mic** – **Кулик-воробей**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenţiilor de la Berna şi Bonn.
Răspândirea generală: zona de tundră a Europei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** uneori se întâlneşte în sudul ţării în timpul migraţiei. ***Pe teritoriul site-ului*** este rară şi numai în timpul migraţiei. A fost semnalată în complexele ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.






Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) **– Becațină comună – Бекас**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zona temperată și subtropicală a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației în locuri mlăștinoase din toată țara. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost semnalată în timpul migrației în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.







Limosa limosa (Linnaeus, 1758) **– Sitar de-mal – Веретенник большой**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacidee – Бекасовые**


***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), Lista roșie IUCN ca specie aproape periclitată (categoria **NT**), listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: zona temperată a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației în biotopurile de baltă din sudul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în timpul migrației în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Diciuli-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește în principal cu nevertebrate.








Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) **– Becaţină mică – Гаршнеп**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zona temperată și de nord a Eurasiei – de la Scandinavia până la Siberia de Est. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației în biotopurile mlăștinoase din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlneşte în timpul migraţiei în complexele ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.





Numenius arquata (Linnaeus, 1758) **– Culic mare – Кроншнеп большой**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**) și Cartea Roșie a Ucrainei (categoria ”**Зникаючий”**), în Lista roșie IUCN ca specie aproape periclitată (categoria **NT**), în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zona de nord și temperată a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației în biotopurile de baltă, preponderent în raioanele sudice. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în timpul migraţiei în complexele ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate.






Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) **– Bătăuș – Турухтан**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: din locurile de iernat africane și vesteuropene zboară la cuibărit în zonele de silvostepă, pădure și tundră ale Europei și Siberiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** preponderent în raioanele sudice în timpul migrației în biotopurile de baltă, preferă malurile deschise ale bazinelor acvatice. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației a fost semnalată practic în toate comlexele cu condiții potrivite. Poate să formeze aglomerații, uneori foarte mari.







Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) **– Sitar de-pădure – Вальдшнеп**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: zona de pădure și silvostepă a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației poate fi întâlnită în toate complexele. Uneori se întâlnește iarna în pădurile de luncă. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.






Tringa erythropus (Pall. 1764) – **Fluierar negru** – **Щеголь**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenţiei de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zona de tundră și silvotundră a Europei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** uneori poate fi întâlnită în biotopuri umede în timpul migrației, solitar sau mai rar în grupuri mici. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește rareori în timpul migrației în complexele ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.






Tringa glareola (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-mlaştină – Фифи**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convențiilor de la Berna și Bonn, Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: cuibărește în Eurasia – de la Scandinavia și Danemarka până la râul Anadâri și peninsula Kamceatka. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației pe malurile bazinelor acvatice cu apă mică din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în timpul migrației în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește în principal cu insecte semiacvatice și larvele lor.






Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) **– Fluierar-cu-picioare-verzi – Улит большой**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn, Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zona de pădure a Eurasiei – de la Scoția și peninsula Scandinavă până la Kamceatka și Amurul Inferior. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației pe malurile bazinelor acvatice cu apă mică din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în timpul migrației în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește în principal cu insecte scvatice.






Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) **– Fluierar de-zăvoi – Черныш**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: zona de pădure a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației se întâlnește în perechi sau grupuri mici pretutindeni, la malurile răurilor, pârâiașilor și canalelor de irigație. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost semnalat în timpul migrației și nutriție în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Ca hrană le servesc insectele terestre și acvative, cât și larvele lor.






Tringa stagnatilis (Bechst. 1803) – **Fluierar de-lac** – **Поручейник**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: sectoarele înmlăștinite din luncile râurilor ale zonelor de stepă și silvostepă din Europa. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** uneori poate fi observată în zonele umede din luncile răurilor în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește rar, în timpul migrației în complexele ”Grădina Turcească”, **”**Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.






Tringa totanus (Linnaeus. 1758) – **Fluierar-cu-picioare-roşii** – **Травник**
Familia **Scolopacidae** Vigors, 1825 **– Scolopacide – Бекасовые**



***Statutul*:** specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenţiei de la Bonn, Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: populează luncile umede și mlaștinile de la zona taiga până la munții și deșerturile Europei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** la cuibărit nu a fost semnalat, dar este specie obișnuită în sectoarele imede în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** este destul de frecventă în timpul migrației în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.






Familia **Sittidae** Lesson, 1828 **– Sitide – Поползни**


1. ***Sitta europaea*** (Linnaeus, 1758) **– Țiclean – Поползень**

Sitta europaea (Linnaeus, 1758) **– Țiclean – Поползень**
Familia **Sittidae** Lesson, 1828 **– Sitide – Поползни**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, o parte mare a Asiei, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere preponderent din raioanele de nord și centru, la fel și pădurile de luncă a Nistrului de Jos. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.








Familia **Sternidae** Bonoparte, 1838 **– Sternide – Крачковые**


1. ***Chlidonias hybridus*** (Pallas, 1811) **– Chirighiţă-cu-obraji-albi – Крачка белощекая**
2. ***Chlidonias niger*** (Linnaeus. 1758) **– Chirighiţă neagră – Крачка черная**
3. ***Sterna hirundo*** (Linnaeus, 1758) **– Chiră de-baltă – Речная крачка**

Chlidonias hybridus (Pall. 1811) **– Chirighiţă-cu-obraji-albi – Крачка белощекая**
Familia **Sternidae** Bonoparte, 1838 **– Sternide – Крачковые**



***Statutul*:** specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenţiei de la Berna.
Răspândirea generală: populează sporadic bazinele acvatice cu apă dulce din Europa de Sud și Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** cuibărește în unele bazinele acvatice din sudul țării. Mai pe larg poate fi semnalată în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** mai des a fost semnalată ca specie călătoare. Se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.






Chlidonias niger (Linnaeus. 1758) – **Chirighiţă neagră** – **Крачка черная**
Familia **Sternidae** Bonoparte, 1838 **– Sternide – Крачковые**

***Statutul*:** specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convențiilor de la Berna și Bonn.
Răspândirea generală: bazinele acvatice cu apă dulce din Europa de Est și sporadic - în Europa de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** cuibărește în bazinele acvatice din sudul țării. Mai des poate fi semnalată în timpul migrației. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost semnalată ca specie călătoare, mai rar - cuibărește. Se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.








Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) **– Chiră de-baltă – Крачка речная**
Familia **Sternidae** Bonoparte, 1838 **– Sternide – Крачковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde o parte mare a Europei, Asiei și Americii de Nord, la fel cuibărește pe litoralul de vest al Africii și în Marea Caraibă. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este o specie obișnuită și caracteristică, care cuibărește în toate bazinele acvatice cu condiții prielnice. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost înregisrată în timpul migrației și nutriției în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.





Familia **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**


1. ***Asio flammeus*** (Pontoppidan, 1763) **– Ciuf de-câmp – Сова болотная**
2. ***Asio otus*** (Linnaeus, 1758) **– Ciuf de-pădure – Сова ушастая**
3. ***Athene noctua*** (Scopoli, 1769) **– Cucuvea – Сыч домовый**
4. ***Otus scops*** (Linnaeus, 1758) **– Ciuf pitic – Сплюшка**
5. ***Strix aluco*** (Linnaeus, 1758) **– Huhurez de-pădure – Неясыть серая**

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) **– Ciuf de-câmp – Сова болотная**
Familia **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**



Statutul**:** specie periclitată – **EN.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **III**), inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Cartea Roşie a Transnistriei (categoria **EN**), în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний”**), listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări.
Răspândirea generală: zonele temperate și nordice ale Eurasiei și Americii de Nord, America de Sud (Argentina, Cili, ș.a.). ***Răspândirea în Republica Moldova:*** mai des a fost semnalată în timpul migrației și iarna. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migraţiei și iarna se întâlneşte în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Saghi-Kazacești”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește în principal cu șoareci.






Asio otus (Linnaeus, 1758) **– Ciuf de-pădure – Сова ушастая**
Familia **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VII**), inclusă în Lista Operațională și în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. Iarna efectivul populațiilor crește din contul indivizilor sosiți din regiunile nordice. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chițcani”, ”Saghi-Kazacești”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. Iarna poate fi întâlnită și în alte complexe. Se hrănește în principal cu șoareci.






Athene noctua (Scopoli, 1769) **– Cucuvea – Сыч домовый**
Familia **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională și în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Asia (cu excepția nordului), Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chiţcani”. Specie sedentară. Se hrănește în principal cu șoareci.






Otus scops (Linnaeus, 1758) **– Ciuf pitic – Сплюшка**
Familia **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**





***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**) și în Lista Operațională, în Cartea Roşie a Ucrainei (categoria ”**Рідкісний”**), în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, sudul Siberiei, Asia Mică, Orientul Apropiat și Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chițcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu insecte mari.




Strix aluco (Linnaeus, 1758) **– Huhurez de-pădure – Неясыть серая**
Familia **Strigidae** (Vigors, 1825) **– Strigide – Совиные**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**) și inclusă în Lista Operațională, în Cartea Roșie a Transnistriei (categoria **VU**), inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Siberia de Vest, Asia de Sud-Vest și Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Iarna și în timpul migrației poate fi întâlnită în majoritatea complexelor. Se hrănește în principal cu șoareci.





Familia **Sturnidae** (Rafinesque, 1815) **– Sturnide – Скворцовые**

1. ***Sturnus vulgaris*** Linnaeus, 1758 **– Graur – Скворец обыкновенный**

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 **– Graur – Скворец обыкновенный**
Familia **Sturnidae** (Rafinesque, 1815) **– Sturnide – Скворцовые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: Eurasia – de la oceanul Atlantic până la lacul Baikal, a fost introdusă în America de Nord, Africa de Sud și Australia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este una dintre cele mai numeroase și răspândite păsări în țară, întâlnită pretutindeni. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și se întâlnește în timpul migrației și iarna în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate, fructe și semințe de plante.





Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**

1. ***Acrocephalus arundinaceus*** (Linnaeus, 1758) **– Lăcar mare – Камышевка дроздовидная**
2. ***Acrocephalus palustris*** (Bechstein, 1798) **– Lăcar de-mlaştină – Камышевка болотная**
3. ***Acrocephalus schoenobaenus*** (Linnaeus, 1758) **– Lăcar mic – Камышевка-барсучок**
4. ***Acrocephalus scirpaceus*** (Hermann, 1804) **– Lăcar de-stuf – Камышевка тростниковая**
2. ***Hippolais icterina*** (Vieillot, 1817) **– Frunzăriţă galbenă – Пересмешка зеленая**
3. ***Locustella fluviatilis*** **(**Wolf, 1810) **– Greluşel de-zăvoi – Сверчок речной**
4. ***Locustella luscinioides*** (Savi, 1824) **– Greluşel de-stuf – Сверчок соловьиный**
5. ***Locustella naevia*** **(**Boddaert, 1783) **– Greluşel pătat – Сверчок обыкновенный**
6. Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) **– Pitulice mică – Пеночка-теньковка**
7. Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) **– Pitulice sfârâitoare – Пеночка-трещотка**
8. Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) **– Pitulice fluierătoare – Пеночка-весничка**
9. ***Sylvia atricapilla*** (Linnaeus, 1758) **– Silvie-cu-cap-negru – Славка-черноголовка**
10. ***Sylvia borin*** (Boddaert, 1783) **– Silvie de-zăvoi – Славка садовая**
11. ***Sylvia communis*** (Latham, 1787) **– Silvie de-câmp – Славка серая**
12. ***Sylvia curruca*** (Linnaeus, 1758) **– Silvie mică – Славка-завирушка**
13. ***Sylvia nisoria*** (Bechstein, 1795) **– Silvie porumbacă – Славка-ястребинка**

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) **– Lăcar mare – Камышевка дроздовидная**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**


***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Eurasia, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sectoarele mlăștinoase din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate.








Acrocephalus palustris (Bechst. 1798) – **Lăcar de-mlaştină** – **Камышевка болотная**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa de Vest și parțial de Est, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe teritoriul țării este larg, dar sporadic răspândită. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în număr mic. Populează tufărișuri pe malurile bazinelor acvatice. Se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, **”**Lunca Talmaza”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, **”**Diculi-Cuța-Maţarinskii”.





Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) **– Lăcar mic – Камышевка-барсучок**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: vestul Eurasiei, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile de baltă din toate raioanele. ***Pe teritoriul sitului*** cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Diciuli-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate.






Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) **– Lăcar de-stuf – Камышевка тростниковая**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: vestul Eurasiei, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile de baltă din toate raioanele.
Pe teritoriul site-ului cuibărește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate.






Hippolais icterina (Vieillot, 1817) – **Frunzăriță galbenă – Пересмешка зеленая**

Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**


***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: partea de vest a Eurasiei – de la Scandinavia și Franța de est spre est până la luncă fluviului Obi. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.








Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) – **Greluşel de-zăvoi** – **Сверчок речной**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Europa Centrală și de Sud. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe larg răspândită în luncile râurilor, mai ales în regiunile sudice, dar în număr redus. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește, dar este în număr redus. Se întâlnește în complexele cu biotopuri de baltă – ”Grădina Turcească”, **”**Lunca Talmaza”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.








Locustella luscinioides (Savi, 1824) **– Greluşel de-stuf – Сверчок соловьиный**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: regiunile sudice ale Europei și Asiei de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** destul de rară, preponderent în luncile Nistrului și Prutului, dar în număr mic. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește, dar este în număr redus. Se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească” și ”Crocmaz-Tudora”.








Locustella naevia (Boddaert, 1783) **– Greluşel pătat – Сверчок обыкновенный**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**


***Statutul*:** specie cu date deficitare – **DD.**
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenţiei de la Berna.
Răspândirea generală: Europa Centrală și de Sud, Asia Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sporadic în luncile râurilor și bazinele acvatice interne. Efectivul peste tot este redus. ***Pe teritoriul site-ului*** la cuibărit este specie rară. A fost semnalată în zonele umede ale complexelor ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”.







Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) **– Pitulice mică – Пеночка-теньковка**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: zonele temperate și nordice ale Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul sitului:*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) **– Pitulice sfârâitoare – Пеночка-трещотка**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Eurasia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere, preponderent din raioanele centrale și nordice. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Chiţcani”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) **– Pitulice fluierătoare – Пеночка-весничка**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: zonele temperate și nordice ale Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pădurile din lunca Nistrului și Prutului, biotopurile forestiere, preponderent din raioanele centrale și nordice. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Chițcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Mațarinskii”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.






Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) **– Silvie-cu-cap-negru – Славка-черноголовка**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Siberia de Vest, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și în timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.








Sylvia borin (Boddaert, 1783) **– Silvie de-zăvoi – Славка садовая**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.


Răspândirea generală: Europa, Siberia de Vest, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** preponderent în pădurile de luncă. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Chiţcani”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Sylvia communis (Latham, 1787) **– Silvie de-câmp – Славка серая**

Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Europa, Siberia de Vest, Africa de Nord-Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile cu arbuști și buruiene înnalte din toate raionele. ***Pe teritoriul site-ului*** la cuibărit și în timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) **– Silvie mică – Славка-завирушка**
Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silviide – Славковые**


***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: de la Europa de Vest până la Transbaikalia și de la silvotundră până la Asia de Sud. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** preponderent în pădurile de luncă și în biotopurile urbanizate din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.







Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) **– Silvie porumbacă – Славка-ястребинка**

Familia **Sylviidae** Vigors, 1825 **– Silvide – Славковые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: vestul Eurasiei – de la Scandinavia și estul Franței spre est până la lunca fluviului Obi. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** preponderent în sectoarele aride cu arbuști și biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chițcani”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Familia **Treskiornithidae** (Richmond, 1917) **–Tresciornitide – Ибисовые**

1. ***Platalea leucorodia*** (Linnaeus, 1758) – **Lopătar** – **Колпица**
2. ***Plegadis falcinellus*** (Linnaeus, 1766) – **Ţigănuş** – **Каравайка**

Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) **– Lopătar – Колпица**
Familia **Treskiornithidae** (Richmond, 1917) **– Tresciornitide – Ибисовые**


***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulnerabilă (categoria **VU**), Lista Operaţională. Inclusă în Cartea Roșie a Ucraunei (categoria ”**Вразливий**”), listele Convenţiilor de la Berna şi Bonn, Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: Europa şi Asia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sudul țării, în luncile Nistrului și Prutului. Cuibărește în stufărișurile Prutului. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în calitate de migrant și pasăre călătoare în complexele ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Este rară în complexele site-ului din cauza lipsei condițiilor prielnice.







Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) – Ţigănuş – Каравайка
Familia **Treskiornithidae** (Richmond, 1917) – Tresciornitide – Ибисовые




***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Cartea Roșie a Transnistriei ca specie vulneravilă (categoria **VU**), în Cartea Roşie a Ucraunei (categoria ”**Вразливий**”), Lista Operaţională, listele Convenţiilor de la Berna şi Bonn, Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: din sudul Europei până în Asia Centrală şi de Est, în Filipine, Indonesia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sudul țării, în luncile Nistrului și Prutului.

Pe teritoriul site-ului se întâlnește în calitate de pasăre călătoare în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Saghi-Kazaceşti” ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.
Caracteristic ca loc de nutriție este meandru cu luncă, ce se află în nordul complexului ”Lunca Talmaza”.





Familia **Troglodytidae** Swainson, 1832 **– Trogloditide – Крапивниковые**

1. ***Troglodytes troglodytes*** (Linnaeus, 1758) **– Pănțăruș – Крапивник**

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) **– Pănțăruș – Крапивник**
Familia **Trogloditidae** Swainson, 1832 **– Trogloditide – Крапивниковые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Eurasia și America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din raioanele de centru și nord, iar în timpul migrației și iarna – pe întreg teritoriu al țării. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost semnalată la cuibărit în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”. În timpul migrației și iarna se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și semințe de plante.





Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**


1. ***Erithacus rubecula*** (Linnaeus, 1758) **– Măcăleandru – Зарянка**
2. ***Luscinia luscinia*** (Linnaeus, 1758) **– Privighetoare de-zăvoi – Соловей обыкновенный**
3. ***Luscinia svecica*** (Linnaeus, 1758) **– Guşă vânătă – Варакушка**
4. ***Oenanthe oenanthe*** (Linnaeus, 1758) **– Pietrar sur – Каменка обыкновенная**
5. ***Phoenicurus ochruros*** (Gmelin, 1774) **– Codroş de-munte – Горихвостка-чернушка**
6. ***Phoenicurus phoenicurus*** (Linnaeus, 1758) **– Codroş de-pădure – Горихвостка обыкновенная**
7. ***Saxicola rubetra*** (Linnaeus, 1758) **– Mărăcinar mare – Чекан луговой**
8. ***Saxicola torquata*** (Linnaeus, 1766) **– Mărăcinar negru – Чекан черноголовый**
9. ***Turdus iliacus*** (Linnaeus, 1766) **– Sturz de-vii – Белобровик**
10. ***Turdus merula*** (Linnaeus, 1758) **– Mierlă – Дрозд черный**
11. ***Turdus philomelos*** (Brehm, 1831) **– Sturz cântător – Дрозд певчий**
12. ***Turdus pilaris*** (Linnaeus, 1758) **– Cocoşar – Дрозд-рябинник**
13. ***Turdus viscivorus*** Linnaeus, 1758 **– Sturz de-vâsc – Дрозд-деряба**

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) **– Măcăleandru – Зарянка**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Eurasia de Vest și Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și a fost semnalată în timpul migrației în toate complexele. O parte din populația păsărilor rămâne la iernat. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.






Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) **– Privighetoare de-zăvoi – Соловей обыкновенный**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: zonele temperate ale Eurasiei – de la sudul Suediei și Cehiei până la vestul de Altai. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește și a fost semnalată în timpul migrației în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) **– Gușă vânătă – Варакушка**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU.**

Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **EN**), listele Convenției de la Berna și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: zonele nordice și temperate ale Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** sectoare din preajma Prutului și rezervorului Cuciurgan.

Pe teritoriul site-ului se întâlneşte în timpul migraţiei în complexul ”Diciuli-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.






Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) **– Pietrar sur – Каменка обыкновенная**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Eurasia, Africa de Nord-Vest, America de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.






Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) **– Codroș de-munte – Горихвостка-чернушка**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Caucaz, Asia Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** este indicată la cuibărit în complexele ”Grădina Turcească”, ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”. Se întâlnește destul de rar în timpul migraţiei în complexele ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.








Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) **– Codroș de-pădure – Горихвостка обыкновенная**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Africa de Nord-Vest, Asia Mică, Iran, Iraq. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Chițcani”, ”Saghi-Kazacești”, ”Dubovâi cut”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.








Saxicola rubetra (Linnaeus. 1758) – **Mărăcinar mare** – **Чекан луговой**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe întreg teritoriul țării, este frecventă în luncile răurilor și în Codrii. ***Pe teritoriul site-ului*** este destul de rară și cu efectiv mic. Se întâlnește în complexele ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Popeasca”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.








Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) **– Mărăcinar negru – Чекан черноголовый**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Eurasia și Africa. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Purcari”, ”Lunca Olăneşti-Crocmaz”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Tudora-Palanca”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.








Turdus iliacus (Linnaeus. 1766) – **Sturz-de-vii** – **Белобровик**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în Lista roșie IUCN ca specie aproape periclitată (categoria **NT**).
Răspândirea generală: nord-estul Europei și nordul Asiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației în biotopurile forestiere. ***Pe teritoriul site-ului*** este specie cu efectiv mic în timplul migrației. Se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăeţi”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Chiţcani”, ”Diciuli-Cuţa-Maţarinskii”.





Turdus merula (Linnaeus, 1758) **– Mierlă – Дрозд черный**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: Europa, Africa de Nord-Vest, pădurile din Asia Mică și Centrală. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chițcani”, ”Saghi-Kazacești”, ”Diculi-Cuța-Mațarinskii”, ”Diculi-Cuța-Mațarinskii”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.






Turdus philomelos (Brehm, 1831) **– Sturz cântător – Дрозд певчий**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: Europa, Siberia, Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile forestiere din toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** cuibărește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Purcari”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chițcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuța-Maţarinskii”. În timpul migrației se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.






Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) **– Cocoșar – Дрозд-рябинник**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).
Răspândirea generală: zonele nordice și temperate ale Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** rar cuibărește în raioanele de nord. ***Pe teritoriul site-ului*** în timpul migrației și iarna se întâlnește în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 **– Sturz de-vâsc – Дрозд-деряба**
Familia **Turdidae** (Rafinesque, 1815) **– Turdide – Дроздовые**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecție: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. Inclusă în listele Convenției de la Bonn și Directivei Păsări (Birds Directive EU 79/409/EEC).

Răspândirea generală: zonele nordice și temperate ale Eurasiei – de la litoralul oceanului Atlantic până la lacul Baikal, Africa de Nord-Vest, Asia Mică, Caucaz. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în timpul migrației și iarna în toate raioanele.

Pe teritoriul site-ului a fost semnalată în timpul migrației în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Răscăieţi-Olăneşti”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Crocmaz-Tudora”, ”Lacul Lăptura-Nistrul Vechi”, ”Chiţcani”, ”Saghi-Kazaceşti”, ”Dubovâi cut”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. În unele complexe a fost întâlnită și iarna. Se hrănește cu nevertebrate și fructe de plante.





Familia **Upupidae** Leach, 1820 **– Upupide – Удодовые**

1. ***Upupa epops*** Linnaeus, 1758 **– Pupăză – Удод**

Upupa epops Linnaeus, 1758 **– Pupăză – Удод**
Familia **Upupidae** Leach, 1820 **– Upupide – Удодовые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.


Starea de protecție: în Republica Moldova protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională și listele Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: Eurasia, Africa. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele.

Pe teritoriul site-ului cuibărește și poate fi întâlnită în timpul migrației în toate complexele. Se hrănește cu nevertebrate.







Clasa **Mammalia** Linnaeus, 1758 **– Mamifere – Млекопитающие**

Catalogul speciilor de mamifere din site-ul Ramsar ”Nistrul de Jos”, protejate la nivel național și internațional, prezintă o listă adnotată a taxoanelor întâlnite pe acest teritoriu. Familiile și speciile sunt plasate în ordine alfabetică.

Pentru fiecare specie sunt prezentate următoarele caracteristici:

- denumirea în limba latină, română și rusă;
- apartenența la familie în limba latină;
- statutul (categoria de raritate);
- starea de protecție (includere în legislația ecologică a Republicii Moldova (categoriile de raritate ale speciilor protejate: I – specie dispărută, II – specie, amenințată cu dispariția, III – specie, efectivul căreia se micșorează catastrofal, ce poate să o pună în pericol de dispariție, IV – specie rară, V – specie nedeterminată, VI – specie restabilită, VII – specie insuficient studiată, VIII – specie, care nu provoacă îngrijorare) [199], Lista Operațională [123], Cartea Roșie a Republicii Moldova [9], Cartea Roșie a Transnistriei [112], Cartea Roșie a Ucrainei [186], Listele IUCN [21, 22], Convenția de la Berna [11], Directiva Europeană pentru conservarea habitatelor [14];
- răspândirea în Republica Moldova [19];
- răspândirea pe teritoriul site-ului – afilierea la complexele naturale;
- afilierea la habitate;
- foto de Țurcanu V.F. și Bondarenko A.M. Au fost folosite materialele site-ului www.wikipedia.org

Fauna și speciile rare de mamifere

În componența faunei de mamifere a site-ului Ramsar ”Nistrul de Jos” au fost evidențiate 32 specii [1, 2, 7, 9, 32, 52, 85, 106, 107, 119 и др.], protejate la nivel internațional și național. Ele se deosebesc după gradul de raritate, sunt reprezentate de diferite populații, răspândirea unor dintre ele se limitează cu una sau câteva localități. Unele dintre specii necesită de măsuri speciale de conservare, mai ales speciile cu înalte categorii de raritate. Unele specii necesită măsuri speciale de protecție, mai ales speciile cu categorii înalte de raritate.

Sub protecția statului în Republica Moldova se află 22 specii de mamifere [199]: 2 specii sunt amenințate cu dispariția (categoria **II**) – *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761 și *Nyctalus lasiopterus* Schreber, 1780; 2 specii, efectivul cărora se micșorează catastrofal, ce poate să le pună în pericol de dispariție (categoria **III**) – *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Lutra lutra* Linnaeus, 1758; 12 specii rare (categoria **IV**) – *Eptesicus serotinus* Schreber, 1774, *Martes martes* Linnaeus, 1758, *Mustela erminea* Linnaeus, 1758, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Myotis daubentonii* Kuhl, 1817, *Nyctalus leisleri* Kuhl, 1817, *Nyctalus noctula* Schreber, 1774, *Pipistrellus nathusii* Keyserling and Blasius, 1839, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein, 1800, *Sorex minutus* Linnaeus, 1766, *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758; starea a 6 specii nu provoacă îngrijorare (categoria **VIII**) – *Erinaceus europeus* Barrett-Hamilton, 1900, *Martes foina* Erxleben, 1777, *Meles meles* Linnaeus, 1758, *Mustela nivalis* Linnaeus, 1766, *Mustela putorius* Linnaeus, 1758, *Sorex araneus* Linnaeus, 1758.

Cele mai rare specii, cu categorie de raritate mare sunt incluse în ediția a 3-a a Cărții Roșie a Republicii Moldova [9]: 4 sunt critic periclitate (categoria **CR**) – *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817, *Nyctalus lasiopterus* Schreber, 1780 și *Vespertilio murinus* Linnaeus, 1758; 4 specii periclitate (categoria **EN**) – *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Neomys anomalus* Cabrera, 1907, *Pipistrellus nathusii* Keyserling and Blasius, 1839, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein, 1800; 12 specii vulnerabile (categoria **VU**) – *Cricetus cricetus* Pallas, 1773, *Crocidura leucodom* Hermann, 1780, *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Lutra lutra* Linnaeus, 1758, *Martes martes* Linnaeus, 1758, *Micromys minutus* Pallas, 1771, *Mustela erminea* Linnaeus, 1758, *Myotis daubentonii* Kuhl, 1817, *Myotis mystacinus* Kuhl, 1817, *Myoxus glis* Linnaeus, 1766, *Pipistrellus kuhlii* Kuhl, 1817, *Plecotus austriacus* Fischer, 1829.

Din Cartea Roșie a Transnistriei au fost înregistrate 8 specii [112]: 3 sunt critic periclitate (categoria **CR**) – *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Mustela erminea* Linnaeus, 1758, *Neomys anomalus* Cabrera, 1907; 4 specii periclitate (categoria **EN**) – *Lutra lutra* Linnaeus, 1758, *Martes martes* Linnaeus, 1758, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein, 1800 și o specie vulnerabilă (categoria **VU**) – *Meles meles* Linnaeus, 1758.

Din Lista Operațională, alcătuită în urma elaborării a Rețelei Ecologice Naționale, pe teritoriul site-ului Ramsar ”Nistrul de Jos” au fost înregistrate 14 specii de mamifere [123].

Pe teritoriul site-ului se întâlnesc specii de mamifere, care sunt rare și pe teritoriul învecinat al Ucrainei. În Cartea Roșie a Ucrainei se regăsesc 23 specii [186], dintre care 10 sunt atribuite la categoria ”**Вразливий**”, 3 specii la categoria ”**Зникаючий**”, 3 specii la categoria ”**Рідкісний**”, o specie la categoria ”**Недостатньо відомий**” și 6 specii la categoria ”**Неоцінений**”.

Din Lista Roșie IUCN sunt prezente 5 specii [21] – *Lutra lutra* Linnaeus, 1758, *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Nyctalus lasiopterus* Schreber, 1780.

Din Lista Roșie a Europei au fost semnalate 7 specii [22] – *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Lutra lutra* Linnaeus, 1758, *Mustela lutreola* Linnaeus, 1761, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Nyctalus lasiopterus* Schreber, 1780, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein, 1800.

Din listele Convenției europene despre conservarea speciilor sălbatice (Convenția de la Berna, 1979) [11] au fost înregistrate 26 specii, iar din Convenția de la Bonn – 15 specii de mamifere.

În Anexa II a Directivei pentru Habitate (Directiva Consiliului 92/43/EEC din 21 mai 1992 despre conservarea habitatelor și a florei și faunei sălbatice) [14] sunt incluse 5 specii – *Cricetus cricetus* Pallas, 1773, *Felis silvestris* Schreber, 1777, *Myotis bechsteinii* Kuhl, 1817, *Myotis dasycneme* Boie, 1825, *Rhinolophus hipposideros* Bechstein, 1800 și în Anexa IV – 17 specii rare de mamifere.

Familia **Cricetidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Cricetide – Хомяковые**

1. ***Cricetus cricetus*** Pallas, 1773 **– Hârciog – Хомяк обыкновенный**

Cricetus cricetus Pallas, 1773 **– Hârciog – Хомяк обыкновенный**
Familia **Cricetidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Cricetide – Хомяковые**


***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: este inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Lista Operațională, în Anexa III a Convenției de la Berna și Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: zonele de stepă și silvostepă din Europa Centrală și de Est, până la Siberia de Vest. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** în toate zonele, dar nu este frecventă. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”. Populează atât terenuri nelucrate, cât și cele arabile, haturi, margini de drum, perdele forestiere.







Familia **Erinaceidae** G.Fischer, 1814 **– Erinaceide – Ежовые**


1. ***Erinaceus europeus*** Barret-Hamilton, 1900 – **Arici comun** – **Еж обыкновенный**

Erinaceus europeus Barret-Hamilton, 1900 – **Arici comun** – **Еж обыкновенный**
Familia **Erinaceidae** G.Fischer, 1814 **– Erinaceide – Ежовые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională și în Anexa II a Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: Europa, Asia, Africa si Noua Zeelandă. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe tot teritoriul țării, în special în habitatele cu păduri insulare din nord și centru. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în toate complexele, prevalând în ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Impărăteasa”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.





Familia **Felidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Felide – Кошачьи**

1. ***Felis silvestris*** Schreber, 1777 **– Pisica sălbatică – Кот лесной**

Felis silvestris Schreber, 1777 **– Pisica sălbatică – Кот лесной**

Familia **Felidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Felide – Кошачьи**


***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Lista Operațională, în Anexa II a CITES, Anexa II a Convenției de la Berna și Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde peninsula Iberică, centrul și sud-estul Europei, Caucazul. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** bălțile inferioare ale Prutului și Nistrului, pădurile din Codrii Centrali și nordul țării. ***Pe teritoriul sitului*** se întâlnește atât în complexele silvice terestre, cât și în cele palustre.







Familia **Muridae** Illiger, 1811 **– Muride – Мышиные**


1. ***Micromys minutus*** Pallas, 1771 **– Șoarece pitic – Мышь малютка**

Micromys minutus Pallas, 1771 **– Șoarece pitic – Мышь малютка**
Familia **Muridae** Illiger, 1811 **– Muride – Мышиные**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: este inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**).
Răspândirea generală: zona de stepă și silvostepă a Eurasiei, de la nord-estul Spaniei până în Coreae, la nord - până la latitudinea de 65º. La sud limita ariei trece prin sudul Romîniei, Ucrainei, nordul Caucazului și Mongoliei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** zonele Centală și de Nord, luncile Prutului și Nistrului. ***Pe teritoriul site-ului*** populează în majoritatea complexelor cu sectoarelor silvice și de luncă cu vegetație erbacee înaltă.





Familia **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**


1. ***Lutra lutra*** Linnaeus, 1758 **– Vidră – Выдра**
2. ***Martes foina*** Erxleben, 1777 **– Jder de-piatră – Куница каменная**
3. ***Martes martes*** Linnaeus, 1758 **– Jder de-pădure – Куница лесная**
4. ***Meles meles*** Linnaeus, 1758 **– Bursuc – Барсук**
5. ***Mustela erminea*** Linnaeus, 1758 **– Hermelină – Горностай**
6. ***Mustela lutreola*** Linnaeus,1761 **– Nurcă europeană – Норка европейская**
7. ***Mustela nivalis*** Linnaeus,1766 **– Nevăstuică – Ласка**
8. ***Mustela putorius*** Linnaeus, 1758 **– Dihor de-pădure – Хорек лесной**

Lutra lutra Linnaeus, 1758 **– Vidră – Выдра**
Familia **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**





***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **III**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), Lista Operațională, în Anexa II a Convenției de la Berna și Anexa I a CITES.
Răspândirea generală: Eurasia și nord-vestul Africii, cu excepția zonelor de deșert și de tundră. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este prezentă în fluviul Nistru, râul Prut și afluenții lor. A fost semnalată și în alte bazine acvatice din țară. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Tudora-Palanca”.







Martes foina Erxleben, 1777 **– Jder de-piatră – Куница каменная**
Familia **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**








***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecție: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **VIII**). Inclusă în Anexa II a Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: arealul speciei include o mare parte a Eurasiei - de la peninsula Iberică până la Mongolia și munții Himalaia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** tot teritoriul țării. Frecventă în localități și stâncării, de unde îi provine și denumirea - gder de piatră. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele "Cioburciu-Răscăieți", "Copanca-Leuntea", "Lunca Talmaza", "Lunca Olănești-Crocmaz", "Împărăteasa", "Tudora-Palanca".



Martes martes Linnaeus, 1758 **– Jder de-pădure – Куница лесная**
Familia **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Lista Operațională, în Lista roșie a IUCN, Anexa III a Convenției de la Berna, Anexa V a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: Europa, Asia Mică, nordul Irakului și Iranului, Caucaz, Siberia de Vest.
Răspândirea în Republica Moldova: în ecosistemele silvice, preponderent în partea centrală a țării.
Pe teritoriul site-ului se întâlnește în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Copanca-Leuntea”, ”Cioburciu-Răscăieți”. Preferă pădurile bătrâne cu arbori scorburoși.






Meles meles Linnaeus, 1758 **– Bursuc – Барсук**
Familia **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **VIII**), inclusă în Lista Operațională, în Anexa II a Convenției de la Berna.

Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde întreaga Europă (cu excepția regiunilor nordice ale Scandinaviei), Siberia, Asia Centrală, Extremul Orient și China. Cea mai mare parte a Europei și Asia Mică este populată de subspecia *Meles meles meles*. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** populează toate pădurile, preponderent în zona Codrilor. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în comlexele "Cioburciu-Răscăieți", "Copanca-Leuntea", "Lunca Talmaza", "Lunca Olănești-Crocmaz", "Zaozernoe-Nucari". Preferă biotopurile împădurite, cu relief dezmembrat unde își sapă vizuini subterane.








Mustela erminea Linnaeus, 1758 **– Hermelină – Горностай**
Familia **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**




***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), Lista Operațională, în Anexa III a Convenției de la Berna și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspîndirea generală: arealul speciei are o extindere vastă în emisfera de nord a globului, cuprinzând Europa, Asia, America de Nord și Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** populează diverse biotopuri, preponderent luncile palustre riverane, pădurile Codrilor. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”,”Purcari”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”.






Mustela lutreola Linnaeus,1761 **– Nurcă europeană – Норка европейская**
Familia **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**

***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **CR**), Lista Operațională, în Anexa II a Convenției de la Berna.





Răspândirea generală: specie endemică europeană, cu areal care cuprinde nordul Spaniei, sud-vestul Franței, România, Estonia, Lituania, Belarus, Ucraina și partea europeană a Rusiei. În prezent arealul se reduce din cauza destituirii de către nurca americană *Neovison vison*. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se întâlnește sporadic în cursul inferior al Prutului și Nistrului. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Tudora-Palanca”. Este un mamifer adaptat la mediul acvatic.




Mustela nivalis Linnaeus,1766 **– Nevăstuică – Ласка**
Familia **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **VIII**). A fost inclusă în listele Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: specie nativă din Eurasia, America de Nord și Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** populează tot teritoriul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Tudora-Palanca”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Populează toate tipurile de ecosisteme, inclusiv și localități.






Mustela putorius Linnaeus, 1758 **– Dihor de-pădure – Хорек лесной**
Familia **Mustelidae** Fischer-Waldheim, 1817 **– Mustelide – Куньи**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **VIII**). A fost inclusă în Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: arealul speciei se extinde din sudul Europei până în sudul Suediei, centrul Finlandei și peninsula Kola. Spre est - până în nord-estul Rusiei și centrul Ucrainei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** tot teritoriul țării, populează biotopurile în preajma localităților. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”,”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Tudora-Palanca”, ”Împărăteasa”. Preferă ecosistemele silvice de consistență redusă, luncile râurilor și alte biotopuri.







Familia **Myoxidae – Mioxide – Соневые**

1. ***Myoxus glis*** (Linnaeus, 1766) **– Pârș comun – Соня обыкновенная**

Myoxus glis (Linnaeus,1766) **– Pârș comun – Соня обыкновенная**

Familia ***Myoxidae*** **– Mioxide – Соневые**




Statutul**:** specie vulnerabilă –.**VU**

Starea de protecţie: este inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**).

Răspândirea generală: Europa Centrală și de Sud, Asia Mică, Caucazul. Populații izolate au fost înregistrate și în Europa de Est (regiunea fluviului Volga). ***Răspândirea în Republica Moldova:*** populează preponderent pădurile din partea centrală a țării. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost semnalată în complexul ”Tufa-Stânca Talmaza”. Preferă pădurile și livezile bătrâne.






Familia **Soricidae** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**

1. **Crocedura leucodon** Hermann, 1780 – **Chițcan-cu-abdomen-alb** – **Белозубка белобрюхая**
2. **Neomys anomalus** Cabrera, 1907 **– Chițcan-mic-de-apă – Кутора малая**
3. ***Sorex araneus* Linnaeus, 1758** – **Chițcan comun** – **Землеройка обыкновенная**
4. ***Sorex minutus*** Linnaeus, 1758 – **Chițcan mic** – **Бурозубка малая**

Crocedura leucodon Hermann, 1780 – **Chiţcan-cu-abdomen-alb** – **Белозубка белобрюхая**
Familia **Soricidae** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**



***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**).
Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde centrul și sud-estul Europei, sud-vestul Asiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe tot teritoriul, dar în număr mic. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost înregistrată în complexul ”Lunca Talmaza”.






Neomys anomalus Cabrera, 1907 **– Chițcan-mic-de-apă – Кутора малая**
Familia ***Soricidae*** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**

***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: incusă în Cartea Roşie a Republicii Moldova (categoria **EN**).

Răspândirea generală: regiunile de sud ale Europei de Vest și Centrale, se extinde la nord - până la fluviul Rin și Belovejskaia Pușcea, la est - până la regiunile Oriol și Voronej ale Rusiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este o specie obișnuită în luncile umede ale Prutului și Nistrului. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Răscăieți-Olănești”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”. Este un mamifer care trăiește atât în mediul acvatic, cât și în cel terestru. Înnotător și scufundător excelent, de mal se îndepărtează foarte rar. Preferă pâraiele și râurile cu apă curată și lentă.







Sorex araneus Linnaeus, 1758 – Chiţcan comun – Землеройка обыкновенная


Familia **Soricidae** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **VIII**). Inclusă în Anexa II a Convenției de la Berna.

Răspîndirea generală: arealul speciei cuprinde ce-a mai mare parte a Europei de Nord și Siberiei, până la Enisei și lacul Baikal. Spre sud se extinde până la Asia Centrală, Turcia și Palestina. ***Răspîndirea în Republica Moldova:*** pe tot teritoriul țării, în special în habitatele cu păduri insulare din partea de nord și centru. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în toate complexele, prevalând în ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”.








Sorex minutus Linnaeus, 1758 – **Chițcan mic** – **Бурозубка малая**
Familia **Soricidae** G.Fischer, 1817 **– Soricide – Землеройковые**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**). Inclusă în Anexa II a Convenției de la Berna.
Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde aproape întreaga Europă, o parte mare a Asiei. Spre nord se extinde până la peninsula Kola. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pe tot teritoriul țării, în special în habitatele cu păduri umede din lunca Nistrului și Prutului. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ș. a.





Отряд **Microchiroptera** Dobson, 1875 **– Microchiroptera – Рукокрылые**


Familia **Rhinolophidae** Gray, 1825 **– Rinolofide – Подковоносые**

1. ***Rhinolophus hipposideros*** Bechstein, 1800 **– Rinolofid mic – Подковонос малый**

Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 **– Rinolofid mic – Подковонос малый**
Familia **Rhinolophidae** Gray, 1825 **– Rinolofide – Подковоносые**



***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **EN**), în Lista Operațională, în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa IV a Directivei Habitate și Anexa II a Convenției de la Bonn.
Răspândirea generală: Europa de Vest, Caucaz și Asia Mică, până la munții Himalaia, Africa de Nord. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este o specie comună, dar nu abundentă. Mai des se întâlnește de-a lungul văilor riverane, în biotopuri cu stâncării. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost înregistrată în "Lunca Talmaza".






Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

1. ***Eptesicus serotinus*** Schreber, 1774 **– Liliac târziu – Кожан поздний**
2. ***Myotis bechsteinii*** Kuhl,1817 **– Noptar bechstein – Ночница длиноухая**
3. ***Myotis dasycneme*** Boie,1825 **– Noptar de-iaz – Ночница прудовая**
4. ***Myotis daubentonii*** Kuhl,1817 **– Noptar de-apă – Ночница водянная**
5. ***Myotis mystacinus*** Kuhl,1817 **– Noptar-cu-mustăți – Ночница усатая**
6. ***Nyctalus lasiopterus*** Schreber, 1780 **– Nictal gigantic – Вечерница гигантская**
7. ***Nyctalus leisleri*** Kuhl,1817 **– Nictal mic – Вечерница малая**
8. ***Nyctalus noctua*** Schreber, 1774 **– Nictal roșcat – Вечерница рыжая**
9. ***Pipistrellus kuhlii*** Kuhl,1817 **– Pipistrel Kuhli – Нетопырь средиземноморский**
10. ***Pipistrellus nathusii*** Keyserling,1839 **– Pipistrel Natuzi (de-pădure) – Нетопырь лесной**
11. ***Pipistrellus pipistrellus*** Schreber, 1774 **– Pipistrel pitic – Нетопырь карлик**
12. ***Pipistrellus pygmaeus*** Leach,1825 **– Pipistrel mic – Нетопырь малый**
13. ***Plecotus austriacus*** Fischer, 1829 **– Liliac-cu-urechi-mari – Ушан серый**
14. ***Vespertilio murinus*** Linnaeus, 1758 **– Vespertil bicolor comun – Кожан двухцветный**

Eptesicus serotinus Schreber, 1774 **– Liliac târziu – Кожан поздний**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**). A fost inclusă în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: zona temperată a Eurasiei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** specie comună în toată țara. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Populează diverse biocenoze în landșaftul antropizat, formează colonii. Folosește nișele diferitor construcții, peșteri și cariere, unde și iernează.





Myotis bechsteinii Kuhl,1817 **– Noptar bechstein – Ночница длиноухая**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**


***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Lista Operațională, în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: centrul insulei Iberice, centrul și sud-estul Europei, Caucazul și parțial Asia Mică. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** rar întâlnită de-a lungul văilor riverane pe sectoarele cu stâncării. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost semnalată în complexul ”Lunca Talmaza”.







Myotis dasycneme Boie,1825 **– Noptar de-iaz – Ночница прудовая**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**


***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **EN**), în Lista Operațională, în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.


Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde un spațiu geografic îngust - între paralelele 49-63, care se extinde de la nordul Franței, prin Belgia, Olanda, nordul Germaniei și Poloniei, Belarus, partea europeană a Rusiei, Siberia de Vest până la Enisei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** biotopurile riverane ale Prutului și Nistrului. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească” și ”Lunca Talmaza”.












Myotis daubentonii Kuhl,1817 **– Noptar de-apă – Ночница водянная**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Moldovei (categoria **VU**), în Lista Operațională, în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Directiva IV a Habitatelor.

Răspândirea generală: arealul speciei se extinde prin zona temperată a Eurasiei, din Marea Britanie și Franța până la insula Sahalin. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** preponderent centrul și nordul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Grădina Turcească”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”.




Myotis mystacinus Kuhl,1817 **– Noptar-cu-mustăți – Ночница усатая**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexele II și IV ale Directivei Habitate.
Răspândirea generală: centrul și sud-estul Europei, sudul Scandinaviei și Marei Britanie, Maroc, Asia Mică, până la Caucaz. La nord-estul Europei se extinde până la Munții Ural. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** populează tot teritoriul. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în toate complexele, prevalând în ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ș. a. Populează cele mai diverse locuri cu adăposturi naturale sau de origine antropică.








Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 **– Nictal gigantic – Вечерница гигантская**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**



***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **II**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Lista Operațională, în Lista roșie IUNC (categoria **CR**), în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: pădurile de foiase din Europa, Transcaucasia, Crimeea, ajungând spre est până la munții Ural. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** pădurile din Codrii Centrali și nordul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** a fos semnalată numai în complexul ”Lunca Talmaza”. Preferă pădurile cu arbori scorburoși.






Nyctalus leisleri Kuhl,1817 **– Nictal mic – Вечерница малая**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**



***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**). A fost inclusă în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: în Europa arealul speciei se extinde spre nord până la coasta sudică a Mării Baltice și spre vestul Rusiei până la munții Ural, nord-vestul Africii (Maroc și Algeria). Are populații izolate în Transcaucasia și Himalaia. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** zona de stepă și biotopurile forestiere, dar se adaptează și în zonele de parc, sau urbane. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în toate complexele, prevalând în ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi” ș. a. Preferă sectoarele împădurite cu locuri palustre și lacuri.





Nyctalus noctua Schreber, 1774 – **Nictal roșcat – Вечерница рыжая**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 – **Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**




***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**). A fost inclusă în Anexa II a Convențieide la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: pădurile de foiase din Europa, Siberia de Vest, Asia Centrală, Kazahstan, China, Orientul Mijlociu. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** populează tot teritoriul, preponderend pădurile din centrul și nordul țării. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește practic în toate complexele, prevalând în ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Populează pădurile, parcurile și livezile. Poate fi întâlnit și în localități.






Pipistrellus kuhlii Kuhl,1817 **– Pipistrel Kuhli – Нетопырь средиземноморский**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**





***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **VU**), în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde regiunile aride și subaride din perimetrul Mării Mediterane, sud-estul Europei și Caucazul, unele țări din nord-estul Africii, Asiei Centrale și Orientului Mijlociu. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** nu este suficient studiată. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost înregistrată în complexele ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”. Populează terenuri deschise și localitățile.




Pipistrellus nathusii Keyserling,1839 **– Pipistrel Natuzi (de-pădure) – Нетопырь лесной**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

***Statutul*:** specie periclitată – **EN**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **EN**), Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn, Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde Europa Centrală - până la munții Ural, Caucaz și Orientul Mijlociu. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** se întâlnește atât în ecosistemele silvice, cât și în localități. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește aproape în toate complexele, prevalând în ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Împărăteasa”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Preferă lizierile de pădure, luncile riverane și localitățile.








Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 **– Pipistrel pitic – Нетопырь карлик**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. A fost inclusă în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: arealul speciei este destul de vast, se extinde pe cea mai mare parte a Europei (cu excepția Scandinaviei), în sud-vestul Asiei și nord-vestul Africii (Maroc, Algeria, Tunis). ***Răspândirea în Republica Moldova:*** toate raioanele. ***Pe teritoriul site-ului*** se întâlnește în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Purcari” și ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Preferă biotopuri antropogene, unde ocupă diverse nișe din construcții, dar și pădurile seculare, terenuri deschise și cu iarbă, înconjurate de copaci sau arbuști.








Pipistrellus pygmaeus Leach,1825 **– Pipistrel mic – Нетопырь малый**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

***Statutul*:** specie neamenințată – **LC**.

Starea de protecţie: în Republica Moldova nu sunt luate măsuri. A fost inclusă în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.

Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde Europa, Caucaz și Asia Mică, este fragmentat și nu este suficient studiat. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** este slab studiată. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost înregistrată în complexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieți”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Populează lezierile pădurilor și localitățile. Ca adăpost preferă diferite nișe de origine antropică.








Plecotus austriacus Fischer, 1829 **– Liliac-cu-urechi-mari – Ушан серый**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

***Statutul*:** specie vulnerabilă – **VU**.
Starea de protecţie: inclusă în Cartea Roșie Republicii Moldova (categoria **VU**), Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: arealul speciei cuprinde Europa – de la Spania și sudul Angliei până în Balcani și sudul Ucrainei. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** nu este suficient studiată. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost înregistrată în comlexele ”Copanca-Leuntea”, ”Grădina Turcească”, ”Tufa-Stânca Talmaza”, ”Lunca Talmaza”, ”Cioburciu-Răscăieţi”, ”Lunca Olănești-Crocmaz”, ”Zaozernoe-Nucari”, ”Diculi-Cuţa-Maţarinskii”. Este asociată mai mult de pădurile rare, terenuri deschise și semiaride, terenuri antropice.








Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 **– Vespertil bicolor comun – Кожан двухцветный**
Familia **Vespertilionidae** Gray, 1821 **– Vespertilionide – Гладконосые летучие мыши**

***Statutul*:** specie critic periclitată – **CR**.
Starea de protecţie: în Republica Moldova este protejată de stat (categoria **IV**), inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova (categoria **CR**), în Lista Operațională, în Anexa II a Convenției de la Berna, Anexa II a Convenției de la Bonn și Anexa IV a Directivei Habitate.
Răspândirea generală: regiunile subtropicale și temperate ale Eurasiei (partea centrală și sud-estică a Europei, sud-estul Asiei, partea sudică a Siberiei, Mongolia - până la Extremul Orient și China. ***Răspândirea în Republica Moldova:*** a fost depistat într-un loc din zona centrală. ***Pe teritoriul site-ului*** a fost înregistrată în complexul ”Purcari”.







Index alfabetic al denumirilor plantelor în limba latină

Acer campestre L. ……..... 19
Acer tataricum L. 19
Achillea coarctata Poir. ……..... 23, 24, 40, **41**
Achillea ochroleuca Ehrh. ……..... 23, 40, **42**
Achillea setacea Waldst. et Kit. ……..... 16
Adonis vernalis L. ……..… 14, 15, 16, 23, 24, 25, 144, **145**
Aegopodium podagraria L. 20
Agropyron pectinatum (M.Bieb.) Beauv. 15, 16
Agrostis stolonifera L. 20
Alisma gramineum Lej. …..……..... 22, 26, **27**
Alisma loeselii Gorski ……..... **27**
Alismataceae Vent. ……..... **26, 27**
Alliaceae J.Agardh ……..... **28, 29**
Allium paniculatum L. ……..... 28, **29**
Alopecurus pratensis L. 17
Amaryllidaceae J.St.-Hil. …..……..…..... **30, 31**
Amaryllis colchiciflora (Waldst. et Kit.) Ker-Gawl. ……..... **31**
Amoria vesiculosa (Savi) Roskov **89**
Amygdalus nana L. …….. 23, 150, **151**
Andropogon gryllus L. **132**
Anemone montana Hoppe **146**
Anemone pulsatilla L. var. *ucrainica* Ugr. **147**
Apiaceae Juss. ……..... **32, 33**
Araceae Juss. ……..... **34, 35**
Artemisia austriaca Jacq. 15, 16
Artemisia santonica L. 11
Arum orientale M.Bieb. ……..... 24, 34, **35**
Asparagaceae Juss. ……..... **36, 37, 38, 39**
Asparagus officinalis L. ……..... 23, 36, **37**
Asparagus tenuifolius Lam. ……..... 23, 24, 36, **38**
Asparagus verticillatus L. ……..... 23, 36, **39**
Asteraceae Dumort. ……..... **40,41, 52, 43, 44, 45, 46, 47, 48**
Astragalus albidus Waldst. et Kit. ……..... 23, 79, **80**
Astragalus austriacus Jacq. 15, 16
Astragalus dasyanthus Pall. ……..... 23, 24, 79, **81**
Astragalus excapus L. ……..... 24, 79, **82**
Astragalus onobrychis L. 15, 16
Astragalus ponticus Pall. ……..... 24, 79, **83**
Astragalus vesicarius auct., non L. **80**
Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch ……... 13
Bellevalia sarmatica (Georgi) Woronow …..... 23, 24, 94, **95**
Berberidaceae Juss. ……..... **49, 50**
Berberis vulgaris L. ……..... 49, **50**
Bidens radiata Thuill. 13
Bidens tripartita L. 13
Boraginaceae Juss. ……..... **51, 52**
Brachyactis ciliata (Ledeb.) Ledeb. 11
Brassicaceae Burnett ……..... **53**
Campanulaceae Juss. ……..... **56, 57**
Campanula persicifolia L. ……..... 24, 56, **57**
Camphorosma annua Pall. 11
Carex acutiformis Ehrh. 18, 20
Carex hirta L. 17
Carex caryophyllea Latourr. ……..... 67, **68**

Carex otrubae Podp. 17
Carex pseudocyperus L. 67, **69**
Carex riparia Curt. 20
Carex rhizina Blytt ex Lindb. 23, 24, 67, **70**
Carex sylvatica Huds. 18
Caryophyllaceae Juss. **58, 59, 60**
Castalia minoriflora Simonk. **124**
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. 121, **122**
Celastraceae R.Br. **61, 62**
Centaurea marschalliana Spreng. 14
Centaurea trinervia Steph. 15, 16
Cerastium glutinosum Fries 23, 58, **59**
Cerastium ucrainicum Pacz. ex Klokov **59**
Chamaecytisus lindemannii (V.Krecz.) Klásková 79, **84**
Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. 24, 79, **85**
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková 23, 79, **86**
Chenopodium rubrum L. 13
Chrysopogon gryllus (L.) Trin. 23, 24, 131, **132**
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 18
Clematis recta L. 14
Colchicum ancyrense B.L.Burtt 117
Colchicum biebersteinii Rouy 117
Colchicum triphyllum G.Kunze 23, 24, 116, **117**
Convallaria bifolia L. **64**
Convallariaceae Horan. **63, 64**
Convolvulaceae Juss. **65, 66**
Convolvulus lineatus L. 23, 24, 65, **66**
Cotinus coggygria Scop. 19
Crambe tataria Sebeok 15, 23, 24, 25, 53, **54**
Crataegus monogyna Jacq. 19
Crataegus torminalis L. **156**
Crocus reticulatus Stev. ex Adams 15, 16, 23, 24, 105, **106**
Crocus variegatus Hoppe et Hornsch. **106**
Cyperaceae Juss. **67**
Cyperus fuscus L. 13
Cyperus glaber L. 13
Cyperus glomeratus L. 23, 67, **71**
Cyperus michelianus (L.) Link. **72**
Cyperus michelianus (L.) Link. **72**
Cyperus serotinus Rottb. **75**
Cytisus lindemannii V.Krecz. **84**
Cytisus rochelii Wierzb. **85**
Cytisus ruthenicus Fisch. ex Wołoszcz. **86**
Dianthus capitatus Balb. ex DC. 58, **60**
Dichostylis micheliana (L.) Nees 13, 25, 67, **72**
Elatinaceae Dumort. **77, 78**
Elatine hydropiper L. 24, 77, **78**
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. 13, 22, 67, **73**
Eleocharis euuniglumis Zinserl. **74**
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 22, 67, **74**
Elytrigia repens (L.) Nevski 17, 20
Erodium ciconium (L.) L`Her. 23, 90, **91**
Erodium ruthenicum M.Bieb. 90, **92**
Erodium serotinum Stev. **92**
Euonymus nanus M.Bieb. 23, 24, 61, **62**
Euonymus verrucosa Scop. 19
Euphorbia seguieriana Neck. 14

Fabaceae Lindl. …..... **79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89**
Festuca pratensis Huds. 17
Festuca pseudovina Hack. ex Wiesb. 11
Festuca valesiaca Gaudin 14, 15, 16
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 18
Frangula alnus Mill. 20
Fraxinus excelsior L. 18, 19
Geraniaceae Juss. ……..... **90, 91, 92, 93**
Geranium cyconium L. **91**
Geranium palustre L. ……..... 22, 90, **93**
Geranium sylvaticum L. 18
Goniolimon besserianum (Schult.) Kusn. ……..…
……..... 15, 16, 23, 128, **129**
Gnaphalium arenarium L. ……..... **43**
Gratiola officinalis L. ……..…….... 22, 161, **162**
Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Don fil. ……..... 157, **158**
Helichrysum arenarium (L.) Moench 15, 16, 23, 24, 40, **43**
Hieracium glaucescens Bess. ……..…….. **46**
Humulus lupulus L. 20
Hyacinthaceae Batsch …..... **94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101**
Hyacinthella leucophaea (C.Koch) Schur ……. 23, 24, 94, **96**
Hyacinthus sarmatica Pall. ex Georgi **95**
Hydrocharis morsus-ranae L. ……..... 102, **103**
Hydrocharitaceae Juss. ……..…..... **102, 103, 104**
Inula ensifolia L. 16
Inula helenium L. ……..……..…..... 24, 40, **44**
Inula hirta L. 16
Iridaceae Juss. ……..... **105, 106, 107, 108, 109**
Iris aphylla L. ……...…….....….. 24, 105, **107**
Iris aequiloba Ledeb. **108**
Iris aphylla L. ……..…….....… 24, 105, **107**
Iris hungarica Waldst. et Kit. **105, 107**
Iris pumila L. ……..... 15, 16, 23, 105, **108**
Iris variegata L. ……..... 16, 23, 105, **109**
Juncellus serotinus (Rottb.) Glarke ……..... 67, **75**
Juncus gerardii Loisel. 10, 11
Jurinea multiflora (L.) B.Fedtsch. 16
Koeleria cristata (L.) Pers. 15, 16
Lathyrus aphaca L. ……..……..... 79, **87**
Lemna polyrrhiza L. .....
111
Lemnaceae S.F.Gray ……..……..……. **110, 111**
Lentibulariaceae Rich ……..… **112, 113**
Leopoldia tenuiflora (Tausch) Heldr. ……..……..... 22, 94, **97**
Lepidium latifolium L. 11
Ligustrum vulgare L. 19
Limnanthemum peltatum S.G.Gmel. **120**
Limonium gmelinii (Willd.) O.Kuntze **130**
Limonium hypanicum Klokov ……...…….... 128, **130**
Linaceae DC. ex S.F.Gray ……..……... **114, 115**
Linum nervosum Waldst. et Kit. ……...……..... 114, **115**
Listera ovata (L.) R.Br. ……...……...… 23, 24, 125, **126**
Lolium perenne L. 17
Lunaria annua L. ……..……..... 23, 53, **55**
Lycopus europaeus L. 18

Lysimachia nummularia L. 18
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt ……..… 23, 63, **64**
Marsilea natans L. **160**
Medicago rigidula (L.) All. ……...… 23, 79, **88**
Medicago polymorpha L. var. *rigidula* L. **88**
Melanthiaceae Batsch ……..…….. **116, 117, 118**
Menyanthaceae Dumort. …… **119, 120**
Menyanthes nymphoides L. **120**
Muscari leucophaea C.Koch ……..…….. **96**
Muscari tenuiflorum Tausch **97**
Myogalum boucheanum Kunth **98**
Najadaceae Juss. ……..…….. **121, 122**
Najas minor All. **122**
Nepeta parviflora M.Bieb. 16
Nymphaea alba L. ……...…...12, 23, 24, 123, **124**
Nymphaea minoriflora (Simonk.) Wissjul. **124**
Nymphaeaceae Salisb ……..... **123, 124**
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze .12,23,24,119, **120**
Onobrychis arenaria (Kit.) DC. 16
Ophrys ovata L. **126**
Orchidaceae Juss. ……..……. **125, 126, 127**
Orchis chlorantha Cust. **127**
Ornithogalum boucheanum (Kunth) Aschers. .. 23, 24, 94, **98**
Ornithogalum divergens Boreau ….…….…… 22, 94, **99**
Ornithogalum kochii Parl. ....……..…… 24, 94, **100**
Ornithogalum refractum Schlecht. ….. 15, 16, 23, 24, 94, **101**
Ornithogalum tenuifolium Guss. **100**
Persicaria hydropiper (L.) Spach 13
Persicaria lapathifolia (L.) S.F.Gray 13, 18
Petasites hybridus (L.) Gaertn., Mey. et Scherb. 23, 24, 40, **45**
Phleum pratense L. 17
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 17, 20
Pilosella glaucescens (Bess.) Sojak ….……..…… 22, 40, **46**
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. ….. 23, 24, 25, 125, **127**
Plumbaginaceae Juss. …….. **128, 129, 130**
Poa angustifolia L. 15, 16
Poa pratensis L. 17, 20
Poa trivialis L. 17
Poaceae Barnhart ….... **131, 132, 133, 134, 135, 136, 137**
Podospermum molle (M.Bieb.) Fisch. et Mey. ……...…… **47**
Populus alba L. 20
Populus nigra L. 18, 20
Potamogeton berchtoldii Fieb. ……... 22, 138, **139**
Potamogeton compressus L. ……..…….. 25, 138, **140**
Potamogeton gramineus L. ……..…….. 138, **141**
Potamogeton heterophyllus Schreb. …..……..... **141**
Potamogeton lucens L. …..…… 138, **142**
Potamogeton natans L. ……...…… 138, **143**
Potamogeton pusillus auct., non L. **139**
Potamogeton zosterifolius Schumacher **140**
Potamogetonaceae Dumort. ……..… **138, 139, 140, 141, 142, 143**
Potentilla astracanica Jacq. ……...……..... 23, 150, **152**
Potentilla supina L. 13
Prunus spinosa L. 19
Prunus tenella Batsch **151**
Pseudolysimachion euxinum (Turrill) Holub **163**
Puccinellia distans (Jacq.) Parl. 10
Puccinellia gigantea (Grossh.) Grossh. 10
Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb. …...…..... 23, 24, 144, **146**
Pulsatilla nigricans Störk **147**

Pulsatilla ucrainica (Ugr.) Wissjul. …….. 24, 144, **147**
Pyrethrum odessanum Klokov ……...…… **48**
Pyrus elaeagnifolia Pall. ……. 23, 25, 150, **153**
Quercus pubescens Willd. 19
Quercus robur L. 19
Ranunculaceae Juss. …..…… **144, 145, 146, 147**
Reseda inodora Reichenb. …….. 148, **149**
Resedaceae S.F.Gray ……..… **148, 149**
Rosa micrantha Borrer ex Smith ……..… 22, 150, **154**
Rosa pimpinellifolia auct. non L. **155**
Rosa tschatyrdagi Chrshan. …….. 22, 150, **155**
Rosaceae Juss. ……. **150, 151, 152, 153, 154, 155, 156**
Rubus caesius L. 18, 20
Rumex sanguineus L. 20
Ruta suaveolens DC. **158**
Rutaceae Juss. …… **157, 158**
Sagittaria sagittifolia L. 12
Salix alba L. 18, 20
Salix cinerea L. 20
Salix fragilis L. 18, 20
Salvia nutans L. 15, 16
Salvia pratensis L. 14, 16
Salvinia natans (L.) All. ……... 23, 24, 25, 159, **160**
Salviniaceae Dumort. ……..……..… **159, 160**
Sambucus nigra L. 20
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla …….. **76**
Scirpus acicularis L. …… **73**
Scirpus triqueter L. ……..…… 23, 67, **76**
Scirpus uniglumis Link …… **74**
Scorzonera mollis M.Bieb. ……...… 23, 24, 40, **47**
Scrophulariaceae Juss. ……..... **161, 162, 163**
Seseli tortuosum L. ……...……...… 23, 24, 32, **33**
Sorbus domestica L. 19
Sorbus torminalis (L.) Crantz ……..... 23, 24, 150, **156**
Spirodela polyrhyza (L.) Schleid. ……...… 22, 110, **111**
Statice besseriana Schult. **129**
Statice gmelinii Willd. **130**
Stellaria media (L.) Vill. 18
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. 23, 24, 25, 30, **31**
Stipa capillata L. 14, 15, 16
Stipa lessingiana Trin. et Rupr. ……..... 15, 16, 23, 24, 131, **133**
Stipa longifolia Borb. **136**
Stipa pennata L. ……..... 14, 23, 24, 131, **134**
Stipa pulcherrima C.Koch ……..... 14, 23, 24, 131, **135**
Stipa stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv. **136**
Stipa tirsa Stev. ……...…….. 23, 24, 131, **136**
Stipa ucrainica P.Smirn. ……... 15, 16, 23, 24, 131, **137**
Stratiotes aloides L. 12
Suaeda prostrata Pall. 11
Swida sanguinea (L.) Opiz 20
Symphytum orientale L. …….. **52**
Symphytum tauricum Willd. 24, 51, **52**
Tamaricaceae Link ……... **164, 165**
Tamarix ramosissima Ledeb. ……..……. 164, **165**
Tanacetum odessanum (Klokov) Tzvel. ……..…..… 22, 40, **48**
Thymus marschallianus Willd. 15, 16
Trapa natans L. ……..…….. 12, 23, 24, 25, 166, **167**
Trapaceae Dumort. ……..……. **166, 167**
Trifolium turgidum M.Bieb. **89**
Trifolium vesiculosum Savi ……..…….. 24, 79, **89**

Tussilago hybrida L. …… **45**
Typha laxmannii Lepech. ……..…….. 23, 168, **169**
Typhaceae Juss. ……..…… **168, 169**
Ulmus glabra Huds. 18
Urtica dioica L. 18
Utricularia vulgaris L. ……..……... 23, 112, **113**
Valeriana locusta L. γ. *coronata* L. **171**
Valerianaceae Batsch …..……... **170, 171**
Valerianella coronata (L.) DC. …...…….. 170, **171**
Vallisneria spiralis L. ……...……..... 23, 102, **104**
Vallisneria spiralis L. ……..……..... 23, 102**, 104**
Verbascum phoeniceum L. 16
Veratrum nigrum L. ……...……... 23, 24, 116, **118**
Veronica euxina Turrill ……..…… 25, 161, **163**
Veronica gryniana Klokov **163**
Viburnaceae Juss. ……..……...… **172, 173**
Viburnum opulus L. …..…… 20, 23, 172, **173**
Vitaceae Juss. ……...……..… **174, 175**
Vitis sylvestris C.C.Gmel. …….. 20, 23, 174, **175**

Index alfabetic al denumirilor plantelor în limba română

Aliacee **28**
Alismatacee **26**
Alunele comprimate 40, **41**
Alunele palid-galbene 40, **42**
Amarilidacee **30, 31**
Apărătoare Beser 128, **129**
Apiacee **32, 33**
Aracee **34, 35**
Aron oriental 34, **35**
Asparagacee **36, 37, 38, 39**
Asteracee **40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48**
Belevalie sarmaţiană 94, **95**
Berberidacee **49, 50**
Boraginacee **51, 52**
Brănduşă trifilă 116, **117**
Brasicacee **53, 54, 55**
Broscăriţă Berhtold 138, **139**
Broscăriţă graminee 138, **141**
Broscăriţă lucioasă 138, **142**
Broscăriţă natantă 138, **143**
Broscăriţă turtită 138, **140**
Buhăiaş ovat 125, **126**
Burdujă comună 112, **113**
Campanulacee **56, 57**
Captalan 40, **45**
Cariofilacee **58, 59, 60**
Caulinie minoră 121, **122**
Călin comun 172, **173**
Cănăriţă glutinoasă 58, **59**
Ceapă paniculată 28, **29**
Celastracee **61, 62**
Celnuşă divergentă 94, **99**
Celnuşă Koch 94, **100**
Celnuşă 94, **98**
Celnuşă răsfrântă 94, **101**
Ciperacee **67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76**
Ciufă glomerată 67, **71**
Clopoţel persicifoliu 56, **57**
Convalariacee **63, 64**
Convolvulacee **65, 66**
Cornaci natant 166, **167**
Coşaci acaul 79, **82**
Coşaci alburiu 79, **80**
Coşaci pontic 79, **83**
Dediţel montan 144, **146**
Dediţel ucrainean 144, **147**
Dihostil Micheli 67, **72**
Dracilă comună 49, **50**
Drob Lindeman 79, **84**
Drob Roşel 79, **85**
Drob rusesc 79, **86**
Elatinacee **77, 78**

Fabacee ……..... **79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89**
Fetică coronată …… 170, **171**
Gălbinele …….. 157, **158**
Garofiţă capitată ……..…… 58, **60**
Geraniacee ……... **90, 91, 92, 93**
Geraniu palustru ……..... 90, **93**
Ghiocel-de-toamnă …….. 30, **31**
Hiacintacee ……..…… **94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101**
Hidrocaritacee ……..… **102, 103, 104**
Hodolean tătăresc …… 53, **54**
Iarba broaştelor …… 102, **103**
Iarbă mare …… 40, **44**
In multinervat ……..… 114, **115**
Iridacee …… **105, 106, 107, 108, 109**
Juncel tardiv ……..... 67, **75**
Lăptiucă moale …… 40, **47**
Lemnacee …… **110, 111**
Lentibulariacee …… **112, 113**
Leopoldie tenuifloră ……..... 94, **97**
Limbariţă graminee …… 26, **27**
Linacee …… **114, 115**
Lintiţă poliriză ……. 110, **111**
Lopăţea anuală ……..…… 53, **55**
Lucernă rigidiusculă …… 79, **88**
Măceş micrant …….. 150, **154**
Măceş-de-Ciatârdag ……..…… 150, **155**
Măzăroi afil ……..... 79, **87**
Melantiacee …….. **116, 117, 118**
Meniantacee ……..……..... **119, 120**
Migdal pitic ……...……. 150, **151**
Naiadacee ……... **121, 122**
Negară frumoasă …… 131, **135**
Negară Lesing ……..... 131, **133**
Negară penată …… 131, **134**
Negară piramidală ……..... 131, **136**
Negară ucraineană ……..... 131, **137**
Nimfă albă ……..... 123, **124**
Nimfeacee ……..... **123, 124**
Orhidacee ……... **125, 126, 127**
Papură Laxman ……. 168, **169**
Păr eleagnifoliu …….. 150, **153**
Peştişoară natantă ……... 159, **160**
Piperul apei ……..... 77, **78**
Pipiriguţ acicular ……..... 67, **73**
Pipiriguţ uniglum ……..... 67, **74**
Pliscul berzei …….. 90, **91**
Plumbaginacee ……... **128, 129, 130**
Plutică peltată ……..… 119, **120**
Poacee ……..……. **131, 132, 133, 134, 135, 136, 137**
Potamogetonacee ……... **138, 139, 140, 141, 142, 143**
Priboi rusesc ……... 90, **92**
Ranunculacee ……. **144, 145, 146, 147**
Rechie nemirositoare ……...….. 148, **149**
Resedacee ……...… **148, 149**
Rogoz cariofiloid ……..... 67, **68**
Rogoz pseudociperoid ……... 67, **69**

Rogoz rizineu …… 67, **70**
Rosacee …… **150, 151, 152, 153, 154, 155, 156**
Ruşcuţă vernală …… 144, **145**
Rutacee …… **157, 158**
Sadină …… 131, **132**
Salviniacee …… **159, 160**
Sârmuliţă spiralată …… 102, **104**
Scrântitoare astrachanică …… 150, **152**
Scrofulariacee ……… **161, 162, 163**
Sică hipanică …… 128, **130**
Siminoc arenicol …… 40, **43**
Sorb …… 150, **156**
Sparanghel medicinal …… 36, **37**
Sparanghel verticilat …… 36, **39**
Stânjenel scund …… 105, **108**
Stânjenel unghresc …… 105, **107**
Stânjenel vărgat …… 105, **109**
Strigoaie neagră …… 116, **118**
Stupiniţă verzuie …… 125, **127**
Şofrănel reticulat …… 105, **106**
Tamaricacee …… **164, 165**
Tamariscă rămuroasă …… 164, **165**
Tătănească de-Crimeea …… 51, **52**
Tifacee …… **168, 169**
Trapacee …… **166, 167**
Trfoi veziculos …… 79, **89**
Ţipirig trigonal …… 67, **76**
Umbra iepurelui …… 36, **38**
Umbrăvioară bifolie …… 63, **64**
Valerianacee …… **170, 171**
Veninariţă medicinală …… 161, **162**
Veronică euxină …… 161, **163**
Vetrice-de-Odesa …… 40, **48**
Viburnacee …… **172, 173**
Viţă sălbatică …… 174, **175**
Vitacee …… **174, 175**
Volbură liniată …… 65, **66**
Vonicer pitic …… 61, **62**
Vulturiţă glaucescentă …… 40, **46**
Zambilă albicioasă …… 94, **96**
Zăvăcustă …… 79, **81**
Zmeoae şerpuitoare …… 32, **33**

Index alfabetic al denumirilor plantelor în limba rusă

Авран лекарственный ……..... 161, **162**
Адонис весенний ……..... 144, **145**
Аистник аистовый ……..... 90, **91**
Аистник русский ……..... 90, **92**
Амариллисовые ……..... **30, 31**
Ароидные ……..... **34, 35**
Аронник восточный …… 34, **35**
Астрагал беловатый ……..... 79, **80**
Астрагал бесстебельный ……..... 79, **82**
Астрагал понтийский ……. 79, **83**
Астрагал шерстистоцветковый …….. 79, **81**
Астровые ……..... **40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48**
Барбарис обыкновенный …… 49, **50**
Барбарисовые ……..... **49, 50**
Безвременник трехлистный ……116, **117**
Белокопытник гибридный …….. 40, **45**
Бельвалия сарматская ……..... 94, **95**
Бересклет карликовый ……..... 61, **62**
Бересклетовые ……. **61, 62**
Бобовые ……..... **79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89**
Болотница игольчатая ……... 67, **73**
Болотница одночешуйная …….. 67, **74**
Болотноцветник щитолистный …….. 119, **120**
Бурачниковые ……..... **51, 52**
Валерианелла увенчанная …….. 170, **171**
Валериановые …….. **170, 171**
Валлиснерия спиральная ……..... 102, **104**
Вахтовые ……... **119, 120**
Вероника Гриня ……..... 161, **163**
Виноград лесной ……..... 174, **175**
Виноградовые ……..... **174, 175**
Водокрас обыкновенный ……..... 102, **103**
Водокрасовые …… **102, 103, 104**
Вьюнок линейчатый ……..... 65, **66**
Вьюнковые ……..... **65, 66**
Гвоздика головчатая ……..... 58, **60**
Гвоздиковые ……..... **58, 59, 60**
Герань болотная ……..... 90, **93**
Гераниевые …… **90, 91, 92, 93**
Гиацинтик светло-голубой ……..... 94, **96**
Гиацинтовые ……..... **94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101**
Гребенщик многоветвистый ……... 164, **165**
Гребенщиковые …… **164, 165**
Груша лохолистная ……... 150, **153**
Девясил высокий …….. 40, **44**
Дихостилис Микели ……..... 67, **72**
Жабрица извилистая ……..... 32, **33**
Злаки ……... **131, 132, 133, 134, 135, 136, 137**
Золотобородник цикадовый …… 131, **132**
Зонтичные ……..... **32, 33**
Ирисовые ……... **105, 106, 107, 108, 109**
Калина обыкновенная ……... 172, **173**

Калиновые **172, 173**
Камыш трехгранный 67, **76**
Капустные **53, 54, 55**
Касатик венгерский 105, **107**
Касатик карликовый 105, **108**
Касатик пестрый 105, **109**
Катран татарский 53, **54**
Каулиния малая 121, **122**
Кермек южнобугский 128, **130**
Клевер пузырчатый 79, **89**
Ковыль красивейший 131, **135**
Ковыль Лессинга 131, **133**
Ковыль перистый 131, **134**
Ковыль узколистный 131, **136**
Ковыль украинский 131, **137**
Козелец мягкий 40, **47**
Колокольчик персиколистный 56, **57**
Колокольчиковые **56, 57**
Кувшинка белая 123, **124**
Кувшинковые **123, 124**
Ландышевые **63**
Лапчатка астраханская 150, **152**
Лен жилковатый 114, **115**
Леопольдия тонкоцветковая 94, **97**
Лук метельчатый 28, **29**
Луковые **28, 29**
Лунник однолетний 53, **55**
Льновые **114, 115**
Любка зеленоцветковая 125, **127**
Лютиковые **144, 145, 146, 147**
Люцерна жестковатая 79, **88**
Майник двулистный 63, **64**
Мелантиевые **116, 117, 118**
Миндаль низкий 150, **151**
Многокоренник обыкновенный 110, **111**
Наядовые **121, 122**
Норичниковые **161, 162, 163**
Окопник крымский 51, **52**
Орхидные **125, 126, 127**
Осока гвоздиковая 67, **68**
Осока корневищная 67, **70**
Осока ложносытевая 67, **69**
Осоковые **67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76**
Пижма одесская 40, **48**
Повойничек водяной перец 77, **78**
Повойничковые **77, 78**
Прострел горный 144, **146**
Прострел украинский 144, **147**
Птицемлечник Буше 94, **98**
Птицемлечник Коха 94, **100**
Птицемлечник преломленный 94, **101**
Птицемлечник расходящийся 94, **99**
Пузырчатка обыкновенная 112, **113**
Пузырчатковые **112, 113**

Ракитник Линдемана ……..... 79, **84**
Ракитник Рошеля ……..... 79, **85**
Ракитник русский ……..... 79, **86**
Рдест Берхтольда ……..... 138, **139**
Рдест блестящий ……..... 138, **142**
Рдест злаковый ……..... 138, **141**
Рдест плавающий …….. 138, **143**
Рдест сплюснутый ……..... 138, **140**
Рдестовые ……...… **138, 139, 140, 141, 142, 143**
Резеда непахучая ……..... 148, **149**
Резедовые ……..... **148, 149**
Рогоз Лаксмана ……..... 168, **169**
Рогозовые ……..... **168, 169**
Рогульник плавающий ……..... 166, **167**
Рогульниковые ……..... **166, 167**
Роза мелкоцветковая ……..... 150, **154**
Роза чатырдагская ……..... 150, **155**
Розовые ……... **150, 151, 152, 153, 154, 155, 156**
Рутовые ……..... **157**
Рябина глоговина ……..... 150, **156**
Ясковые ……...../.. **110, 111**
Сальвиниевые ……..... **159, 160**
Сальвиния плавающая ……..…… 159, **160**
Свинчатковые …….. **128, 139, 130**
Ситничек поздний ……67, **75**
Спаржа лекарственная …… 36, **37**
Спаржа мутовчатая ……..36, **38**
Спаржа тонколистная ……..… 36, **39**
Спаржевые ……..... **36, 37, 38, 39**
Сыть скученная ……...… 67, **71**
Тайник яйцевидный ……...…… 125, **126**
Тысячелистник бледножелтый …….. 40, **42**
Тысячелистник сжатый …….. 40, **41**
Углостебельник Бессера ……..…… 128, **129**
Цельнолистник душистый ……..… 157, **158**
Цмин песчаный ……..... 40, **43**
Частуха злаковидная ……..…….... 26, **27**
Частуховые ……..... **26, 27**
Чемерица черная …….. 116, **118**
Чилим ……...…… 166, **167**
Чина безлисточковая ……...… 79, **87**
Шафран сетчатый ……...……..... 105, **106**
Штернбергия зимовникоцветная ……..……..... 30, **31**
Ясколка клейкая …….. 58, **59**
Ястребиночка сизоватая …… 40, **46**

Index alfabetic al denumirilor animalelor în limba latină

Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) ….…… 373, **374**
Accipiter brevipes (Severtzov, 1850) …. 282, 283, 284, 285, **286**
Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 285, **287**
Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) …..……...… 282, 285, **288**
Accipitridae (Vieillot, 1816) ……..……..… **285-302**
Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) .....….. 183, 184, 242, **243**
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) ……. 475, **476**
Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) ……..……. 475, **477**
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) ….…... 475, **478**
Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) …..…..… 475, **479**
Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) …….. 444, **445**
Aegithalidae Reichenbach, 1850 ……..…… **303, 304**
Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) …….…... 282, 303, **304**
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) ……..... 182, 184, 222, **223**
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) ……..…….. 305, **306**
Alaudidae Vigors, 1825 ……...……..……... **305, 306, 307**
Alcedinidae Rafinesque, 1815 ……..…… **308, 309**
Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 308, **309**
Ameles descolor (Charpentier, 1825) …… 183, 184, 220, **221**
Amphibia Linnaeus, 1758 ……...……..…..……. **249**
Anas acuta (Linnaeus, 1758) ……. 310, **311**
Anas clypeata (Linnaeus, 1758) …..……. 310, **312**
Anas crecca (Linnaeus, 1758) ……..…… 310, **313**
Anas penelope (Linnaeus, 1758) ……...…… 310, **314**
Anas plathyrhynchos (Linnaeus, 1758) ……..…….. 310, **315**
Anas querquedula (Linnaeus, 1758) ……...….. 310, **316**
Anas strepera (Linnaeus, 1758) …… 283, 284, 310, **317**
Anatidae Vigors, 1825 ……..... **310-331**
Anax imperator (Leach, 1815) ……...….....… 183, 184, 210, **211**
Animalia Linnaeus, 1758 ……..……..... **176**
Anser albifrons (Scopoli, 1769) ……..……..… 310, **318**
Anser anser (Linnaeus, 1758) ……..……... 310, **319**
Anser erythropus (Linnaeus, 1758) ...…….... 282, 283, 284, 310, **320**
Anser fabalis (Lath, 1787) ……...……..… 310, **321**
Anthus campestris (Linnaeus. 1758) ……..... 395, **396**
Anthus pratensis (Linnaeus. 1758) ..……..... 282, 395, **397**
Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) ……...……..... 395, **398**
Apatura iris (Linnaeus, 1758) ……...…… 183, 184, 222, **224**
Apatura metis (Freyer, 1829) …..……..… 183, 184, 185, 222, **225**
Apidae Latreille, 1802 ..…...……..… **186, 187, 188, 189**
Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 283, 284, 285, **289**
Aquila clanga (Pallas, 1811) ……..... 282, 283, 284, 285, **290**
Aquila pomarina (Ch.L. Brehm, 1831) 282, 283, 284, 285, **291**
Ardea alba (Linnaeus, 1758) ……...… 282, 283, 332, **333**
Ardea purpurea (Linnaeus, 1766) …..……..... 282, 283, 332, **334**
Ardeidae Leach, 1820 …….. **332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339**
Ardeola ralloides (Scopoli, 1769) ….....… 282, 283, 284, 332, **335**
Argynnis aglaja Linnaeus, 1758 ……..…….. 182, 184, 222, **226**
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) ...…..... 282, 283, 284, 467, **468**
Asio otus (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 467, **469**
Athene noctua (Scopoli, 1769) ……...……..... 282, 467, **470**
Aves Linnaeus, 1758 ……..... **280**

Aythya ferina (Linnaeus, 1758) ……..…..... 282, 310, **322**
Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) ……...……. 310, **323**
Aythya marila (Linnaeus, 1761) ……..……...… 310, **324**
Aythya nyroca (Guldenstadt, 1770) …. 282, 283, 284, 310, **325**
Bombina bombina Linnaeus, 1761 ……..…….. 251, 255, **256**
Bombus argillaceus (Scopoli, 1763) ……... 183, 184, 186, **187**
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) ..……. 183, 184, 186, **188**
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) …...… 282, 283, 332, **336**
Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) 283, 284, 310, **326**
Bufo bufo Linnaeus, 1758 ……...… 251, 252, **253**
Bufo viridis Laurenti, 1786 …….. 251, 252, **254**
Bufonidae J.E.Gray, 1825 …… **252, 253, 254**
Buteo buteo (Linnaeus, 1758) ……...…….. 283, 285, **292**
Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) …...……… 283, 285, **293**
Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827) …..... 283, 284, 285, **294**
Calidris alpina (Linnaeus, 1758) ……. 444, **446**
Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) …...… 282, 444, **447**
Calidris minuta (Leisl. 1812) ……...……... 444, **448**
Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) ……... 184, 204, **205**
Caprimulgidae Vigors, 1825 ……..…... **339, 340**
Caprimulgus europaeus (Linnaeus, 1758) …..… 282, 339, **340**
Carabidae Latreille, 1802 ……..... **191 ,192, 193, 194**
Carabus clathratus Linnaeus, 1761 ..…….. 183, 184, 191, **192**
Carabus ullrichii (Germar, 1824) …… 183, 184, 191, **193**
Carabus variolosus (Fabricius, 1787) …..... 183, 184, 191, **194**
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) …...…….. 281, 373, **375**
Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) ……..……..… 184,204, **206**
Cerambycidae Latreille, 1802 ……..…….. **195, 196, 197**
Cerambyx cerdo (Linnaeus, 1758) …...…… 183, 184, 185, 195, **196**
Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) ……..… 341, **342**
Certhiidae Leach, 1820 ……..……..…... **341, 342**
Cetoniidae Leach, 1815 ……..……..... **198, 199**
Charadriidae (Vigors, 1825) ……..……. **343, 344, 345**
Charadrius dubius (Scopoli, 1786) ……...…….... 343, **344**
Chlidonias hybridus (Pallas, 1811) …...……..... 463, **464**
Chlidonias niger (Linnaeus. 1758) …...……...…. 463, **465**
Chloris chloris (Linnaeus, 1758) ……...… 373, **376**
Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) ……...…….. 282, 283, 346, **347**
Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) ……..…..… 282, 283, 284, 346, **348**
Ciconiidae Gray, 1840 ……...……...…. **346, 347, 348**
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) …...…..... 282, 283, 284, 285, **295**
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) …...……..... 282, 285, **296**
Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) …….. 282, 283, 284, 285, **297**
Circus pygargus (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 283, 284, 285, **298**
Clitellata Michaelsen, 1919 ……..…… **177**
Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) …...……. 373, **377**
Coenagrionidae Kirby, 1890 ……..……..…….... **200, 201**
Colias chrysotheme (Esper, 1781) ...……..… 183, 184, 185, 233, **234**
Coluber caspius Linnaeus, 1758 ……...…… 268, 269, **270**
Colubridae Oppel, 1811 ……... **269, 270, 271, 272, 273, 273**
Columba oenas (Linnaeus. 1758) ……..... 282, 283, 284, 349, **350**
Columba palumbus (Linnaeus, 1758) …...……..... 282, 349, **351**
Columbidae (Illiger, 1811) ……... **349, 350, 351, 352, 353**
Coracias garrulus (Linnaeus, 1758) …...….. 282, 283, 284, 354, **355**
Coraciidae Vigors, 1825 ……..……..... **354, 355**
Coronella austriaca Laurenti, 1768 ……...……... 268, 269, **271**

Corvidae Vigors, 1825 …... **356, 357, 358, 359, 360, 361, 362**
Corvus corax (Linnaeus, 1758) ……..…… 282, 356, **357**
Corvus cornix (Linnaeus, 1758) ……..…….. 281, 356, **358**
Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758) ……..…… 281, 356, **359**
Corvus monedula (Linnaeus, 1758) …… 356, **360**
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) …..…… 419, **420**
Crex crex (Linnaeus, 1758) ……..… 282, 283, 432, **433**
Cricetidae Fischer-Waldheim, 1817 ……... **517, 518**
Cricetus cricetus Pallas, 1773 ……. 515, 516, 517, **518**
Crocedura leucodon Hermann, 1780 ……..... 515, 536, **537**
Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) …..……. 282, 283, 310, **327**
Cygnus olor (Gmelin, 1789) ……..…… 282, 283, 310, **328**
Delichon urbica (Linnaeus, 1758) ……..…….. 381, **382**
Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) …..……..… 423, **424**
Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) ….....… 283, 423, **425**
Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) …..……. 423, **426**
Dendrocopos syriacus (Hemprich et Ehrenberg) ….... 423, **427**
Discoglossidae Fitzinger, 1843 ……..… **255, 256**
Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) ……... 332, **337**
Elaphe quatuorlineata Lacepede, 1789 …..….... 268, 269, **272**
Elater ferrugineus (Linnaeus, 1758) ……. 183, 202, **203**
Elateridae Leach, 1815 ……..…..……..… **202, 203**
Emberiza citrinella (Linnaeus, 1758) ...……..… 363, **364**
Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 …..…….... 363, **365**
Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) …..…….. 363, **366**
Emberizidae Vigors, 1831 ……..... **363, 364, 365, 366**
Emydidae Rafinesque, 1815 ……..…..... **275, 275, 276**
Emys orbicularis Linnaeus, 1758 ……...… 268, 275, **276**
Eptesicus serotinus Schreber, 1774 ……..... 515, 544, **545**
Erebidae Leach, 1815 …..……...…. **204, 205, 206, 207**
Erinaceidae G.Fischer, 1814 …… **519, 520**
Erinaceus europeus Barret-Hamilton, 1900 ……..... 515, 519, **520**
Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) ……... 497, **498**
Erythromma lindenii (Sélys, 1840) …..……. 183, 184, 200, **201**
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) ….. 183, 184, 185, 204, **207**
Falco cherrug (I.E. Gray, 1834) ……..... 282, 283, 284, 367, **368**
Falco peregrinus (Tunstal, 1771) ……..... 282, 283, 284, 367, **369**
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758) …..……..... 282, 367, **370**
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758) ……..……..... 283, 367, **371**
Falco vespertinus (Linnaeus, 1766) ...……..… 282, 283, 367, **372**
Falconidae Vigors, 1824 ……... **367, 368, 369, 370, 371, 372**
Felidae Fischer-Waldheim, 1817 ……... **521, 522**
Felis silvestris Schreber, 1777 ……..... 515, 516, 521, **522**
Ficedula albicollis (Temminck, 1815) ……..……... 401, **402**
Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) ……..……..... 283, 401, **403**
Ficedula parva (Bechstein, 1794) ……..……..... 401, **404**
Formica rufa Linnaeus, 1761 ……..…..…….... 184, 185, 208, **209**
Formicidae Latreille, 1802 ……..……..……..... **208, 209**
Fringillidae Leach, 1820 ……..…..... **373, 374, 375, 376, 377, 378**
Fulica atra (Linnaeus, 1758) …… 432, **434**
Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) ……... 444, **449**
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) …..……432, **435**
Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) ……..…..……... 356, **361**
Gavia arctica (Linnaeus, 1758) …… 379, **380**
Gaviidae Forster, 1788 ……..……..…..... **379, 380**
Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 283, 284, 285, **299**

Hamearis lucina Linnaeus, 1758 …… 183, 184, 235, **236**
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) .. 282,283, 284, 285, **300**
Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758) .. 283,284,440, **441**
Hippolais icterina (Vieillot, 1817) ……..…… 475, **480**
Hirudinidae Whitman, 1886 ……..……..….. **179, 180**
Hirudo medicinalis (Linnaeus, 1758) ……....…… 179, **180**
Hirundinidae Vigors, 1825 ……..…..… **381, 382, 383, 384**
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758) ……..…..…… 381, **383**
Hyla arborea Linnaeus, 1758 …….. 251, 257, **258**
Hylidae Rafinesque, 1815 …….. **257, 258**
Insecta (Linnaeus, 1758) ……....…….. **181**
Iphiclides podalirius Linnaeus, 1758 …..… 183, 184, 228, **229**
Jynx torquilla (Linnaeus, 1758) ……..…… 423, **428**
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 ……. 268, 277, **278**
Lacerta viridis Linnaeus, 1758 …… 268, 277, **279**
Lacertidae Bonoparte, 1831 ……..……..… **277, 278, 279**
Laniidae Rafinesque, 1815 ……...….. **358, 359, 360, 361**
Lanius collurio (Linnaeus, 1758) ……..…… 281, 385, **386**
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758) …..…….. 284, 385, **387**
Lanius minor (Gmelin, 1788) ……...……..… 385, **388**
Laridae Vigors, 1825 …….…….... **389, 390, 391, 392**
Larus cachinnans Pallas, 1811 …….....…..... 389, **390**
Larus canus (Linnaeus, 1758) ……...…. 389, **391**
Larus ridibundus (Linnaeus, 1766) ……...……. 389, **392**
Leurorrhinia pectoralis Charpentier, 1825 .. 183, 185,210, **212**
Libellulidae Rambur, 1842 ……. **210, 211, 212**
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) ……. 282, 283, 444, **450**
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810) ……..… 475, **481**
Locustella luscinioides (Savi, 1824) ……...…….. 475, **482**
Locustella naevia (Boddaert, 1783) ……..…… 475, **483**
Lucanidae Latreille, 1804 ……..……..…… **218, 219**
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) ……..... 183, 184, 185, 218, **219**
Lullula arborea (Linnaeus, 1758) ……. 305, **307**
Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) …….. 497, **499**
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) ……...… 283, 497, **500**
Lutra lutra Linnaeus, 1758 ……..... 515, 516, 525, **526**
Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758) …..…..… 183, 185, 213, **214**
Lycaenidae Leach, 1815 ……..... **213, 214, 215, 216, 217**
Lymnocryptes minimus (Brunnich, 1764) ...……..... 444, **451**
Maculinea arion (Linnaeus, 1758) …..……. 183, 184, 185, 213, **215**
Mammalia Linnaeus, 1758 ……..……..... **513**
Mantidae Burmeister, 1838 ……..…….…..... **220, 221**
Martes foina Erxleben, 1777 ……..... 515, 525, **527**
Martes martes Linnaeus, 1758 ……..... 515, 525, **528**
Megascolia maculata (Drury, 1773) ……..…… 183, 184, 239, **240**
Meles meles Linnaeus, 1758 ……..... 515, 525, **529**
Meropidae Rafinesque, 1815 ……..……..….. **393, 394**
Merops apiaster Linnaeus, 1758 …….. 281, 393, **394**
Microchiroptera Dobson, 1875 ……..…..... **541**
Micromys minutus Pallas, 1771 ……..... 515, 523, **524**
Milvus migrans (Boddaert, 1783) ...……..... 282, 283, 284, 285, **301**
Morimus asper funereus (Mulsant, 1862) 183, 184, 185, 195, **197**
Motacilla alba (Linnaeus, 1758) …….. 395, **399**
Motacilla flava (Linnaeus, 1758) …….. 395, **400**
Motacillidae Horsfield, 1821 ……..….. **395, 396, 397, 698, 699, 400**
Muridae Illiger, 1811 ……..……. **523, 524**

Muscicapa striata (Pallas, 1764) ……..... 401, **405**
Muscicapidae Vigors, 1825 …..……. **401, 402, 403, 404, 405**
Mustela erminea Linnaeus, 1758 …… 515, 525, **530**
Mustela lutreola Linnaeus, 1761 …… 515, 516, 525, **531**
Mustela nivalis Linnaeus, 1766 …….. 515, 525, **532**
Mustela putorius Linnaeus, 1758 …..…… 515, 525, **533**
Myotis bechsteinii Kuhl, 1817 …… 515, 516, 544, **546**
Myotis dasycneme Boie, 1825 …… 515, 516, 544, **547**
Myotis daubentonii Kuhl, 1817 ……..... 515, 544, **548**
Myotis mystacinus Kuhl, 1817 ……..... 515, 544, **549**
Myoxidae ……..... **534, 535**
Myoxus glis (Linnaeus, 1766) ……..... 515, 534, **535**
Natrix tessellata Laurenti, 1768 ……..…… 268, 269, **273**
Neomys anomalus Cabrera, 1907 ……... 515, 536, **538**
Neozephyrus quercus (Linnaeus, 1758) …. 182, 184, 213, **216**
Neptis sappho (Pallas, 1771) ……... 183, 184, 185, 222, **227**
Numenius arquata (Linnaeus, 1758) .. 282, 283, 284, 444, **452**
Nyctalus lasiopterus Schreber, 1780 ……... 515, 516, 544, **550**
Nyctalus leisleri Kuhl, 1817 ……..... 515, 544, **551**
Nyctalus noctua Schreber, 1774 ……..... 515, 544, **552**
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) ……. 332, **338**
Nymphalidae Rafinesque, 1815 … **222, 223,224, 225,226,227**
Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) …… 497, **501**
Onconotus servillei (Fischer von Waldheim, 1846) .....
.....…..….....…… 183, 185, 246, **247**
Oriolidae (Vigors, 1825) ……..……..……..… **406, 407**
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) …… 406, **407**
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) ..…… 183, 184, 237, **238**
Otus scops (Linnaeus, 1758) …..……..... 282, 283, 284, 467, **471**
Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) ...…….. 282, 283, 284, 408, **409**
Pandionidae (Bonoparte, 1854) ……..……..….. **408, 409**
Panuridae Des Murs, 1860 ..... **410, 411**
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) ……..... 282, 410, **411**
Papilio machaon (Linnaeus, 1758) ……..….... 183, 184, 228, **230**
Papilionidae Latreille, 1802 ……..…… **228, 229, 230, 231, 232**
Paridae Vigors, 1825 ……..……..……... **412, 413, 414**
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) … 183, 184, 185, 228, **231**
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758) ...…… 412, **413**
Parus major (Linnaeus, 1758) …..……..... 281, 412, **414**
Pelecanidae Rafinesque, 1815 ……..……..……. **415, 416**
Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758) 282, 283, 284, 415, **416**
Pelobates fuscus Laurenti, 1768 ……..…… 251, 259, **260**
Pelobatidae Bonoparte, 1850 …..……..…..… **259, 260**
Perdix perdix (Linnaeus, 1758) ……. 419, **421**
Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) ...…….. 282, 283, 285, **302**
Phalacrocorocidae Reichenbach, 1849 ..…….. **417, 418**
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas, 1773) 282, 283, 284, 417, **418**
Phasianidae Horsfield, 1821 ……..……..…… **419, 420, 421, 422**
Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) …..…….....… 283, 419, **422**
Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) …..…….…… 444, **453**
Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774) ……..…… 497, **502**
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) …… 497, **503**
Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) ……..…475, **484**
Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) ……..... 475, **485**
Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) ……..… 475, **486**
Pica pica (Linnaeus, 1758) …… 356, **362**

Picus canus Gmelin, 1788 ……..…… 423, **429**
Pieridae Duponchel, 1835 ……..……..…. **233, 234**
Picidae Vigors, 1825 .....… **423, 424, 425, 426, 427, 428, 429**
Pipistrellus kuhlii Kuhl, 1817 ……..... 515, 544, **553**
Pipistrellus nathusii Keyserling, 1839 ……... 515, 544, **554**
Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774 …….. 544, **555**
Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825 …… 544, **556**
Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) . 282, 283, 284, 492, **493**
Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) ….....
.....… 183, 184, 185, 213, **217**
Plecotus austriacus Fischer, 1829 ……..... 515, 544, **557**
Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766) . 282, 283, 284, 492, **494**
Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) ……..……... 282, 430, **431**
Podicipedidae Bonoparte, 1831 ……....…..... **430, 431**
Porzana parva (Scopoli, 1769) ……... 283, 432, **436**
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) ……..... 283, 432, **437**
Porzana pusilla (Pallas, 1776) ...……....… 283, 432, **438**
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) .....
..... 183, 184, 185, 242, **244**
Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767) ….. 183, 184, 198, **199**
Rallidae Bonoparte, 1831 ……..…… **432-439**
Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758) ……..…… 432, **439**
Rana dalmatina Bonaparte, 1840 …...…… 251, 261, **262**
Ranidae Rafinesque, 1814 ……...…..…. **261, 262**
Recurvirostridae (Bonoparte, 1854) ……..…..…..... **440, 441**
Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) ……...…… 283, 442, **443**
Remizidae Olphe-Galliard, 1891 ……....…..... **442, 443**
Reptilia Laurenti, 1768 ……...……..……..... **266**
Rhinolophidae Gray, 1825 ……....… **542, 543**
Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 ..... 515, 516, 542, **543**
Riodinidae Grote, 1895 …...……....… **235, 236**
Riparia riparia (Linnaeus, 1758) ……....… 283, 381, **384**
Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) …...…... 282, 283, 284, 310, **329**
Saga pedo (Pallas, 1771) ……..……..…… 246, **248**
Salamandridae Goldfuss, 1820 ……..……..……. **263, 264, 265**
Saturnia pyri (Denis et Schiffermüller, 1775) ….. 183, 184, 242, **245**
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) ……....… 497, **504**
Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) …….. 497, **505**
Scarabaeidae Latreille, 1802 ……..……..….....… **237, 238**
Scolia hirta (Schrank, 1781) ……..…… 183, 184, 239, **241**
Scoliidae Latreille, 1802 ……..…….. **239, 240, 241**
Scolopacidae Vigors, 1825 ……...……..…….....… **444**
Scolopax rusticola (Linnaeus, 1758) ...……..... 444, **454**
Sitta europaea (Linnaeus, 1758) ……..... 461, **462**
Sittidae Lesson, 1828 ……...……..……..... **461, 462**
Sorex araneus Linnaeus, 1758 ……..... 515, 536, **539**
Sorex minutus Linnaeus, 1758 ……..... 515, 536, **540**
Soricidae G.Fischer, 1817 ……..... **536, 537, 538, 539, 540**
Sphingidae Latreille, 1802 ……...……..….... **242, 243, 244, 245**
Spinus spinus (Linnaeus, 1758) …..…….. 373, **378**
Sterna hirundo (Linnaeus, 1758) …...……...… 463, **466**
Sternidae Bonoparte, 1838 ……..……..... **463, 464, 465, 466**
Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) ……..... 349, **352**
Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) ...……..…… 282, 349, **353**
Strigidae (Vigors, 1825) ……..... **467, 468, 469, 470, 471, 472**
Strix aluco (Linnaeus, 1758) ...……..… 283, 467, **472**
Sturnidae (Rafinesque, 1815) ……..……....… **473, 474**
Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 …...…….....… 281, 473, **474**

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) ……. 281, 475, **487**
Sylvia borin (Boddaert, 1783) ……..… 475, **488**
Sylvia communis (Latham, 1787) …….. 475, **489**
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) ……..…… 475, **490**
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795) ……. 475, **491**
Sylviidae Vigors, 1825 ……...…… **475-491**
Tadorna ferruginea (Pallas, 1764) …. 282, 283, 284, 310, **330**
Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758) ……. 282, 283, 310, **331**
Tettigoniidae Krauss, 1902 ……..…….. **246, 247, 248**
Treskiornithidae (Richmond, 1917) ……...… **492, 493, 494**
Tringa erythropus (Pallas, 1764) ……...……..…… 444, **455**
Tringa glareola (Linnaeus, 1758) ……...…… 444, **456**
Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) ……....… 444, **457**
Tringa ochropus (Linnaeus, 1758) …...…….. 444, **458**
Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803) ……... 284, 444, **459**
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) ……...……..… 444, **460**
Triturus cristatus Laurenti, 1786 …...……..… 251, 263, **264**
Triturus vulgaris Laurenti, 1786 ……. 251, 263, **265**
Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) ……. 495, **496**
Trogloditidae Swainson, 1832 ……..……..… **495, 496**
Turdidae (Rafinesque, 1815) ……..... **497**
Turdus iliacus (Linnaeus, 1766) …… 282, 497, **506**
Turdus merula (Linnaeus, 1758) ……... 281, 497, **507**
Turdus philomelos (Brehm, 1831) ……....… 281, 497, **508**
Turdus pilaris (Linnaeus, 1758) ……..... 497, **509**
Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 ……. 497, **510**
Upupa epops Linnaeus, 1758 ……..... 283, 511, **512**
Upupidae Leach, 1820 ……...……...… **511, 512**
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) …...……..... 282, 343, **345**
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 ……..... 515, 544, **558**
Vespertilionidae Gray, 1821 ……..……..... **544**
Xylocopa valga Gerstäcker, 1872 ……...… 183, 184, 186, **189**
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) ……...….. 183, 184, 186, **190**
Zamenis longissimus Laurenti, 1768 ……...……..... 268, 269, **274**
Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller, 1775)
….....……… 183, 184, 185, 228, **232**

Index alfabetic al denumirilor animalelor în limba română

Anatide ……..……..…… **310-331**
Animale ……..…… **176**
Accipitride ……..... **285-302**
Acvilă de-munte ……..…… 285, **289**
Acvilă pitică …… 285, **300**
Acvilă ţipătoare mare …….. 285, **290**
Acvilă ţipătoare mică ……... 285, **291**
Aegitalide …… **303, 304**
Alaudide …….. **305, 306, 307**
Albăstrița argintie …… 213, **217**
Albăstrița cimbrișorului ……... 213, **215**
Albăstrița măcrișului ……...…… 213, **214**
Albină valgă ……..... 186, **189**
Albină violetă ……..… 186, **190**
Alcedinide ……... **308, 309**
Amfibieni …… **249**
Anatide …… **310**
Arctiidă-Hera ……..…… 204, **207**
Ardeide ……..... **332, 333, 334, 335, 336, 337, 338**
Arici comun ……. 519, **520**
Barză albă …… 346, **347**
Barză neagră …… 346, **348**
Bătăuș …….. 444, **453**
Becațină comună ……. 444, **449**
Becațină mică …….. 444, **451**
Boicuș …….. 442, **443**
Bondar de-argilă ……..… 186, **187**
Bondar roșiatic ……..……..… 186, **188**
Botgros ……..... 373, **377**
Broasca țestoasă de-apă ……..….. 275, **276**
Broasca brună de-câmp ……..... 259, **260**
Broască râioasă sură ……..... 252, **253**
Broască râioasă verde ……..……..... 252, **254**
Broască roșie de-pădure ……..... 261, **262**
Brotăcel ……..... 257, **258**
Bufonide ……... **252, 253, 254**
Buhai de-baltă ……..... 332, **336**
Buratic ……..... 257, **258**
Bursuc ……..... 525, **529**
Cal de-stepă ……..... 246, **248**
Calimorfă dominula ……..... 204, **205**
Capântortură ……...……..... 423, **428**
Caprimulg ……..... 339, **340**
Caprimulgide ……... **339, 340**
Carabidă clatratus ……..…… 191, **192**
Carabidă vario ……..... 191, **194**
Carabida-lui-Ulrih ……..... 191, **193**
Carabide ……...… **191, 192, 193, 194**
Catocala zmeurului …….. 204, **206**
Călifar alb ……..... 310, **331**
Călifar roșu ……..... 310, **330**
Călugărița incoloră ……..... 220, **221**
Cânepar ……..... 373, **374**
Cârstel de-baltă ……..... 432, **439**

Cerambicide ……..…… **195, 196, 197**
Certiide …… **341, 342**
Cetoniide ……..... **198, 199**
Cetonischemă aeruginosa ……..... 198, **199**
Charadriide …….. **343, 344, 345**
Chiră de-baltă …….. 463, **466**
Chirighiţă-cu-obraji-albi …….. 463, **464**
Chirighiţă neagră ……. 463, **465**
Chițcan comun …… 536, **539**
Chițcan-cu-abdomen-alb …….. 536, **537**
Chițcan mic …….. 536, **540**
Chițcan-mic-de-apă ……. 536, **538**
Ciconiide …….. **346, 347, 348**
Cioară de-semănătură …….. 356, **359**
Cioară grivă …… 356, **358**
Ciocănitoare de-grădini ……... 423, **427**
Ciocănitoare de-stejar …….. 423, **425**
Ciocănitoare pestriță mare ……... 423, **424**
Ciocănitoare pestriță mică ……..…… 423, **426**
Ciocârlie de-câmp …… 305, **306**
Ciocârlie de-pădure ……. 305, **307**
Ciuf de-câmp ……... 467, **468**
Ciuf de-pădure ……. 467, **469**
Ciuf pitic …….. 467, **471**
Cocoșar …… 497, **509**
Codalb ……. 285, **299**
Codița albastră de-stejar …….. 213, **216**
Codobatură albă ……... 395, **399**
Codobatură galbenă ……... 395, **400**
Codroș de-munte ……..... 497, **502**
Codroș de-pădure ……... 497, **503**
Coenagrionide ……..…….. **200, 201**
Cojoaică de-pădure …… 341, **342**
Colubride ……..... **269, 270, 271, 272, 273, 274**
Columbide ……..... **349, 350, 351, 352, 353**
Coraciide ……..... **354, 355**
Corb ……... 356, **357**
Corcodel mic ……..…. 430, **431**
Cormoran mic ……..... 417, **418**
Corvide ……**6, 357, 358, 359, 360, 361, 362**
Cosașul-lui-Servillei …….. 246, **247**
Coțofană …….. 356, **362**
Cresteţ cenuşiu ……..... 432, **436**
Cresteţ mic …….. 432, **438**
Cresteț pestriț ……. 432, **437**
Cricetide ……..... **517, 518**
Cristel de-câmp …….. 432, **433**
Croitor cenușiu …….. 195, **197**
Croitor-mare-al-stejarului ……..…….. 195, **196**
Cucuvea …….. 467, **470**
Cufundar polar ……... 379, **380**
Culic mare …….. 444, **452**
Dihor de-pădure …….. 525, **533**
Discogloside ……..…. **255, 256**
Dumbrăveancă ……... 354, **355**
Egretă mare …… 332, **333**

Egretă mică 332, **337**
Elateride **202, 203**
Emberizide **363, 364, 365, 366**
Emidide **275, 276**
Erebide **204, 205, 206, 207**
Erete de-stuf 285, **296**
Erete sur 285, **298**
Erete vânăt 285, **297**
Erinaceide **519, 520**
Falacrocorocide **417, 418**
Falconide **367, 368, 369, 370, 371, 372**
Fasianide **419, 420, 421, 422**
Fazan 419, **422**
Fâsă de-câmp 395, **396**
Fâsă de-luncă 395, **397**
Fâsă de-pădure 395, **398**
Felide **521, 522**
Florinte 373, **376**
Fluierar-cu-picioare-roşii 444, **460**
Fluierar-cu-picioare-verzi 444, **457**
Fluierar de-lac 444, **459**
Fluierar de-mlaștină 444, **456**
Fluierar de-munte 444, **445**
Fluierar de-zăvoi 444, **458**
Fluierar negru 444, **455**
Fluture Aglaia 222, **226**
Fluture-Apolon-negru 228, **231**
Fluture-cap-de-mort 242, **243**
Fluture-cu-irizații 222, **224**
Fluture Mahaon 228, **230**
Fluture metis 222, **225**
Fluture pestriț de-pădure 235, **236**
Fluture pestriț sapfo 222, **227**
Fluture podalir 228, **229**
Fluture polixena 228, **232**
Formicide **208, 209**
Fringilide **373, 374, 375, 376, 377, 378**
Frunzăriță galbenă 475, **480**
Fugaci de-ţărm 444, **446**
Fugaci mic 444, **448**
Fugaci roşcat 444, **447**
Furnica roșie 208, **209**
Gaie neagră 285, **301**
Gaiță 356, **361**
Gaviide **379, 380**
Găinușă de-baltă 432, **435**
Gălbioară aurie 233, **234**
Gândac-rinocer 237, **238**
Gârliță mare 310, **318**
Gârliţă mică 310, **320**
Gâscă-cu-gât-roșu 310, **329**
Gâscă de-semănătură 310, **321**
Gâscă de-vară 310, **319**
Ghionoaie sură 423, **429**

Grangur ……..… 406, **407**
Graur ……. 473, **474**
Greluşel de-stuf ……...…… 475, **482**
Greluşel de-zăvoi …….. 475, **481**
Greluşel pătat …… 475, **483**
Guguștiuc ……..... 349, **352**
Gușă vânătă …….. 497, **500**
Hârciog ……. 517, **518**
Hermelină ……. 525, **530**
Hilide …… **257, 258**
Hirudinidee ……..... **179, 180**
Hirundinide ……... **381, 382, 383, 384**
Huhurez de-pădure ……...…… 467, **472**
Insecte ……...… **181**
Izvoraş-cu-abdomen-roşu ……..… 255, **256**
Jder de-pădure …….. 525, **528**
Jder de-piatră …… 525, **527**
Lacertide ……... **277, 278, 279**
Laniide …….. **385, 386, 387, 388**
Laride ……..... **389, 390, 391, 392**
Lăcar de-mlaştină …… 475, **477**
Lăcar de-stuf …… 475, **479**
Lăcar mare ……..... 475, **476**
Lăcar mic …….. 475, **478**
Lăstun de-casă …….. 381, **382**
Lăstun de-mal ……..……..... 381, **384**
Lebădă de-iarnă ……..... 310, **327**
Lebădă de-vară ……..... 310, **328**
Libelulide …….……..... **210, 211, 212**
Libelulă de-baltă ……....… 210, **212**
Libelulă imperială ……..... 210, **211**
Libelula-lui-Linden ……..... 200, **201**
Licenide ……..…… **213, 214, 215, 216, 217**
Liliac-cu-urechi-mari ……..... 544, **557**
Liliac târziu …… 544, **545**
Lipitoarea medicinală ……..... 179, **180**
Lipitori ……..…. **177**
Lișiță ……..... 432, **434**
Lopătar ……..... 492, **493**
Lucanide ……..... **218, 219**
Mamifere ……..... **513**
Mantide ……..… **220, 221**
Măcăleandru ……..…… 497, **498**
Mărăcinar mare ……... 497, **504**
Mărăcinar negru ……..... 497, **505**
Meropide ……..... **393, 394**
Microchiroptera ……..... **541**
Mierlă ……..... 497, **507**
Mioxide ……..... **534, 535**
Motacilide ……..… **395, 396, 397, 398, 399, 400**
Muride ……..... **523, 524**
Muscar gulerat ……..…… 401, **402**

Muscar mic 401, **404**
Muscar negru 401, **403**
Muscar sur 401, **405**
Muscicapide **401, 402, 403, 404, 405**
Mustelide **525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533**
Nagâț 343, **345**
Nevăstuică 525, **535**
Nictal gigantic 544, **550**
Nictal mic 544, **551**
Nictal roșcat 544, **552**
Nimfalide **222, 223, 224, 225, 226, 227**
Noptar Bechstein 544, **546**
Noptar-cu-mustăți 544, **549**
Noptar de-apă 544, **548**
Noptar de-iaz 544, **547**
Nurcă europeană 525, **531**
Ochi-de-păun-mare 242, **245**
Oriolide **406, 407**
Pandionide **408, 409**
Panuride **410, 411**
Papilionide **228, 229, 230, 231, 232**
Paride **412, 413, 414**
Pănțăruș 495, **496**
Păsări **280**
Pârș comun 534, **535**
Pelecanide **415, 416**
Pelican comun 415, **416**
Pelobatide **259, 260**
Pescăraș albastru 308, **309**
Pescăruș pontic 389, **390**
Pescăruș râzător 389, **392**
Pescăruș sur 389, **391**
Picide **423, 424, 425, 426, 427, 428, 429**
Piciorong 440, **441**
Pieride **233, 234**
Pietrar sur 497, **501**
Pipistrel de-pădure 544, **554**
Pipistrel Kuhli 544, **553**
Pipistrel mic 544, **556**
Pipistrel Natuzi 544, **554**
Pipistrel pitic 544, **555**
Pisica sălbatică 521, **522**
Pitulice fluierătoare 475, **486**
Pitulice mică 475, **484**
Pitulice sfârâitoare 475, **485**
Pițigoi albastru 412, **413**
Pițigoi codat 303, **304**
Pițigoi de-stuf 410, **411**
Pițigoi mare 412, **414**
Pocnitor roșcat 202, **203**
Podicipedide **430, 431**
Porumbac proserpin 242, **244**

Porumbel de-scorbură ……..…… 349, **350**
Porumbel gulerat …….. 349, **351**
Potârniche …….. 419, **421**
Prepeliță …… 419, **420**
Presură de-grădini ……. 363, **365**
Presură de-stuf …….. 363, **366**
Presură galbenă ……..... 363, **364**
Prigorie …… 393, **394**
Privighetoare de-zăvoi …….. 497, **499**
Prundăraș gulerat mic ……... 343, **344**
Pupăză …….. 511, **512**
Ralide ….....… **432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439**
Ranide ……... **261, 262**
Rață câraitoare ……..…… 310, **316**
Rață-cu-cap-castaniu …… 310, **322**
Rață-cu-cap-negru …… 310, **324**
Rață fluierătoare ……... 310, **314**
Rață lingurar ……. 310, **312**
Rață mare …….. 310, **315**
Rață mică …….. 310, **113**
Rață moțată ……... 310, **323**
Rață pestriță …….. 310, **317**
Rață roșie …….. 310, **325**
Rață sulițar …… 310, **311**
Rață sunătoare ……..... 310, **326**
Rădașcă ……..… 218, **219**
Rândunică ……..…… 381, **383**
Recurvirostride ……..... **440, 441**
Remizide ……..... **442, 443**
Reptile ……..... **266**
Rinolofid mic ……..... 542, **543**
Rinolofide ……..... **542, 543**
Riodinide ……..... **235, 236**
Salamandride ……..... **263, 264, 265**
Scarabeide ……..... **237, 238**
Scatiu …….. 373, **378**
Scoliide ……..… **239, 240, 241**
Scolopacide ……..... **444**
Sfingide ……..…… **242, 243, 244, 245**
Sfrâncioc-cu-fruntea-neagră ……... 385, **388**
Sfrâncioc mare ……..... 385, **387**
Sfrâncioc roșiatic ……..... 385, **386**
Silvie-cu-cap-negru ……..... 475, **487**
Silvie de-câmp ……..... 475, **489**
Silvie de-zăvoi ……..... 475, **488**
Silvie mică …….. 475, **490**
Silvie porumbacă ……..... 475, **491**
Silviide ……..... **491-475**
Sitar de-mal ……..... 444, **450**
Sitar de-pădure ……..... 444, **454**
Sitide ……...……..... **461, 462**
Soricide ……..... **536, 537, 538, 539, 540**

Stăncuță …… 356, **360**
Stârc de-noapte …….... 332, **338**
Stârc galben …….. 332, **335**
Stârc roşu ……. 332, **334**
Sternide ……..... **463, 464, 465, 466**
Sticlete …….. 373, **375**
Strigide ……..... **467, 468, 469, 470, 471, 472**
Sturnide …… **473, 474**
Sturz cântător ……... 497, **508**
Sturz de-vâsc …… 497, **510**
Sturz de-vii ……... 497, **506**
Şarpe-cu-abdomen-galben ……..... 269, **270**
Şarpe-cu-patru-dungi ……..……. 269, **272**
Şarpe-de-alun ……...…… 269, **271**
Şarpe-de-apă ……..... 269, **273**
Şarpele-lui-Esculap ……..…….. 269, **274**
Şerpar ……..…….. 285, **295**
Şoarece pitic ……. 523, **524**
Şoim călător ……. 367, **369**
Şoim dunărean ……. 367, **368**
Şoimul rândunelelor …… 367, **370**
Şorecar comun ……. 285, **292**
Şorecar încălțat …… 285, **293**
Şorecar roșu ……..…… 285, **294**
Şopârla ageră …… 277, **278**
Şopârla cenuşie ……..……..……. 277, **278**
Şopârla verde ……..…… 277, **279**
Tettigoniide ……..…… **246, 247, 248**
Tresciornitide ……..... **492, 493, 494**
Triton comun ……..... 263, **265**
Triton crestat ……..... 263, **264**
Trogloditide ……..... **495, 496**
Turdide ……..... **497-510**
Turturică ……..... 349, **353**
Ţiclean ……..... 461, **462**
Ţigănuş ……..... 492, **494**
Uligan pescar ……... 408, **409**
Uliu-cu-picioare-scurte ……..... 285, **286**
Uliu păsărar ……..... 285, **288**
Uliu porumbar ……..... 285, **287**
Upupide ……..... **511, 512**
Urzicar ……..... 222, **223**
Vânturel de-seară ……..... 367, **372**
Vânturel roșu ……..... 367, **371**
Vespertil bicolor comun ……..... 544, **558**
Vespertilionide ……..... **544**
Vidră ……..... 525, **526**
Viespar ……..... 285, **302**
Viespe gigant ……..... 239, **240**
Viespe stepică ……..... 239, **241**

Index alfabetic al denumirilor animalelor în limba rusă

Аист белый ……..…… 346, **347**
Аист черный …….. 346, **348**
Аистовые …… **346, 347, 348**
Американские пресноводные черепахи ……..… **275, 276**
Баклан малый …… 417, **418**
Баклановые …… **417, 418**
Балобан ……...…… 367, **368**
Барсук ……. 525, **529**
Бекас …… 444, **449**
Бекасовые ……... **444**
Белобровик ……. 497, **506**
Белозубка белобрюхая ……. 536, **537**
Белянки ……...… **233, 234**
Беркут ……. 285, **289**
Богомол бесцветный …… 220, **221**
Большой дубовый усач ……..…… 195, **196**
Большой ночной павлиний глаз ……... 242, **245**
Бражник мертвая голова ……..… 242, **243**
Бражник прозерпина …… 242, **244**
Бражники ……... **242, 243, 244, 245**
Бронзовка гладкая ……..…… 198, **199**
Бронзовки ……...… **198, 199**
Бурозубка малая ……..… 536, **540**
Вальдшнеп ……..…… 444, **454**
Варакушка …….. 497, **500**
Веретенник большой …… 444, **450**
Вертишейка …….. 423, **428**
Вечерница гигантская ……. 544, **550**
Вечерница малая …….. 544, **551**
Вечерница рыжая ……... 544, **552**
Водные беспозвоночные (зообентос) ……... **177**
Ворон …….. 356, **357**
Ворона серая ……... 356, **358**
Врановые ……..…… **356, 357, 358, 359, 360, 361, 362**
Выдра ……..... 525, **526**
Выпь большая …….. 332, **336**
Вьюрковые ……..... **373, 374, 375, 376, 377, 378**
Вяхирь ……..… 349, **351**
Гагара чернозобая ……... 379, **380**
Гагары ……...…..... **379, 380**
Галка ……..... 356, **360**
Гаршнеп ……..... 444, **451**
Гладконосые летучие мыши ……..... **544**
Гоголь ……..... 310, **326**
Голубиные ……..... **349, 350, 351, 352, 353**
Голубянка аргирогномон ……..... 213, **217**
Голубянка арион ……....… 213, **215**
Голубянки ……..… **213, 214, 215, 216, 217**
Горихвостка обыкновенная ……..... 497, **503**
Горихвостка-чернушка ……... 497, **502**
Горлица кольчатая ……... 349, **352**
Горлица обыкновенная ……...… 349, **353**

Горностай 525, **530**
Грач 356, **359**
Гуменник 310, **321**
Гусь серый 310, **319**
Длиннохвостые синицы **303, 304**
Дозорщик-император 210, **211**
Дрозд певчий 497, **508**
Дрозд черный 497, **507**
Дрозд-деряба 497, **510**
Дроздовые **497**
Дрозд-рябинник 497, **509**
Дубонос 373, **377**
Дыбка степная 246, **248**
Дятел большой пестрый 423, **424**
Дятел малый пестрый 423, **426**
Дятел пестрый средний 423, **425**
Дятел седой 426, **429**
Дятел сирийский 423, **427**
Дятловые **423, 424, 425, 426, 427, 428, 429**
Еж обыкновенный 519, **520**
Ежовые **519, 520**
Жаба зеленая 252, **254**
Жаба обыкновенная 252, **253**
Жабы **252, 253, 254**
Жаворонковые **305, 306, 307**
Жаворонок лесной 305, **307**
Жаворонок полевой 305, **306**
Желтушка золотистая 233, **234**
Жерлянка краснобрюхая 255, **256**
Животные **176**
Жужелица золотоямчатая 191, **192**
Жужелица изменчивая 191, **194**
Жужелица Ульриха 191, **193**
Жужелицы **191, 192, 193, 194**
Жук-носорог 237, **238**
Жук-олень 218, **219**
Жулан 385, **386**
Зарянка 497, **498**
Зеленушка 373, **376**
Землеройка обыкновенная 536, **539**
Землеройковые **536, 537, 538, 539, 540**
Земноводные **249**
Зефир дубовый 213, **216**
Зимняк 285, **293**
Зимородковые **308, 309**
Зимородок 308, **309**
Змееяд 285, **295**
Ибисовые **492, 493, 494**
Иволга 406, **407**
Иволговые **406, 407**
Казарка белолобая 310, **318**
Казарка краснозобая 310, **329**
Каменка обыкновенная 497, **501**
Камышевка болотная 475, **477**
Камышевка дроздовидная 475, **476**
Камышевка тростниковая 475, **479**

Камышевка-барсучок 475, **478**
Камышница 432, **435**
Канюк 285, **292**
Каравайка 492, **494**
Кваква 310, **338**
Квакша обыкновенная 257, **258**
Квакши **257, 258**
Клинтух 349, **350**
Кобчик 367, **372**
Кожан двухцветный 544, **558**
Кожан поздний 544, **545**
Козодоевые **339, 340**
Козодой 339, **340**
Колпица 492, **493**
Конек лесной 395, **398**
Конек луговой 395, **397**
Конек полевой 395, **396**
Коноплянка 373, **374**
Коростель 432, **433**
Коршун черный 285, **301**
Кот лесной 521, **522**
Кошачьи **521, 522**
Крапивник 495, **496**
Крапивниковые **495, 496**
Крапивница 222, **223**
Краснозобик 444, **447**
Крачка белощекая 463, **464**
Крачка речная 463, **466**
Крачка черная 463, **465**
Крачковые **463, 464, 465, 466**
Кроншнеп большой 444, **452**
Круглоязычные **255, 256**
Кряква 310, **315**
Кулик-воробей 444, **448**
Куница каменная 525, **527**
Куница лесная 525, **528**
Куньи **525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533**
Курганник 285, **294**
Куропатка серая 419, **421**
Кутора малая 536, **538**
Лазоревка 412, **413**
Ласка 525, **532**
Ласточка береговая 381, **384**
Ласточка городская 381, **382**
Ласточка деревенская 381, **383**
Ласточковые **381, 382, 383, 384**
Лебедь-кликун 310, **327**
Лебедь-шипун 310, **328**
Ленточница малиновая 204, **206**
Лунь болотный 285, **296**
Лунь луговой 285, **298**
Лунь полевой 285, **297**
Лысуха 432, **434**
Лягушка прыткая 261, **262**
Лягушки настоящие **261, 262**
Малый зуек 343, **344**

Махаон 228, **230**
Медведица Гера 204, **207**
Медведица-госпожа 204, **205**
Медянка 269, **271**
Млекопитающие **513**
Мнемозина 228, **231**
Моримус темный 195, **197**
Муравьи **208, 209**
Мухоловка малая 401, **404**
Мухоловка серая 401, **405**
Мухоловка-белошейка 401, **402**
Мухоловка-пеструшка 401, **403**
Мухоловковые **401, 402, 403, 404, 405**
Мышиные **523, 524**
Мышь малютка 523, **524**
Насекомые **181**
Настоящие богомолы **220, 221**
Настоящие кузнечики **246, 247, 248**
Настоящие стрекозы **210, 211, 212**
Нетопырь карлик 544, **555**
Нетопырь лесной 544, **554**
Нетопырь малый 544, **556**
Нетопырь средиземноморский 544, **553**
Неясыть серая 467, **472**
Нимфалиды **222, 223, 224, 225, 226, 227**
Норка европейская 525, **531**
Ночница водяная 544, **548**
Ночница длинноухая 544, **546**
Ночница прудовая 544, **547**
Ночница усатая 544, **549**
Нырок белоглазый 310, **325**
Нырок красноголовый 310, **322**
Овсянка камышовая 363, **366**
Овсянка обыкновенная 363, **364**
Овсянка садовая 363, **365**
Овсянковые **363, 364, 365, 366**
Огарь 310, **330**
Орел-карлик 285, **300**
Орлан-белохвост 285, **299**
Осоед 285, **302**
Парусники **228, 229, 230, 231,232**
Пастушковые **432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439**
Пастушок 432, **439**
Пеганка 310, **331**
Пеликан розовый 415, **416**
Пеликановые **415, 416**
Пеночка-весничка 475, **486**
Пеночка-теньковка 475, **484**
Пеночка-трещотка 475, **485**
Перевозчик 444, **445**
Переливница ивовая 222, **224**
Переливница метида 222, **225**
Перепел 419, **420**
Пересмешка зеленая 475, **480**
Перламутровка Аглая 222, **226**
Пеструшка лесная 235, **236**

Пеструшка темнокрылая 222, **227**
Пискулька 310, **320**
Пищуха 341, **342**
Пищуховые **341, 342**
Пиявка медицинская 179, **180**
Пиявки **179, 180**
Пластинчатоусые **237, 238**
Поганка малая 430, **431**
Поганковые **430, 431**
Погоныш крошка 432, **438**
Погоныш малый 432, **436**
Погоныш обыкновенный 432, **437**
Подалирий 228, **230**
Подковонос малый 542, **543**
Подковоносые **542, 543**
Подорлик большой 285, **290**
Подорлик малый 285, **291**
Поликсена 228, **232**
Полоз желтобрюхий 269, **270**
Полоз четырехполосый 269, **272**
Полоз Эскулапов 269, **274**
Поползень 461, **462**
Поползни **461, 462**
Поручейник 444, **459**
Пресмыкающиеся **266**
Птицы **280**
Пустельга обыкновенная 367, **371**
Пчела-плотник 186, **189**
Пчёлы настоящие **186, 187, 188, 189, 190**
Ремез 442, **443**
Ремезовые **442, 443**
Ржанковые **343, 344, 345**
Риодиниды **235, 236**
Рогачи **218, 219**
Рукокрылые **541**
Рыжий лесной муравей 208, **209**
Саламандровые **263**
Сапсан 367, **369**
Сверчок обыкновенный 475, **483**
Сверчок речной 475, **481**
Сверчок соловьиный 475, **482**
Свиязь 310, **314**
Сизоворонка 354, **355**
Сизоворонковые **354, 355**
Синица большая 412, **414**
Синица длиннохвостая 303, **304**
Синица усатая 410, **411**
Синицевые **412, 413, 414**
Скворец обыкновенный 473, **474**
Скворцовые **473, 474**
Сколии **239, 240, 241**
Сколия волосатая 239, **241**
Сколия-гигант 239, **240**
Скопа 408, **409**
Скопиные **408, 409**
Славка садовая 475, **488**
Славка серая 475, **489**
Славка-завирушка 475, **490**

Славка-черноголовка 475, **487**
Славка-ястребинка 475, **491**
Славковые **475-491**
Сова болотная 467, **468**
Сова ушастая 467, **469**
Совиные **467, 468, 469, 470, 471, 472**
Сойка 356, **361**
Соколиные **367, 368, 369, 370, 371, 372**
Соловей обыкновенный 497, **499**
Соневые **534, 535**
Соня обыкновенная 534, **535**
Сорока 356, **362**
Сорокопут серый 385, **387**
Сорокопут чернолобый 385, **388**
Сорокопутовые **385, 386, 387, 388**
Сплюшка 467, **471**
Стрекоза болотная 210, **212**
Стрелка Линдена 200, **201**
Стрелки **200, 201**
Сыч домовый 467, **470**
Травник 444, **460**
Тритон гребенчатый 263, **264**
Тритон обыкновенный 263, **265**
Трясогузка белая 395, **399**
Трясогузка желтая 395, **400**
Трясогузковые **395, 396, 397, 398, 399, 400**
Турухтан 444, **453**
Тювик европейский 285, **286**
Удод 511, **512**
Удодовые **511, 512**
Уж водяной 269, **273**
Ужеобразные **269, 270, 271, 272, 273, 274**
Улит большой 444, **457**
Усатые синицы **410, 411**
Усачи **195, 196, 197**
Утиные **310**
Утка серая 310, **317**
Ушан серый 544, **557**
Фазан 419, **422**
Фазановые **419, 420, 421, 422**
Фифи 444, **456**
Ходулочник 440, **441**
Хомяк обыкновенный 517, **518**
Хомяковые **517, 518**
Хорек лесной 525, **533**
Цаплевые **332, 333, 334, 335, 336, 337, 338**
Цапля белая большая 332, **333**
Цапля желтая 332, **335**
Цапля малая белая 332, **337**
Цапля рыжая 332, **334**
Чайка озерная 389, **392**
Чайка-хохотунья 389, **390**
Чайка сизая 389, **391**
Чайковые **389, 390, 391, 392**
Чеглок 367, **370**
Чекан луговой 497, **504**

Чекан черноголовый 497, **505**
Червонец огненный 213, **214**
Черепаха болотная 275, **276**
Чернеть морская 310, **324**
Чернеть хохлатая 310, **323**
Чернозобик 444, **446**
Черныш 444, **458**
Чесночница обыкновенная 259, **260**
Чесночницы **259, 260**
Чибис 343, **345**
Чиж 373, **378**
Чирок-свистунок 310, **313**
Чирок-трескунок 310, **316**
Шевчук Сервиля 246, **247**
Шилоклювковые **440, 441**
Шилохвость 310, **311**
Широконоска 310, **312**
Шмель глинистый 186, **187**
Шмель красноватый 186, **188**
Пчела-плотник фиолетовый 186, **190**
Щегол 373, **375**
Щеголь 444, **455**
Щелкун краснокрылый 202, **203**
Щелкуны **202, 203**
Щурка золотистая 393, **394**
Щурковые **393, 394**
Эребиды **204, 205, 206, 207**
Ястребиные **285-302**
Ястреб-перепелятник 285, **288**
Ястреб-тетеревятник 285, **287**
Ящерица зеленая 277, **279**
Ящерица прыткая 277, **278**
Ящерицы настоящие **277, 278, 279**

Bibliografie

1. Andreev A., Derjanschi V., Jurminschi S., Izverskaia T., Lala M., Kuharuk E., Sîrodoev G. Planurile manageriale pentru habitatele naturale şi agricole ale sectorului Purcari-Crocmaz din zona umedă a Nistrului. Societatea Ecologică ”Biotica”. Chişinău, 2002. 80 p.
2. Andreev A., Jura L., Şabanova G., Derjanschi V. Izverskaia T., Jurminschi S., Sîrodoev G., Talmaci I. Terenurile agricole de o valoare naturală înaltă. Societatea Ecologică ”Biotica”. Chişinău, 2007. 112 p.
3. Andreev A., Talmaci I., Şabanova G., Izverskaia T. şi a. Convenţia RAMSAR şi zonele umede de importanţă internaţională în Republica Moldova. Societatea Ecologică ”Biotica”. Chişinău, 2008. 84 p.
4. Atlasul speciilor de vertebrate (mamifere, reptile, amfibieni, pești) incluse în cadastrul regnului animal al Republicii Moldova, Chișinău, 2013. 100 c.
5. Bejenaru I., Andreev A., Sirodoev G. Ramsar site ”Lower Dniester (Nistru de Jos)” nr. 1316. http://www.ramsar.org/w.n.moldova_dniester.htm 2003
6. Bilz M., Kell S.P., Maxted N. and Landsdown R.V. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of European Union. 2011.
7. Bondarenco A.M. Fauna of bats of the Kitskansky wood (Moldova, Transdniester Region). Plecotus et al. 2006. Vol. 9. P. 18-24. [In Russian with English summary]. 630 p.
8. Cartea Roşie a plantelor vasculare din România /Gheorghe Dihoru, Gavril Negrean. Bucureşti: ”Editura Academiei Române”, 2009. 630 p.
9. Cartea Roşie a Republicii Moldova. Ed. III. Chişinău: ”Ştiinţa”, 2015. 492 p.
10. CITES. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Secretariat. 2011. http:/www.cites.org./
11. Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats. Bern, Switzerland. 1979. http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm.
12. Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. Bonn, 23 December 2002. https://www.cms.int/sites/default/files/publication/consolidated_part_I_and_II_en.pdf
13. Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds //Official Journal of the European Communities. 25 april 1979. P. 1-19.
14. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, O.J. L206, 22.07.92.1992. P. 0007-0050.
15. Ghendov V., Izverscaia T., Shabanova G. Distributional pattern of some rare feather-grasses (*Stipa*, *Poaceae*) in the flora of Republic of Moldova //Conservation of plant diversity. Intern. sc. symposium. Second ed. Chişinău: S. n., 2012. P. 161-167.
16. Ghendov V., Izverscaia T., Shabanova G. Pre-identified Red List of vascular plants in the flora of Republic of Moldova //Journal of Botany, 2012. Vol. IV, Nr. 1(5). P. 41-52.

17. Ghendov V., Izverscaia T., Shabanova G. Rare vascular plants of European importance in the flora of Republic of Moldova //Conservation of plant diversity. Intern. sc. symposium. Second ed. Chişinău: S. n., 2012. P. 155-161.
18. Ghendov V., Izverscaia T., Shabanova G. Threatened vascular plants of the natural flora of Republic of Moldova //Dendrology, floriculture and landscape gardening. Materials of Int. Sci. Conf. Vol. 2. Nikitsky Botanical Gardens, Yalta, Ukraine, June 5-8, 2012. P. 17.
19. Handbook of the Mammals of the World. Vol. 1-9 /Edited by Don E Wilson, Russell A.Mittermeier, Thomas E. Lacher. 2009-2019. https://www.lynxeds.info/sites/default/files/pdfs/Lynx%20Edicions_Families%20HMW%20Volumes.pdf
20. Interpretation manual of European Union Habitats – Eur28. European Commission DG Environment. Nature ENV B.3. 2013. 144 p.
21. IUCN. IUCN Red List of Threatened Species. http:/www.iucnredlist.org./
22. IUCN. IUCN Red List of Threatened Species. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/beetles/status.htm
23. Izverskaya T. The Current State of the Flora of Moldova and the Conservation of Rare Species //Russian Conservation News, 2000. N 24. P. 17-18.
24. Jurminschi S.D., Ţurcanu V.F. şi a. Date experimentale referitor la înmulüirea în condiüii de captivitate a speciei *Vipera ursini* //Mat. conf a III a Zoologilor din Moldova. Chişinău, 1995. P. 31-32.
25. Lumea animală a Moldovei /Cozari T., Usatâi M., Vladimirov M.Vol. 2. Peşti. Amfibieni. Reptile. Chișinău: ”Știința”. 152 p.
26. Lumea animală a Moldovei /Munteanu A., Cozari T., Zubcov N. Vol. 3. Păsări. Chișinău: ”Știința”. 220 p.
27. Munteanu A., Zubcov N. et al. Atlasul păsărilor din Republica Moldova. Chişinau: S.n., 2011. 100 p.
28. Neculiseanu Z., Stratan V., Vereşciaghin B., Ostaficiuc V. Insectele rare şi pe cale de dispariţie din Moldova. Chişinău: ”Ştiinţa”, 1992. 120 p.
29. Nordmann A. Notice sur les reptiles de la faune pontique //Voyage dans la Russie méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837, sous la direction de M. Anatole de Demidoff, par MM. de Sainson, le Play, Huot, Léveillé, Raffet, Rousseau, de Nordmann et du Ponceau; dédié à S.M. Nicolas 1er, Empereur de toutes les Russies. Paris: Ernest Bourdin et Ce, 1840. Vol. 3. P. 335-351.
30. Pânzaru P., Negru A., Izverschii T. Taxoni rari din flora Republicii Moldova. Chişinău, 2002. 148 p.
31. Planul de management pentru zona Ramsar ”Nistrul de Jos” /A. Andreev, E. Anikeev, P. Arnaut, I. Barcari, O. Bezman-Moseiko, A. Bondarenco, P. Gorbunenco, N. Grosu, V. Derjanschi, T. Izverscaia și a. Chișinău, 2017. 365 p. http://bioticamoldova.org/library/Plan%20managerial%20Nistrul%20de%20Jos.pdf
32. Registrul zonelor nucleu ale Reţelei Ecologice Naţionale a Republicii Moldova = Директория ключевых территорий Национальной экологической сети Республики Молдовы / aut.: A. Andreev, G. Şabanova, T. Izverskaia [et al.]. Ch.: „Elena-V.I.” SRL, 2012. 700 p.
33. Sawyer R.T. Leech biology and behavior // Oxford: Clarendon Press, 1986. Vol. 1-3. 1065 p.

34. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-1. https://www.iucnredlist.org/resources/walter1998
35. The Red Book of the Pepublic of Moldova. Chişinău: Î. E. P. ”Ştiinţa”, 2001. II edition. 287 p.
36. The Red Book of the Pepublic of Moldova. Chişinău: Î. E. P. ”Ştiinţa”, 2015. III edition. 492 p.
37. Tsurcanu V. Spreading and protection of the *Coronella austriaca* in Moldova //The biology and conservation of *Coronella austriaca*. Southgempton (UK), 1990.
38. Ţurcanu V. Parametrii care determină capacitatea componenţilor herpetofaunistici ai ecosistemului //Mat. conf. naţionale ecol. Cluj-Napoca, 1992. P. 120-121.
39. Ţurcanu V. Starea actuală a herpetofaunei din Moldova //Mat. conf. “Ecol. şi protec. mediului înc. în Moldova”. Chişinău, 1992. P. 80-81.
40. Utevsky, S., Zagmajster, M. & Trontelj, P. 2014. *Hirudo medicinalis*. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e. T10190A21415816.
41. www.plantarium.ru
42. www.wikipedia.org
43. Аверин Ю.В., Ганя И.М. Птицы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1970. Т. 1. 240 с.
44. Аверин Ю.В., Ганя И.М., Зубков Н.И., Мунтяну А.И., Успенский Г.А. Птицы. Животный мир Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1981. 336 с.
45. Аверин Ю.В., Ганя И.М., Успенский Г.А. Птицы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1971. Т. 2. 236 с.
46. Андреев А., Держанский В. Операционный список насекомых /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 31-34. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
47. Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. 50 с. http://bioticamoldova.org/ru/lib_bio.htm
48. Андреев А., Держанский В. К фауне чешуекрылых (*Lepidoptera*) Нижнего Днестра //Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Кишинев, 1999. С. 58-59.
49. Андреев А.В. О фауне *Odonata* Молдовы и стрекозах Талмазского участка Днестра //Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Кишинев, 1998. С. 14-16.
50. Андреев А.В., Держанский В.В. Материалы по оценке видового разнообразия и редким видам дневных бабочек (Lepidoptera*:* Rhopalocera) //Managementul integral al resurselor naturale din bazinul transfrontalier al fluviului Nistru. Chisinau: ”Eco-Tiras”, 2004. P. 31-33.
51. Андреев А.В., Держанский В.В. Фауна стрекоз (Odonata) Молдовы: первые итоги //Anal. Şt. Univer. de Stat din Moldova. Seria ”Şt. Chem.-biol.” Chisinău, 2004. P. 170-173.
52. Андреев А.В., Шабанова Г.А., Цуркану В.Ф., Держанский В.В., Изверская Т.Д., Горбуненко П.Н. Степные экосистемы Нижнего Днестра //Bull. Şt. Revistă de Etnografie, Ştiinţe ale Naturii şi Muzeologie. Chişinău, 2007. Vol. 6(19). P. 160-174.

53. Андреев В.Н. Деревья и кустарники Молдавии. Вып. 1, Изд. АН СССР, М.: Наука. 1957. 207 с.
54. Андреев В.Н. Растительность Молдавии и ее районирование // Научная конф. проф.-препод. состава, посвященная 10-летию Кишиневского гос. ун-та: Тез. докл. Кигшинев, 1953. С. 33-36.
55. Анисимов Е.П. О гнездовании и численности черного коршуна в Молдавии //Вопросы экологии и практического значения птиц и млекопитающих Молдавии. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1969. Вып. 4. С. 15-20.
56. Архипов А.М. Встречи редких и малочисленных видов птиц на Кучурганском водохранилище и в его окрестностях в 1997-2002 гг. // Авифауна України. Чернівці, 2002. С. 42-45.
57. Архипов А.М. О гибели птиц от столкновений с линиями электропередачи возле Кучурганского лимана в Одесской области //Современные проблемы зоологии и экологии. Материалы Международной конференции. Одесса: Феникс, 2005. С.8-9.
58. Архипов А.М. Численность и характер зимовки птиц на Кучурганском лимане и сопредельных территориях в 2001 г. //Мониторинг зимующих птиц в Азово-Черноморском регионе Украины. Одесса-Киев, 2002. С. 3-8.
59. Архипов А.М., Фесенко Г.В. Сведения о наблюдениях за редкими птицами в районе Кучурганского лимана //Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Мелитополь: Бранта, 2005. Вып. 8. С. 7-15.
60. Банников А.Г., Даревский И.С. и др. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР. Москва: Просвещение. 1977. 414 с
61. Безман-Мосейко О.С. О видовом составе герпетофауны Приднестровья (предварительные данные) //Праці Українського герпетологічного товариства. К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2008. №1. С. 43-46.
62. Боркин Л.Я., Безман-Мосейко О.С., Мазепа Г.А., Зиненко А.И., Коршунов А.В., Лада Г.А., Шабанов Д.А., Литвинчук С.Н., Розанов Ю.М. О южной границе распространения гибридной *Rana esculenta (*Ranidae, Anura, Amphibia) на территории Украины и Молдовы: данные проточной ДНК-цитометрии //Праці Українського герпетологічного товариства. К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2008. №1. С. 5-10.
63. Браунер А.А. Гады Бессарабии. //Труды Бессарабского общества естествоиспытателей. Кишинев, 1907. Т. 1, вып. 2. С. 149-173.
64. Браунер А.А. Заметки о птицах Херсонской губернии, Одесса, 1894.
65. Браунер А.А. Материалы по энтомологической фауне Бессарабии. Заметки о стрекозах Бессарабии //Труды Бессарабского общества естествоиспытателей. Кишинев, 1912. Т. 2, вып. 1. С. 34-36.
66. Браунер А.А. Предварительное сообщение о пресмыкающихся и гадах Бессарабии, Херсонской губернии, Крыма и северо-западного Кавказа между Новороссийском и Адлером //Зап. Новоросс. об-ва естест. (Одесса). 1903. С. 43-51.
67. Браунер А.А. Третье предварительное сообщение о пресмыкающихся и земноводных губерний Сувалковской, Минской, Подольской, Черниговской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской и Днепровского уезда Таврической //Зап. Новоросс. об-ва естест. (Одесса). 1906. Т. 28. С. 1-12.

68. Витко К.Р. Экология гырнецовой дубравы в южной Молдавии. Кишинев, 1966. 95 с.
69. Ганя И.М. Зимний состав орнитофауны садов Молдавии //Труды института биологии МФ АН СССР. Кишинев, 1960. Т. 1. С. 125-130.
70. Ганя И.М. Некоторые данные о голубях и совах Бендерского лесхоза //Ученые записки Тираспольского педагогического института, 1957. Вып. 5. С. 225-235.
71. Ганя И.М. Орнитофауна сухопутных биотопов Молдавии, ее генезис и практическое значение: Автореф. дис. … докт. биол. наук. Кишинев, 1971.
72. Ганя И.М. Птицы сухопутных биотопов. Кишинев: Штиинца, 1978. 70 с.
73. Ганя И.М., Зубков Н.И. Птицы. Фауна биоценотических оазисов и ее практическое значение. Кишинев: Штиинца, 1990. С.125-173.
74. Ганя И.М., Зубков Н.И. Редкие и исчезающие виды птиц Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1989. 152 с.
75. Ганя И.М., Зубков Н.М. Значение биологических оазисов в обогащении орнитофауны агроценозов //Экологические охраны и воспроизводство лесных ресурсов Молдавии. Республиканская научно-практическая конференция. Кишинев, 1989. С. 116-119.
76. Гейдеман Т.С. Дубравы из дуба пушистого в Молдавии //Гербовецкий лес. Кишинев, 1970. С. 49-59.
77. Гейдеман Т.С. О геоботаническом районировании Молдавской ССР //Проблемы современной ботаники. М.-Л.: Наука, 1965. Т. 1. С. 295-299.
78. Гейдеман Т.С., Николаева Л.П. Редкие и исчезающие виды флоры Молдавии, подлежащие охране //Охрана природы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1975. Вып. 13. С. 75-81.
79. Гейдеман Т.С., Николаева Л.П. Современное состояние и охрана флоры Молдавии //Известия АН МССР. Сер. биол. хим. наук. 1986. №3. С. 17-20.
80. Гусан Г.З. Кормовые участки «синичьих стай» и их использование птицами //Экология и охрана птиц и млекопитающих в антропогенном ландшафте. Кишинев, 1992. С. 30-44.
81. Гусан Г.З. Пролет и питание береговой ласточки в Молдавии //Миграции и практическое значение птиц Молдавии. Кишинев, 1980. С.137-144.
82. Гусан Г.З., Котяцы М.И. Структура осенне-зимних агрегаций насекомоядных видов птиц в пойменных лесах реки Днестр //Млекопитающие и птицы антропогенного ландшафта Молдавии и их практическое значение. Кишинев, 1986. С. 31-41.
83. Дидусенко А.М. Змеи Молдавии //Мат. науч. конф. по рез. раб. за 1965 г. Отд. природы. Изд-во КГУ. Кишинев, 1965. С. 74-75.
84. Дидусенко А.М. О видовом составе амфибий и рептилий Молдавской ССР //Тр. обьед. науч. сессии АН СССР. Кишинев, 1959. Т. 2. С. 325-327.

85. Директория ключевых территорий Национальной экологической сети Республики Молдовы /aut.: A. Andreev, G. Şabanova, T. Izverskaia [et al.]. Chişinău: „Elena-V.I.” SRL, 2012. 700 p.
86. Журминский С.Д. Население и динамика птиц Кучурганского лимана и побережий //Экология и охрана птиц и млекопитающих в антропогенном ландшафте. Кишинев, 1992. С. 41-50.
87. Журминский С.Д. Население птиц меандров правобережья Нижнего Днестра в летний период //Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Кишинев, 1999. С. 71-73.
88. Журминский С. Операционный список птиц /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 37-38. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
89. Журминский С.Д. Фауна птиц пойменного леса на участке Нижнего Днестра (у сел Копанка-Талмазы-Чобручи) //Проблемы сохранения биоразнообразя Среднего и Нижнего Днестра. Кишинев, 1998. С. 55-57.
90. Журминский С.Д., Куниченко А.А. Гнездование и структура колоний цапель в низовьях Днестра //Млекопитающие и птицы антропогенного ландшафта Молдавии и их практическое значение. Кишинев, 1986. С. 60-69.
91. Зубков Н.И. Хищные птицы и совы Молдавии (биология, охрана и практическое значение): Дис. … канд. биол. наук. Кишинев, 1983. 224 с.
92. Зубков Н.И. Пролет, распределение и численность хищных птиц и сов Молдавии //Миграции и практическое значение птиц Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1980. С. 51-77.
93. Зубков Н.И. Трофические связи сов в биоценозах Молдавии //Экология птиц и млекопитающих Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1981. С. 79-94.
94. Изверская Т.Д., Гендов В.С. Флора и растительность узловых территорий экологической сети Республики Молдова в Рамсарском сайте «Нижний Днестр» //East European Scientific Journal. Warsaw, 2017. Vol. 1, Nr. 3(19). P. 8-17. (IF: 0.572).
95. Изверская Т.Д., Гендов В.С. Редкие виды сосудистых растений ключевых территорий национальной экологической сети Республики Молдова в Рамсарском сайте «Нижний Днестр» /Сборник научных статей «Экология. Окружающая среда. Состояние и перспективы». Бендеры, Изд.: "Полиграфист", 2016. С. 153-159.
96. Изверская Т., Гендов В., Ионица О., Тофан-Дорофеев Е., Рущук А. Редкие видов сосудистых растений международного, регионального и национального значения в Рамсарском сайте «Нижний Днестр», Республика Молдова //Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы особо охраняемых природных территорий-4». «Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии». 2020. №3, (в печати)
97. Изверская Т.Д., Гендов В.С., Тофан-Дорофеев, Е.В., Ионица О.В. Редкие виды сосудистых растений Рамсарского сайта ”Нижний Днестр” /Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра: Мат. науч.-практ. конф. (с международным участием), Тирасполь, 16-17 ноября 2018 г. Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2018. С. 86-91.

98. Изверская Т.Д., Гендов В.С., Тофан-Дорофеев Е.В., Ионица О.В. Современный состав флоры природных комплексов Рамсарского сайта ”Нижний Днестр”. *Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра:* Мат. науч.-практ. конф. (с международным участием), Тирасполь, 16-17 ноября 2018 г. Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2018. С. 92-99.
99. Изверская Т.Д., Гендов В.С., Шабанова Г.А. Флора и растительность узловой территории экологической сети Республики Молдова ”Чиобурчиу-Рэскэец” //Mediul ambiant, 2013. Nr. 5 (71). P. 29-33.
100. Изверская Т.Д., Гендов В.С., Шабанова Г.А., Рущук В.С., Рущук А.Д. Флористическое разнообразие природных биотопов “НАТУРА 2000” Рамсарского сайта “Нижний Днестр” //Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья: Мат. V Междунар. науч.-практ. конф. Тирасполь, 14 ноября 2014г. Тирасполь: Изд-во Приднестр. Ун-та, 2014. С. 100-104.
101. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А. Редкие виды растений региона Нижнего Днестра //Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра. Материалы Международной конференции, Кишинев 16-17 сентября 2004 г. Кишинев, 2004. С. 138-141.
102. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А., Гендов В.С. Биотопическое и флористическое разнообразие узловых территорий рамсарского сайта «Нижний Днестр» /Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional Rezervaţia „Codrii”: Rezervaţia ”Codrii” 40 ani. Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2011. P. 200-203.
103. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А., Гендов В.С. Природные ботопы правобережной части Рамсарского сайта ”Нижний Днестр” //Управление бассейном трансграничной реки Днестр в рамках бассейнового Договора. Международная конференция. Кишинев, 20-21 сентября 2013 года. С. 372-378.
104. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А., Гендов В.С. Участок степной растительности «Попяска», перспективный для охраны государством в Республике Молдова /Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional Rezervaţia ”Codrii”: Rezervaţia ”Codrii” 40 ani. Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2011. P. 197-200.
105. Изверская Т.Д., Шабанова Г.А., Гендов В.С. Флора и растительность лесного урочища «Копанка-Леунтя» /Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional Rezervaţia ”Codrii”: Rezervaţia ”Codrii” 40 ani. Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2011. P. 193-196.
106. Корчмарь Н.Д. Лесная куница в Молдавии //Вопросы экологии и практического значения птиц и млекопитающих Молдавии. Кишинев, 1969. Вып. 3. 85 с.
107. Корчмарь Н.Д. Некоторые данные о распространении, биологии и хозяйственном значении барсука в Молдавии //Вопросы экологии и практического значения птиц и млекопитающих Молдавии. Кишинев. 1962. 1962. Вып. 1. 87 с. Вып. 2. 74 с.
108. Котомина Л.В., Александрова Н. К фауне прямокрылых (Orthoptera) в окрестностях г. Тирасполь //Чтения памяти А.А. Браунера. Одесса: АстроПринт, 2003. С. 65-66.
109. Котомина Л.В., Шешницан С.С. Некоторые сведения о колеоптерофауне Нижнего Днестра //Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная рамочная директива ЕС. Кишинев, 2008. С.174-177.

110.Котомина Л.В., Шешницан С.С. Редкие виды жесткокрылых (*Insecta, Coleoptera*) фауны нижнего Приднестровья //Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Тирасполь: Приднестр. гос. ун-т, 2009. С. 103-105.
111.Котомина Л.В., Шешницан С.С. Энтомофауна Кицканского леса как объект изучения в период полевых практик (1993-2010 гг.) для студентов-биологов //Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами. Тирасполь, 2010. С.112-114.
112.Красная книга Приднестровья /М-во природных ресурсов и экол. Контроля Приднестр. Молд. Респ. Тирасполь: Б. и., 2009. 376 с.
113.Куниченко А.А. Территориальное поведение лысухи и его адаптивное значение //Млекопитающие и птицы антропогенного ландшафта Молдавии и их практическое значение. Кишинев, 1986. С. 70-72.
114.Куниченко А.А., Тищенков А.А. Видовой состав птиц, зимующих на водоемах Приднестровья //Птицы Азово-Черноморского региона на рубеже тысячелетий. Одесса: АстроПринт, 2000. С. 11.
115.Куниченко А.А., Тищенков А.А. Динамика численности голенастых и веслоногих птиц, гнездящихся на озере Путрино //Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Материалы Международной научно-практической конференции. Тирасполь: РИО ПГУ-ЭКОДНЕСТР, 2001. С. 145-146.
116.Куниченко А.А., Тищенков А.А. Необычные и редкие случаи зимовок птиц на Кучурганском лимане и других водоемах Южного Приднестровья //Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Кишинев: ”Biotica”, 1999. С. 117-119.
117.Куниченко А.А., Тищенков А.А. Необычные и редкие случаи зимовок птиц на Кучурганском лимане и других водоемах Южного Приднестровья //Сохранение биоразнообразия бассейна Днестра. Материалы Международной конференции. Кишинев, 7-9 октября 1999. Кишинев: Экологическое общество ”Biotica”, 1999. С. 117-119.
118.Ливанов Н.А. Пиявки – *Hirudinea* /В кн.: Животный мир СССР. Л., 1937. С. 558-561.
119.Лозан М.Н. Грызуны Молдавии. Т. I. Кишинев: РИО АН МССР, 1970. 168 с.
120.Лукин Е.И. Географическое распространение пресноводных пиявок на территории СССР /Проблемы зоогеографии суши. Львов, 1958. С. 144-149
121.Мацюк В.А., Верещагина Т.К. Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) пойменных экосистем нижнего Днестра //Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. 2005. С. 241-242.
122.Медведев С.И., Шапиро Д.С. К познанию фауны жуков (Coleoptera) Молдавской ССР и сопредельных районов Украины //Тр. НИИ биологии и биологического факультета Харьковского госуниверситета. 1957. Т. 30. С. 173-206.
123.Мунтяну А. Операционный список млекопитающих /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 35. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
124.Мунтяну А.И. Орнитофауна г. Тирасполя и его окрестностей //Ученые записки ТГПИ. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1970. Том 17. С. 24-26.

125.Мунтяну И.А. Водно-болотные охотничьи птицы Молдавии. Автреф. дисс. … канд. биол. наук. Киев, 1972. 17 с.
126.Назаренко Л.Ф. Колониально гнездящиеся птицы низовьев Днестра, их распространение, особенности экологии и практическое значение //Труды Второй Прибалтийской орнитологической конференции, Таллин, 1954 г. М., 1957. С. 361-365.
127.Назаренко Л.Ф. Орнитологическая фауна Нижнего Приднестровья и ее хозяйственное значение. Автореф. дисс. ...канд. биол. наук, Одесса, 1959. 20 с.
128.Назаренко Л.Ф. Эколого-фаунистическая характеристика орнитофауны низовьев Днестра и перспективы ее хозяйственного значения //Труды биологического факультета ОГУ, 1953. Т. 6. С. 139-155.
129.Николаева Л.П. Дубравы из пушистого дуба МССР. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1963. 166 с.
130.Никонов Г.И. Медицинская пиявка: основы гирудотерапии. СПб.: СДС, 1998. 294 с.
131.Першина В.И. Структура и динамика авифауны Кицканского лесного комплекса //Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы. Мат-лы междунар. конф. Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2017. С. 288-291.
132.План управления Рамсарским сайтом «Нижний Днестр» /А. Андреев, Е. Аникеев, Г. Шабанова, Т. Изверская [и др.]; под общей ред. А. Андреева. Chişinău: „Elena-V.I.”. 2011. 574 p.
133.Пойрас А., Верещагин Б., Калестру Л. Жесткокрылые (Coleoptera: Chrysomelidae, Curculionidae) и тли (Homoptera: Aphidoidea) как компоненты биоразнообразия древесных насаждений бассейна р. Днестр //Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра. Кишинев, 2004. С. 237-238.
134.Попа Л.Л., Тофан В.Е. Земноводные и пресмыкающиеся Молдавии. Справочник-определитель. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1982. 104 с.
135.Растительный мир Молдавии. Лесные растения /Гейдеман Т.С., Витко К.Р., Истратий А.И. и др. Кишинев: Штиинца, 1986. Т. 1. 295 с.
136.Растительный мир Молдавии. Растения лесных опушек и полян /Гейдеман Т.С., Витко К.Р., Истратий А.И. и др. Кишинев: Штиинца, 1986. Т. 2. 343 с.
137.Растительный мир Молдавии. Растения луговые, прибрежные, водные и солончаковые /Гейдеман Т.С., Витко К.Р. и др. Кишинев: Штиинца, 1988. Т. 3. 275 с.
138.Растительный мир Молдавии. Растения степей, известняковых склонов и сорные /Гейдеман Т.С., Витко К.Р., Изверская Т.Д. и др. Кишинев: Штиинца, 1989. Т. 5. 303 с.
139.Редкие виды флоры Молдавии (биология, экология, география). Кишинев: Штиинца, 1982. 103 с.
140.Романович Н.А., Мараскул В.А., Романович А.Л. Структура гнездовой орнитофауны острова Куца в 2018 г. //Hydropower impact on river ecosystem functioning: Proceedings of the International conference. Тирасполь: ”Eco-Tiras”. 2019. С. 279-282.

141.Романович Н.А., Тищенков А.А. Численность и распространение хищных птиц в Южном Приднестровье в начале XXI века //Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: Мат-лы V Междунар. Конф. По хищным птицам Северной Евразии. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2008. С. 290-291.
142.Руководство по планам управления ключевыми элементами Национальной экологической сети Молдовы /aut.: A. Andreev, T. Izverskaia, I. Talmaci [et al.]; red. şt.: A. Andreev; Societatea Ecologică „Biotica". Chişinău: S.n., 2012 (Tipogr. „Elena-V.I."). 104 p.
143.Смирнова-Гараева Н.В. Водная растительность Днестра и ее хозяйственное значение. Кишинев: Штиинца, 1980. 136 с.
144.Смирнова-Гараева Н.В. Редкие растения Днестра и его водоемов //Охрана природы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1975. Вып. 13. С. 88-98.
145.Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны СССР. М.: Наука, 1990. 727 с.
146.Степи Нижнего Днестра: богатство и нищета /Шабанова Г.А., Цуркану В.Ф, Изверская Т.Д., Держанский В.В., др. Кишинев, 2005. 48 с.
147.Тищенков А.А. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2002 г. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2002. Т. 11, вып.2. С. 262-263.
148.Тищенков А.А. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2003 г //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2004. Т. 13, вып. 1. С. 131-132.
149.Тищенков А.А. Гнездовая орнитофауна «Кицканского леса» //Современные проблемы зоологии и экологии. Мат-лы Международн. конф. Одесса: Феникс, 2005. С. 289-292.
150.Тищенков А.А. Гнездовая орнитофауна «Кицканского леса» //Современные проблемы зоологии и экологии. Мат-лы Международн. конф. Одесса: Феникс, 2005. С. 289-292.
151.Тищенков А.А. Некоторые сведения о редких птицах Среднего Приднестровья //Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Тезисы Международной конференции. Кишинев: "Biotica", 1998. С. 155-158.
152.Тищенков А.А. Распространение и численность хищных птиц, гнездящихся в Южном Приднестровье // Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2001. Т. 10, вып. 2. С. 207-209.
153.Тищенков А.А., Аптеков А.А. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2000-2001 гг. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2001. Т. 10, вып. 2. С. 153-155.
154.Тищенков А.А., Гороховский П.В., Стороженко А.А., Аптеков А.А., Молчанов Е.В. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2004 г //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2005. Т. 14, вып. 1. С. 137-138.
155.Тищенков А.А., Гороховский П.В., Стороженко А.А., Аптеков А.А., Молчанов Е.В. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2004 г //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2005. Т. 14, вып. 1. -С. 137-138.
156.Тищенков А.А., Гороховский П.В., Стороженко А.А., Цуркан Л.Ф., Выродов А.Д. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2005 г. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2005. Т. 14, вып. 2. С. 263-264.

157.Тищенков А.А., Зотик Ю.Е. Особенности репродуктивных орнитокомплексов урочища ”Дикуль” в 2013-2015 гг. //Чтения памяти доцента Л.Л. Попа. Тирасполь: Изд-во ПГУ, 2015. С. 125-137.
158.Тищенков А.А., Зотик Ю.Е. Птицы урочища ”Дикуль” (Приднестровье) //Стрепет. Ростов н/Д, 2017. Т.15, вып. 1. С.13-32.
159.Тищенков А.А., Медведенко Д.В. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2009-2011 гг. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2011. Т. 20, вып.1-2. С. 173-174.
160.Тищенков А.А., Медведенко Д.В. Характер зимовки птиц на водоемах Южного Приднестровья в 1999/2000 гг. //Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Вып. 4. Мелитополь: Бранта – Симферополь: Сонат, 2001. С. 137-141.
161.Тищенков А.А., Медведенко Д.В. Характер зимовки птиц на водоемах Южного Приднестровья в 1999/2000 гг. //Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. Мелитополь: Бранта-Симферополь: Сонат, 2001. Вып. 4. С. 137-141.
162.Тищенков А.А., Мустя М.В., Сербинова Л.П., Дану К.П. Орнитологический компонент полевых практик по зоологии среди водно-болотных угодий Южного Приднестровья //Биоразнообразие и факторы, влияющие на экосистемы бассейна Днестра: Мат-лы научно-практ. конф. (с междунар. участием). Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2018. С. 181-186.
163.Тищенков А.А., Першина В.И. Гнездящиеся птицы ”Кицканского лесного комплекса” (Приднестровье) //Русский орнитологический журнал. Экспресс-выпуск 1316. Т. 25. СПб, 2016. С. 2757-2777.
164.Тищенков А.А., Першина В.И. Зимняя орнитофауна ”Кицканского лесного комплекса” //Чтения памяти доцента Л.Л. Попа. Тирасполь: Изд-во ПГУ, 2015. С. 137-145.
165.Тищенков А.А., Першина В.И. Структура репродуктивного населения птиц ”Кицканского лесного комплекса” в 2014-2015 годах //Академику Л.С. Бергу – 140 лет. Бендеры: ”Eco-Tiras”, 2016. С. 255-259.
166.Тищенков А.А., Першина В.И., Стахурская Е.С. Птицы ленточных пойменных лесов Нижнего Днестра //Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы. Мат-лы междунар. конф. Тирасполь: ”Eco-Tiras”, 2017. С. 373-377.
167.Тищенков А.А., Романович Н.А., Зотик Ю.Е., Медведенко Д.В., Стахурская Е.С., Першина В.И., Аптеков А.А., Филипенко С.И. Встречи некоторых редких видов птиц в Приднестровье в 2012-2015 гг. //Стрепет. Ростов н/Д, 2016. Т.14, вып. 1-2. С. 65-76.
168.Тищенков А.А., Романович Н.А., Мараескул В.А., Аптеков А.А. Влияние гидрорежима на орнитофауну Рамсарских угодий Южного Приднестровья //Hydropower impact on river ecosystem functioning: Proceedings of the International conference. Тирасполь: ”Eco-Tiras”. 2019. С. 326-329.
169.Тищенков А.А., Романович Н.А., Стороженко А.А., Аптеков А.А. Встречи некоторых редких птиц в Приднестровье в 2006-2008 гг. //Беркут. Український орнітологічний журнал. Канів-Чернівці, 2008. Т. 17, вып.1-2. С. 183-185.
170.Тищенков А.А., Филипенко С.И., Вакарчук О.Б., Мирошникова Д.В. Заметки о летнем населении птиц пойменных биотопов и береговых обрывов Нижнего Днестра //Академику Л.С. Бергу – 130 лет. Бендеры: ”Eco-Tiras”, 2006. С. 171-174.

171.Тищенков А.А., Филипенко С.И., Вакарчук О.Б., Мирошникова Д.В. Заметки о летнем населении птиц пойменных биотопов и береговых обрывов Нижнего Днестра //Академику Л.С. Бергу – 130 лет. Бендеры: ”Eco-Tiras”, 2006. С. 171-174.
172.Тофан В.Е. Охрана отдельных видов земноводных и пресмыкающихся Молдавии //Наземн. основы охр. природы и их преподавание в школе. Томск, 1970. С. 329-331.
173.Тофан В.Е. Фауна земноводных и пресмыкающихся Молдавии. Дис. .... канд. биол. наук. Л.: ЛГУ, 1966. 350 с.
174.Тофан В.Е. Экология и внутривидовая изменчивость зеленых лягушек Молдавии //Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава института за 1970 год. Кишинев: Редакционно-издательский отдел Академии наук Молдавской ССР, 1967. №1. С. 32-40.
175.Тофан В.Е. Экология и распространение болотной черепахи в Молдавии //Материалы конференции по итогам научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава института за 1970 год. Кишинев: ”Лумина”, 1972. С. 129-130.
176.Тофан В.Е. Экология и характер внутривидовой изменчивости жерлянок Молдавии //Ученые записки. Кишинев: ”Картя Молдовеняскэ”, 1970. Т. XVII. С. 27-36.
177.Утевский С.Ю. Новые данные о распространении медицинской пиявки, *Hirudo* (Hirudinea) в Украине, Центральной Азии и на Северном Кавказе /С.Ю. Утевский, А.А. Атемасов, Г.А. Мазепа, А.Ю. Утевский, О.М. Утевская, А.М. Зиненко //Вестник зоологии. 2008, Т.42, №1. С.56-58.
178.Флора Восточной Европы /Отв. ред. Н.Н. Цвелев. СПб.: «Мир и семья-95», 1996. Т. 9. 456 с.; СПб.: «Мир и семья; изд-во СПХФА», 2001. Т. 10. 670 с.; СПб.: «Товарищество научных изданий КМК», 2004. Т. 9. 536 с.
179.Флора европейской части СССР /Отв. ред. Ан.А.Федоров. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1974. Т. 1. 404 с.; 1976. Т. 2. 236 с.; 1978. Т. 3. 259 с.; 1979. Т. 4. 355 с.; 1981. Т. 5. 380 с.; 1987. Т. 6. 254 с.; /Отв. ред. Н.Н. Цвелев. 1994. Т. 7. 317 с.; 1989. Т. 8. 412 с.
180.Цуркан В.Ф. Змеи Молдовы. Проблемы охраны //Тез. докл. Всесоюз. совещ. по пробл. кадастра и уч. животного.мира. Уфа, 1989.
181.Цуркан В. Операционный список герпетофауны /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 36. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
182.Цуркану В.Ф. Современное состояние герпетофауны долины Днестра и ее видового разнообразия //Мат. конф. Эколого-эконом. Проблемы Днестра. Одесса, 1997. С. 30-31.
183.Цуркану В.Ф. Состав и распределение герпетофауны в некоторых биотопах Молдовы //Известия АН РМ. 1993. № 2. С 39-43.
184.Цуркану В.Ф. Состояние герпетофауны басейна Днестра за последние сто лет. //Мат. Междунар. конф.: Сохр. биоразазнообр. Бассейна Днестра. Кишинев, 1999. С. 248-250.

185.Червона Книга України. Рослинний свит /Под ред. Я.П.Дідуха. Киев: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
186.Червона Книга України. Тваринний свит /Под ред. І.А.Акімова. Киев: Глобалконсалтинг, 2009. 632 с.
187.Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). Санкт-Петербург, 1995. 990 с.
188.Шабанова Г.А. Растительность долины Днестра //Проблемы сохранения биоразнообразия Среднего и Нижнего Днестра. Тез. Международной конф. Кишинев, 1998. С. 190-193.
189.Шабанова Г.А., Изверская Т.Д. Анализ флоры сосудистых растений Нижнего Приднестровья //Сборник научных статей «Академику Л.С.Бергу – 125 лет». Бендеры, 2001. С. 44-50.
190.Шабанова Г., Изверская Т, Гендов В. Операционный список высших растений /Андреев А. Руководство по оценке территорий-ядер экологической сети. Кишинэу, 2014. С. 24-29. http://bioticamoldova.org/library/CoreAreasAssessment_Guide_rus.pdf
191.Шабанова Г.А., Изверская Т.Д., Гендов В.С. Природные биотопы «NATURA 2000» в Республике Молдова //Ботанические чтения. Ишим. Изд. ИГПИ им. П.П. Ершова, 2013. С. 155-157.
192.Шабанова Г.А., Изверская Т.Д., Гендов В.С. Редкие виды сосудистых растений узловых территорий Национальной Экологической сети Республики Молдова //Int. Conf. „Ecological networks – introduction to experiences and approaches”, 13-14 october 2011, Chisinau, 2012. P. 157-163.
193.Шабанова Г.А., Изверская Т.Д., Негру А.Г. Проблемы сохранения флористического и фитоценотического разнообразия Нижнего Приднестровья //Biodiversitatea vegetala a Republicii Moldova. Chişinău, 2001. P. 177-181.
194.Шешницан С.С., Котомина Л.В. Жужелицы (*Coleoptera, Carabidae*) родов *Calosoma* и *Carabus* окрестностей г. Тирасполь //Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья. Тирасполь: Приднестр. гос. ун-т, 2009. С. 245-247.
195.Шешницан С.С., Котомина Л.В. Материалы по фауне и экологии водных и околоводных жесткокрылых (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrophilidae, Carabidae) Нижнего Днестра //Бассейн реки Днестр: экологические проблемы и управление трансграничными природными ресурсами. Тирасполь, 2010. С. 296-298.
196.Штирбу В.И. О ходе весенних и осенних миграций водоплавающих птиц в районе Кучурганского лимана //Миграции и практическое значение птиц Молдавии. Кишинев, 1980. С.110-119.
197.Штирбу В.И. Современное состояние фауны водно-болотных птиц в Молдове и практические меры по ее увеличению //Экология и охрана птиц и млекопитающих в антропогенном ландшафте. Кишинев, 1992. С. 80-94.
198.Шубернецкий И.В., Лукина Н.П. Современное состояние и перспективы сохранения вида *Hirudo medicinalis* в водоемах Молдовы и сопредельных районов Украины //Diversitatea,valorificarea raţională şi protecţia lumii animale. Chişinău, 2006. P.311-312.
199.Экологическое законодательство Республики Молдовы (1996-1998). Кишинев, 1999. 259 с.

Descrierea speciilor rare de plante vasculare și animale a fost efectuată de către următorii autori:

Derjanschi V.V. a descris speciile rare de insecte: ***Acherontia atropos*** (Linnaeus, 1758), ***Aglais urticae*** (Linnaeus, 1758), ***Ameles decolor*** (Charpentier, 1825), ***Anax imperator*** (Leach, 1815), ***Apatura iris*** (Linnaeus, 1758), ***Apatura metis*** (Freyer, 1829), ***Argynnis aglaja*** Linnaeus, 1758, ***Bombus argillaceus*** (Scopoli, 1763), ***Bombus ruderatus*** (Fabricius, 1775), ***Callimorpha dominula*** (Linnaeus, 1758), ***Carabus clathratus*** Linnaeus, 1761, ***Carabus ullrichii*** (Germar, 1824), ***Carabus variolosus*** (Fabricius, 1787), ***Catocala sponsa*** (Linnaeus, 1767), ***Cerambyx cerdo*** (Linnaeus, 1758), ***Colias chrysotheme*** (Esper, 1781), ***Elater ferrugineus*** (Linnaeus, 1758), ***Erythromma lindenii*** (Sélys, 1840), ***Euplagia quadripunctaria*** (Poda, 1761)***, Formica rufa*** Linnaeus, 1761, ***Hamearis lucina*** Linnaeus, 1758, ***Iphiclides podalirius*** Linnaeus, 1758, ***Leurorrhinia pectoralis*** Charpentier, 1825, ***Lucanus cervus*** (Linnaeus, 1758), ***Lycaena virgaureae*** (Linnaeus, 1758), ***Maculinea arion*** (Linnaeus, 1758), ***Megascolia maculata*** (Drury, 1773), ***Morimus asper funereus*** (Mulsant, 1862), ***Neozephyrus quercus*** (Linnaeus, 1758), ***Neptis sappho*** (Pallas, 1771), ***Onconotus servillei*** (Fischer von Waldheim, 1846), ***Oryctes nasicornis*** (Linnaeus, 1758), ***Papilio machaon*** (Linnaeus, 1758), ***Parnassius mnemoyne*** (Linnaeus, 1758), ***Plebejus argyrognomon*** (Bergsträsser, 1779), ***Proserpinus proserpina*** (Pallas, 1772), ***Protaetia aeruginosa*** (Linnaeus, 1767), ***Saga pedo*** (Pallas, 1771), ***Saturnia pyri*** (Denis et Schiffermüller, 1775), ***Scolia hirta*** (Schrank, 1781), ***Xylocopa valga*** Gerstäcker, 1872, ***Xylocopa violacea*** (Linnaeus, 1758), ***Zerynthia polyxena*** (Denis et Schiffermüller, 1775).

Jurminschi S.D. și **Mantorov O.Gh**. au descris speciile rare de păsări: ***Acrocephalus palustris*** (Bechstein, 1798), ***Anser erythropus*** (Linnaeus, 1758), ***Anser fabalis*** (Lath, 1787), ***Anthus campestris*** (Linnaeus, 1758), ***Anthus pratensis*** (Linnaeus, 1758), ***Aquila chrysaetos*** (Linnaeus, 1758), ***Aquila clanga*** (Pallas, 1811), ***Aquila pomarina*** (Ch.L. Brehm, 1831), ***Ardea alba*** (Linnaeus, 1758), ***Ardea purpurea*** (Linnaeus, 1766), ***Ardeola ralloides*** (Scopoli, 1769), ***Botaurus stellaris*** (Linnaeus, 1758), ***Calidris alpina*** (Linnaeus, 1758), ***Calidris ferruginea*** (Pontoppidan, 1763), ***Calidris minuta*** (Leisler, 1812), ***Chlidonias hybridus*** (Pallas, 1811), ***Chlidonias niger*** (Linnaeus, 1758), ***Ciconia ciconia*** (Linnaeus, 1758), ***Ciconia nigra*** (Linnaeus, 1758), ***Circaetus gallicus*** (Gmelin, 1788), ***Circus pygargus*** (Linnaeus, 1758), ***Columba oenas*** (Linnaeus, 1758), ***Dendrocopos medius*** (Linnaeus, 1758), ***Falco cherrug*** (I.E. Gray, 1834), ***Falco peregrinus*** (Tunstal, 1771), ***Ficedula hypoleuca*** (Pallas, 1764), ***Hieraaetus pennatus*** (Gmelin, 1788), ***Locustella fluviatilis*** **(**Wolf, 1810), ***Locustella luscinioides*** (Savi, 1824), ***Locustella naevia*** (Boddaert, 1783), ***Pelecanus onocrotalus*** (Linnaeus, 1758), ***Phalacrocorax pygmaeus*** (Pallas, 1773), ***Platalea leucorodia*** (Linnaeus, 1758), ***Plegadis falcinellus*** (Linnaeus, 1766), ***Porzana parva*** (Scopoli, 1769), ***Porzana pusilla*** (Pallas, 1776), ***Saxicola rubetra*** (Linnaeus, 1758), ***Tadorna tadorna*** (Linnaeus, 1758), ***Tringa erythropus*** (Pallas, 1764), ***Tringa stagnatilis*** (Bechstein, 1803), ***Tringa totanus*** (Linnaeus, 1758), ***Turdus iliacus*** (Linnaeus, 1766).

Izverscaia T.D. și **Ghendov V.S.** au descris speciile rare de plante vasculare: ***Adonis vernalis*** L., ***Alisma gramineum*** Lej., ***Allium paniculatum*** L., ***Asparagus officinalis*** L., ***Asparagus tenuifolius*** Lam., ***Asparagus verticillatus*** L., ***Arum orientale*** M.Bieb., ***Astragalus albidus*** Waldst. et Kit., ***Astragalus dasyanthus*** Pall., ***Astragalus exscapus*** L., ***Astragalus ponticus*** Pall., ***Bellevalia sarmatica*** (Georgi) Woronow, ***Berberis vulgaris*** L., ***Campanula persicifolia*** L., ***Carex caryophyllea*** Latourr., ***Carex pseudocyperus*** L., ***Caulinia minor*** (All.) Coss. et Germ., ***Cerastium glutinosum*** Fries., ***Chamaecytisus lindemannii*** (V.Krecz.) Klásková,

Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm., ***Chamaecytisus ruthenicus*** (Fisch. ex Woloszcz.) Klásková, ***Chrysopogon gryllus*** (L.) Trin., ***Colchicum triphyllum*** G.Kunze, ***Convolvulus lineatus*** L., ***Crambe tataria*** Sebeok, ***Crocus reticulatus*** Stev. ex Adams, ***Cyperus glomeratus*** L., ***Dianthus capitatus*** Balb. ex DC., ***Dichostylis micheliana*** (L.) Nees, ***Eleocharis acicularis*** (L.) Roem. et Schult., ***Eleocharis uniglumis*** (Link) Schult., ***Erodium ciconium*** (L.) L`Her., ***Erodium ruthenicum*** M.Bieb., ***Euonymus nanus*** M.Bieb., ***Geranium palustre*** L., ***Goniolimon besserianum*** (Schult.) Kusn., ***Gratiola officinalis*** L., ***Haplophyllum suaveolens*** (DC.) G. Don fil., ***Hyacinthella leucophaea*** (C.Koch) Schur, ***Hydrocharis morsus-ranae*** L., ***Iris hungarica*** Waldst. et Kit., ***Iris pumila*** L., ***Iris variegata*** L., ***Juncellus serotinus*** (Rottb.) C.B. Clarke, ***Lathyrus aphaca*** L., ***Leopoldia tenuiflora*** (Tausch) Heldr., ***Limonium hypanicum*** Klokov, ***Linum nervosum*** Waldst. et Kit., ***Listera ovata*** (L.) R. Br., ***Lunaria annua*** L., ***Maianthemum bifolium*** (L.) F.W.Schmidt, ***Medicago rigidula*** (L.) All., ***Nymphaea alba*** L., ***Nymphoides peltata*** (S.G.Gmel.) O.Kuntze, ***Ornithogalum divergens*** Boreau, ***Ornithogalum kochii*** Parl., ***Ornithogalum refractum*** Schlecht., ***Platanthera chlorantha*** (Cust.) Reichenb., ***Potamogeton berchtoldii*** Fieb., ***Potamogeton compressus*** L., ***Potamogeton gramineus*** L., ***Potamogeton lucens*** L., ***Potamogeton natans*** L., ***Pulsatilla montana*** (Hoppe) Reichenb., ***Pulsatilla ucrainica*** (Ugr.) Wissjul., ***Reseda inodora*** Reichenb., ***Salvinia natans*** (L.) All., ***Scirpus triqueter*** L., ***Seseli tortuosum*** L., ***Spirodela polyrrhiza*** (L.) Schleid., ***Sternbergia colchiciflora*** Waldst. et Kit., ***Stipa lessingiana*** Trin. et Rupr., ***Stipa pennata*** L., ***Stipa pulcherrima*** C.Koch, ***Stipa tirsa*** Stev., ***Stipa ucrainica*** P.Smirn., ***Symphytum tauricum*** Willd., ***Trapa natans*** L., ***Trifolium vesiculosum*** Savi, ***Typha laxmannii*** Lepech., ***Utricularia vulgaris*** L., ***Valerianella coronata*** (L.) DC., ***Vallisneria spiralis*** L., ***Veratrum nigrum*** L., ***Veronica euxina*** Turrill, ***Viburnum opulus*** L., ***Vitis sylvestris*** C.C.Gmel.:

Ioniță O.V. și **Tofan-Dorofeev E.V.** au descris speciile rare de plante vasculare: ***Achillea coarctata*** Poir., ***Achillea ochroleuca*** Ehrh., ***Helichrysum arenarium*** (L.) Moench, ***Inula helenium*** L., ***Petasites hybridus*** (L.) Gaertn., Mey. et Scherb., ***Pilosella glaucescens*** (Bess.) Sojak, ***Scorzonera mollis*** M.Bieb., **Tanacetum odessanum** (Klokov) Tzvel.;

Rușciuk A.D. a descris speciile rare de plante – ***Carex rhizina*** Blytt ex Lindb., ***Elatine hydropiper*** L., ***Ornithogalum boucheanum*** (Kunth) Aschers., ***Tamarix ramosissima*** Ledeb.

Syrodoev G.N. a compilat hărțile: Site-ul web Ramsar „Nistrul de Jos” din Republica Moldova, Complexe naturale ale site-ului Ramsar „Nistrul de jos” și Rețeaua ecologică de pe site-ul Ramsar „Nistrul de jos”.

Tișcencov A.A. și **Romanovici N.A**. au descris speciile rare de păsări: ***Acanthis cannabina*** (Linnaeus, 1758), ***Accipiter brevipes*** (Severtzov, 1850), ***Accipiter gentilis*** (Linnaeus, 1758), ***Accipiter nisus*** (Linnaeus, 1758), ***Alauda arvensis*** (Linnaeus, 1758), ***Anas acuta*** (Linnaeus, 1758), ***Anas strepera*** (Linnaeus, 1758), ***Anthus trivialis*** (Linnaeus, 1758), ***Athene noctua*** (Scopoli, 1769), ***Asio flammeus*** (Pontoppidan, 1763), ***Asio otus*** (Linnaeus, 1758), ***Aythya fuligula*** (Linnaeus, 1758), ***Aythya marila*** (Linnaeus, 1761), ***Bucephala clangula*** (Linnaeus, 1758), ***Buteo buteo*** (Linnaeus, 1758), ***Buteo lagopus*** (Pontoppidan, 1763), ***Buteo rufinus*** (Cretzschmar, 1827), ***Carduelis carduelis*** (Linnaeus, 1758), ***Certhia familiaris*** (Linnaeus, 1758), ***Chloris chloris*** (Linnaeus, 1758), ***Circus cyaneus*** (Linnaeus, 1766), ***Coccothraustes coccothraustes*** (Linnaeus, 1758), ***Columba palumbus*** (Linnaeus, 1758), ***Coracias garrulus*** (Linnaeus, 1758), ***Corvus corax*** (Linnaeus, 1758), ***Corvus cornix*** (Linnaeus, 1758), ***Corvus frugilegus*** (Linnaeus, 1758),

Corvus monedula (Linnaeus, 1758), ***Coturnix cturnix*** (Linnaeus, 1758), ***Crex crex*** (Linnaeus, 1758), ***Delichon urbica*** (Linnaeus, 1758), ***Falco subbuteo*** (Linnaeus, 1758), ***Falco vespertinus*** (Linnaeus, 1766), ***Gallinago gallinago*** (Linnaeus, 1758), ***Garrulus glandarius*** (Linnaeus, 1758), ***Hippolais icterina*** (Vieillot, 1817), ***Hirundo rustica*** (Linnaeus, 1758), ***Lanius collurio*** (Linnaeus, 1758), ***Lanius excubitor*** (Linnaeus, 1758), ***Lanius minor*** (Gmelin, 1788), ***Limosa limosa*** (Linnaeus, 1758), ***Lullula arborea*** (Linnaeus, 1758), ***Lymnocryptes minimus*** (Brunnich, 1764), ***Milvus migrans*** (Boddaert, 1783), ***Motacilla alba*** (Linnaeus, 1758), ***Motacilla flava*** (Linnaeus, 1758), ***Numenius arquata*** (Linnaeus, 1758), ***Oenanthe oenanthe*** (Linnaeus, 1758), ***Oriolus oriolus*** (Linnaeus, 1758), ***Otus scops*** (Linnaeus, 1758), ***Parus caeruleus*** (Linnaeus, 1758), ***Parus major*** (Linnaeus, 1758), ***Perdix perdix*** (Linnaeus, 1758), ***Pernis apivorus*** (Linnaeus, 1758), ***Phasianus colchicus*** (Linnaeus, 1758), ***Phoenicurus ochruros*** (Gmelin, 1774), ***Phoenicurus phoenicurus*** (Linnaeus, 1758), ***Pica pica*** (Linnaeus, 1758), ***Rufibrenta ruficollis*** (Pallas, 1769), ***Saxicola torquata*** (Linnaeus, 1766), ***Scolopax rusticola*** (Linnaeus, 1758), ***Sitta europaea*** (Linnaeus, 1758), ***Spinus spinus*** (Linnaeus, 1758), ***Streptopelia decaocto*** (Frivaldszky, 1838), ***Streptopelia turtur*** (Linnaeus, 1758), ***Strix aluco*** (Linnaeus, 1758), ***Sylvia atricapilla*** (Linnaeus, 1758), ***Sylvia borin*** (Boddaert, 1783), ***Sylvia communis (***Latham, 1787), ***Sylvia curruca*** (Linnaeus, 1758), ***Sylvia nisoria*** (Bechstein, 1795), ***Turdus merula*** (Linnaeus, 1758), ***Turdus philomelos*** (Brehm, 1831), ***Turdus pilaris*** (Linnaeus, 1758);

Tofan-Dorofeev E.V. și **Ioniță O.V.** au descris speciile rare de plante vasculare: ***Amygdalus nana*** L., ***Potentilla astracanica*** Jacq., ***Pyrus elaeagnifolia*** Pall., ***Rosa micrantha*** Borrer ex Smith, ***Rosa tschatyrdagi*** Chrshan., ***Sorbus torminalis*** (L.) Crantz.

Țurcanu V.F. a descris speciile de amfibieni: ***Bombina bombina*** Linnaeus, 1761, ***Bufo bufo*** Linnaeus, 1758, ***Bufo viridis*** Laurenti, 1786, ***Hyla arborea*** Linnaeus, 1758, ***Pelobates fuscus*** Laurenti, 1768, ***Rana dalmatina*** Bonaparte, 1840, ***Triturus cristatus*** Laurenti, 1786, ***Triturus vulgaris*** Laurenti, 1786; specii de reptile : ***Coluber caspius*** Linnaeus, 1758, ***Coronella austriaca*** Laurenti, 1768, ***Elaphe guatuorlineata*** **(*sauromares*)** Lacepede, 1768, ***Emys orbicularis*** Linnaeus, 1758, ***Lacerta agilis*** Linnaeus, 1758, ***Lacerta viridis*** Linnaeus, 1758, ***Natrix tessellate*** Laurenti, 1768, ***Zamenis longissimus*** Laurenti, 1768 și speciile de mamifere: ***Cricetus cricetus*** Pallas, 1773, ***Crocedura leucodon*** Hermann, 1780, ***Lutra lutra*** Linnaeus, 1758, ***Martes foina*** Erxleben, 1777, ***Martes martes*** Linnaeus, 1758, ***Meles meles*** Linnaeus, 1758, ***Micromys minutus*** Pallas, 1771, ***Mustela erminea*** Linnaeus, 1758, ***Mustela lutreola*** Linnaeus,1761, ***Mustela putorius*** Linnaeus, 1758, ***Myoxus glis*** Linnaeus, 1766, ***Neomys anomalus*** Cabrera, 1907, ***Sorex araneus*** Linnaeus, 1758, ***Sorex minutus*** Linnaeus, 1758, inclusiv speciile de liliecii: ***Myotis bechsteinii*** Kuhl, 1817, ***Myotis dasycneme*** Boie, 1825, ***Myotis mystacinus*** Kuhl, 1817, ***Nyctalus lasiopterus*** Schreber, 1780, ***Pipistrellus kuhlii*** Kuhl, 1817, ***Rhinolophus hipposideros*** Bechstein, 1800, ***Vespertilio murinus*** Linnaeus, 1758.

Țurcanu V.F. și Bondarenko A.M. au descris speciile de mamifere: ***Erinaceus europeus*** Barret-Hamilton, 1900, ***Felis silvestris*** Schreber, 1777, ***Mustela nivalis*** Linnaeus,1766, inclusiv speciile de liliecii: ***Eptesicus serotinus*** Schreber, 1774, ***Myotis daubentonii*** Kuhl, 1817, ***Nyctalus leisleri*** Kuhl, 1817, ***Nyctalus noctua*** Schreber, 1774, ***Pipistrellus nathusii*** Keyserling, 1839, ***Pipistrellus pipistrellus*** Schreber, 1774, ***Pipistrellus pygmaeus*** Leach, 1825, ***Plecotus austriacus*** Fischer, 1829.

Șubernețchi I.V. a descris specie rară de nevertebrate ***Hirudo medicinalis*** L.